

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







H.N: 1155 A.N. 1155





CATALOGUE

SYSTÉMATIQUE ET RAISONNÉ DES CURIOSITÉS

DE

LA NATURE ET DE L'ART,

QUI COMPOSENT LE CABINET

DE M. DAVILA,

AVEC Figures en taille douce, de plusieurs mor-

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez BRYASSON, rue Saint-Jacques, à la Sciencel

M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Permission.



LE PRÉSENT CATALOGUE

se distribue aussi

Amsterdam, chez Changuion.
Rotterdam, chez Beman.
Londres, chez Paul Vaillant..
Basle, chez Schweighauser.



AVERTISSEMENT

DE M. DAVILA.

JE me crois obligé de prévenir ici le Public, & fur-tout mes Amis & mes Correspondans, des motifs qui m'engagent à vendre un Cabinet que je n'ai ceffé d'augmenter jusqu'à ce jour. Les uns pourroient croire que je me suis dégoûté très-légèrement d'un objet qui paroissoit faire mes délices depuis plus de vingt ans : les autres, au nombre desquels sont d'illustres Naturalistes qui n'ont pas peu contribué à l'embellissement de cette Collection, pourroient regretter de m'avoir cédé quelques morceaux rares & curieux, dont ils ne m'ont peut-être fait l'abandon que par l'espoir de les voir paroître dans un Ouvrage que je me proposois de faite alors sur certaines branches de l'Histoire Naturelle, & pour lequel j'avois déja fait dessiner plus de deux cent morceaux; mais

cet Ouvrage n'a pû avoir lieu, par les mêmes raisons qui m'obligent à me défaire actuellement de mon Cabinet.

Entre plusieurs motifs que je pourrois donner, j'espere que ces deux suffiront: l'un est l'altération de ma fanté qui, depuis quelques années, est fort chance-lante, & qui exige de la tranquillité: l'autre est la nécessité où je me trouve de repasser au Pérou pour des affaires de famille qui m'y rappellent.

J'avoue sincérement que ce n'est pas sans une peine extrême que j'abandonne l'objet de ma plus vive passion, & que je me vois sorcé de priver le Public d'un petit Traité sur les Eponges & les Alcyons, que je lui destinois, & qui devoit être mon premier essai, ayant fait, dans ce genre, comme le prouve le Catalogue, une collection des plus intéressantes. Au désaut de cet Ouvrage, j'espere qu'on me scaura gré d'avoir présenté le tableau sidéle de tout ce qui compose mon Cabinet.

Malgré les connoissances que l'étude de plusieurs années m'a pû fournir sur les

'DE M. BAVILA.

différences substances qui s'y trouvent rafsemblées, j'ai eu recours, en plus d'une oecasion, aux lumieres de nos plus habiles Naturalistes, auxquels je suis redevable de plusieurs remarques neuves & importantes; mais celui à qui je dois le plus, est M. DEROMÉDELISLE, Auteur de la Lettre sur les Polypes d'eaudouce, qui a fait, de concern avec moi, toute la partie de l'Histoire Naturelle, & une partie de celle des Curiosités de l'Art.

Le peu de tems qui me reste avant mon retour au Pérou, & la peine que j'ai de voir démembrer une Collection qui, par le soin avec lequel je l'ai faite, peut devenir utile aux progrès de l'Histoire Naturelle, m'engagent à prévenir le Publie que je me préterai volontiers aux propositions de ceux qui voudroient faire l'acquisition totale de mon Cabinet: je le laisserai même, dans ce cas, à un prix son raisonnable, & au dessous de sa valeur intrinséque, qui sera fixée sur l'estimation qu'on en sera faire par des Connoisseurs en ce genre.

vj AVERTISSEM DE M. DAVILA.

On pourra s'adresser, jusqu'au 15 Oc-20bre 1767, à M. DAVILA, rue de Richelieu, près de la Fontaine, ou à M. Remy, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, rue Poupée, seconde Porte cochere à gauche, en entrant par la rue Haute-feuille.

Passé ce terme, si personne ne se présente, on procédera à la Vente publique, qui commencera le lendemain de la Saint-Martin, Jeudi 12 Novembre de la même année, & qui sera continuée sans interruption jusqu'à sa sin.

On distribuera, de quinze jours en quinze jours, une seuille qui indiquera les Articles qui seront vendus dans chaque vacation.





PREFACE.

AVANT que de passer au détail des Substances qui composent notre Cabinet, nous croyons devoir exposer, en peu de mots, l'ordre que nous avons suivi dans leur distribution, & les raisons qui nous ont déterminés à en donner des descriptions plus circonsciées que celles que l'on trouve ordinairement dans les Ouvrages de ce genre.

Vingt ans de soins & de recherches, ayant rendu notre Collection une des plus complettes de l'Europe, sur tout quant au Regne minéral & aux dissérens Corps que produit la mer; nous avons pensé que les Naturalistes nous sçauroient gré de la leur faire connoître dans un certain détail, avant qu'elle sût dispersée, & que les Curieux seroient bien-aises de se voir indiquer les

morceaux rares que nous possédons, & qu'on chercheroit peut-être inutilement ailleurs.

C'est dans cette vûe que nous avons formé le plan de notre Catalogue, & l'exécution n'étoit pas sans difficulté: car, s'il faut ici donner de chaque substance une idée aussi claire, aussi distincte qu'il est possible; il est également nécessaire de se renfermer dans les bornes prescrites à une espèce d'ouvrage où l'on doit seulement faire connoître les objets, sans chercher à en approfondir la nature & les diverses propriétés.

La disposition méthodique des substances dans ce Catalogue, nous a paru le scul moyen de réunir le double avantage de la clarté & de la précision: car, en rangeant chaque Espèce dans son vrai Genre, en plaçant le Genre dans sa Famille, & celle-ci dans sa Classe; cette simple distribution bien ordonnée, non-seulement jette une grande lumière sur les objets, mais même elle écarte ces répétitions qu'il est si dissicile d'éviter dans un ouvrage de la nature de celui ci.

Mais nous l'avons déja dit; cet ordre, qui constitue notre plan, a luimême ses difficultés : le nombre des productions naturelles est si grand; leur forme est si variée; la chaîne qui les unit entr'elles, si déliée & quelquesois si peu sensible, que l'on est souvent très-embarrassé lorsqu'il s'agit de déterminer les caracteres qui doivent constituer ce qu'on appelle un Genre, & qu'il faut fixer celui auquel on doit rapporter telle ou telle Espèce. Tantôt on se trouve arrêté par des Espéces qui ne conviennent à aucun des Genres établis; tantôt par une autre qui semble appartenir à plusieurs Genres à la fois.

Il est vrai que nous ne manquons pas d'excellens guides qui ont déja tracé la route que nous devions suivre dans ce dédale; mais un Catalogue de vente est bien différent d'un simple Catalogue raisonné, où l'on n'est point géné par la nécessité souvent rebutante d'assortir des lots: aussi espérons-nous qu'on voudra bien attribuer à cette contrainte quelques irrégularités qui pourront se trouver dans la distribution des Espéces. Nous allons développer le plan que nous avons suivi.

Les Naturalistes s'accordent assez à diviser tous les êtres en trois grandes Classes, connues sous les noms de Regne animal, Regne végétal & Regne minéral. Cette division, quoiqu'incomplette, est suffisante pour notre objet, n'ayant à parler que des substances de ces trois Regnes.

Nous mettons à la tête du premier Regne (que nous diviserons en dix parties) les plus petits animaux connus, ou du moins leurs productions, pour nous élever par dégrès jusqu'à l'Homme. Les Polypiers ou habitations de Polypes forment, en conséquence, notre premiere Partie. Cette Classe, qui est une des plus complettes de notre Cabines, comprend aussi les Eponges &

les Alcyons, quoique nous ignorions encore à quels Genres d'Animaux on doit rapporter ces productions singulieres. Ellis (1), Wallerius (2), Peyssonel (3), ont été nos guides pour la Partie systématique; Séba (4) & Gualtieri (5) pour la description des Espéces.

La seconde Partie contient les Co-QUILLAGES marins, fluviatiles & terrestres, dont nous faisons trois Sections, & que nous divisons, selon la méthode la plus suivie, en Univalves, Bivalves & Multivalves.

Quoique les sçavantes distributions

⁽¹⁾ Essai sur l'Hist. Nat. des Corallines. La Haye; 1756. in-4°. fig.

⁽²⁾ Minéralogie (de la traduction de M. le Baron d'Olbach.) Paris, 1753. 2 vol. in-8°.

⁽³⁾ Traduction d'un art. des Transact. Philos. sur le Corail. Londres, 1756, in-12.

⁽⁴⁾ Locupletis. Rer. Nat. Thes. Auf. 1734 & suiv. 4 vol. in-fol. fig.

⁽⁵⁾ Index Teltar. Conchylior. Florentia, 1742. in-

A. 1815

de Lister (1), Gualtieri (2), Klein (3) & Adanson (4) nous aient été d'un grand secours, nous n'avons pû adopter aucun de ces systèmes, les uns à cause des subdivisions trop nombreuses qui en résultent, & dont ce Catalogue n'est point susceptible; les autres parce qu'its sont sondés sur la sorme propre & individuelle de chaque animal, & qu'ainsi nous n'aurions pû nous y conformer entiérement, puisque nous possédons un très-grand nombte de Coquilles dont les animaux ou n'ont point été décrits, ou nous sont même absolument inconnus.

Nous avons donc préféré le plan simple & aisé de M. d'Argenville (5);

⁽¹⁾ Historia Conchylior. Londini, 1685-1692. infol. fig.

⁽²⁾ Index Teltar. Conchiliorum.

⁽³⁾ Tentamen Methodi Ostracologicz. Lugd. Batav. 1753. in-4°. fig.

⁽⁴⁾ Hist. Nat. du Sénégal. Paris, 1757. ih-4°. fig.

⁽⁵⁾ L'Hist. Nat. éclaircie dans la Conchyliologie.

plan d'ailleurs très-connu, & dès-là plus convenable à notre dessein, qui cst moins de faire un traité complet sur cette matiere, que d'indiquer les Espéces & les Variétés dont nous sommes en possession.

Toutefois on ne s'est pas tellement assujetti au plan de cet Auteur, que l'on air négligé d'y faire quelques changemens, & de mettre un peu plus d'ordre dans les Familles; ce qu'on a fait en subdivisant ces Familles en un petit nombre de Genres dont les caracteres sont aisés à saisir: nous avons aussi réuni on transposé quelques unes des Familles, lorsqu'il nous a paru qu'il en résultoit plus d'ordre & de liaison dans notre système. C'est aux Naturalistes à juger de ces changemens; mais nous pouvons assurer que nous n'avons eu pour but que l'avantage de simplifier les objets, & de conserver les noms déja reçus, sans vouloir prendre sur nous d'en faire de nouveaux qui n'auroient pas été du goût de tout le monde,

& qui dès-là exigeoient des discussions déplacées dans un Catalogue.

On nous reprochera peut - être de nous être trop étendus dans la description de la plûpart des Coquillages qui sont déja connus, & qu'il eût, dira-t'on, suffi de nommer : mais voici nos raisons.

Comme les Coquilles qui ont des noms particuliers, ne font pas la vingtieme partie de celles qui sont connues; que d'ailleurs la plûpart de ces noms, quelquesois tirés de fort loin, ne sont pas reçus partout, & que plusieurs ont été donnés en même tems à deux ou trois espéces souvent très-différentes, tandis que d'autres espéces ont eu jusqu'à deux ou trois noms à la sois: nous nous serions exposés à n'être point entendus, & nous n'aurions fait qu'augmenter la confusion, si nous nous étions contentés de donner un nom sans déterminer l'espéce à laquelle il convient.

Tel est l'inconvénient que nous nous sommes proposé d'éviter, en saisant de chaque espéce une description plus ou moins concise, selon que l'objet à décrire étoit plus ou moins commun, & en y joignant le nom sous lequel cette espéce est connue, non-seulement en France, mais en Hollande & dans les autres pays. En conséquence, nous avons cru devoir nous étendre un peu plus sur celles des espéces qui n'avoient point de nom.

Mais comme, en fait d'Histoire Naturelle, les descriptions les plus exactes sont insuffisantes pour ceux qui n'ont pas déja quelque connoissance des objets décrits, nous avons eu soin d'indiquer en marge la plûpart des Naturalistes qui nous ont offert la même espèce gravée, en donnant la présérence tantôt à ceux de ces Auteurs où elle étoit le mieux représentée, tantôt à ceux dont les Ouvrages sont le plus connus. C'est aussi par cette raison que nous avons cité quelquesois trois & quatre Auteurs pour un même objet, asin que, si on n'a pas l'un de ces Qua

vrages; on puisse avoir recours aux autres.

La troisieme Partie qui, sous le nom de ZOOPHYTES, comprend les Etoiles de mer & les animaux moux, auxquels on donne le nom de Mollusques, est encore des plus intéressantes, quant à la premiere de ces Familles. Si nous n'avons pas toutes les espéces qui sont décrites dans le bel Ouvrage que M. Linck a publié sur cette matiere (1), nous avons l'avantage d'en posséder plusieurs autres qui lui ont été inconnues, entre lesquelles le fameux Palmier marin tient sans contredit la premiere place, tant par sa rareté, puisque jusqu'à présent c'est le seul qui soit connu en Europe, que par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Pierres étoitées & des Entroques depuis le Mémoire de M. Guettard (2).

⁽¹⁾ De Stellis marinis. Liplia, 1735. in fol. fig.
(2) Voy. les Mém. de l'Acad. R. des Sc. an. 1755.

p. 224 & fuiv.

Pour les sept autres Parties du Régne animal, qui sont les Crustacées, les Poissons, les Amphibies, les Insectes, les Oiseaux, les Quadrupedes & l'Homme; la Collection que nous avons de chacune de ces Classes, n'étant pas assez considérable pour qu'on ait pû ranger les individus qui les composent sous aucun Ordre systématique: nous nous sommes contentés de les indiquer, en suivant, le plus exactement qu'il nous a été possible, l'ordre dans lequel nous les aurions placés, si notre Collection eût été plus complette à cet égard.

Quoique cette partie de notre Cabinet laisse beaucoup à désirer, les Curieux y trouveront néanmoins de quoi se satisfaire, par le soin que nous avons toujours eu de nous procurer ce qu'il y avoit de plus rare en chaque genre, dans l'impossibilité où nous étions de tout completter.

Nous avons mis, à la fin du Regne animal, les Bézoards & les autres Calculs qui naissent dans le corps de différens animaux & de l'Homme même. La suite que nous en avons est d'autant plus précicuse, qu'elle est le fruit de plus de quarante années de recherches faites par Messieurs Geosfroy de l'Académie Royale des Sciences, & que depuis elle a encore été augmentée d'un bon nombre d'autres que nous avons reçus du Pérou.

Les VégéTAUX forment la onzieme Partie du Catalogue des Curiosités naturelles. La suite en est peu nombreuse; mais on y verra quelques morceaux rares & une collection très-piquante d'Algues, de Fucus & de Mousses marines. C'est par-là que nous terminons notre premier volume.

Les Terres, les Pierres & les Minéraux ont fourni seuls la matiere du second. Au moyen de la distribution méthodique que nous avons faite de ces dissérentes substances, on s'appercevra aisément qu'il est peu d'Espéces & même de Variétés qui nous

manquent. Nous avons suivi, autant qu'il a été possible, la nomenclature de Wallerius, quoique nous nous soyons souvent écartés du plan général de cet Auteur, pour suivre celui de quelques Naturalistes plus modernes. Nous avons aussi employé les phrases de Linnæus, sur-tout lorsqu'il s'agissoit de Pierres & de Mines de Suéde, dont nous avons reçu une très-belle suite, étiquettée conformément au système de ce célébre Naturaliste.

Le soin que nous avons pris de déterminer avec exactitude les diverses espéces de Cristallisations qui sont si fréquentes dans le Regne minéral, nous donne lieu d'espérer qu'on aura quelque indulgence pour certains articles un peu longs, parce qu'ils peuvent contribuer à faire mieux connoître ces corps dont la figure, constamment réguliere, n'est pas si indisférente que bien des personnes se le sont persuadé: outre qu'elle suffit quelquesois pour les faire reconnoître, elle paroît indiquer une affinité cachée entre ceux de ces corps qui affectent une même Cristallisation.

Ainsi, par exemple, la forme Cubique est particuliérement affectée au Spath vitreux, au Plomb, à la Marcassite, au Sel marin; la Pyramidale au Spath calcaire, au Quartz, au Cristal de Roche, à la mine d'Etain; la Prismatique hexagone au Spath calcaire, à la mine de Plomb verte, à la mine d'Argent rouge; la Rhomboidale à la Sélénite & au Spath calcaire; l'Octaëdre à l'Alun, au Fer, au Cuivre, aux Pyrites, au Rubis, &c.

M. Linnæus est le premier qui air envisagé, sous un point de vûe général, toutes ces dissérentes Cristallisations, & le seul qui en ait déterminé la figure avec assez de justesse, pour les faire reconnoître au premier coup d'œil (1); mais les unes n'ayant point encore été décrites en notre langue,

⁽¹⁾ Voyez Linnzi Systema naturz : ejusd. Amznit. Acad. vol. 1. & Muszum Tellinianum.

& les autres ne l'ayant été que d'une maniere vague & incomplette, nous avons cru devoir y suppléer & ajouter aux Cristaux décrits par Linnaus, la description de plusieurs autres dont il n'a point parlé.

Les Pétrifications occupent la derniere Partie de la Collection d'Hiftoire naturelle; & ce n'est pas la moins intéressante. On y retrouvera le Plans que nous avons suivi dans la distribution des Regnes Animal & Végétal, auxquels, fuivant l'opinion la plus commune, les différens corps pétrifiés doivent leur origine. S'il se trouve quelque Naturaliste qui donte encore de la réalité des Pétrifications, ou qui ne leur attribue qu'une origine purement minérale, nous avons plusieurs morceaux dont l'inspection suffira pour le tirer de son erreur. Tels sont, par exemple, du Corail rouge avec de la pyrite; des. Cornes d'Ammon, des Nauvilues & quantité d'autres Coquilles encore revêtues de leur test & de leur nacre; des

Echinites avec leurs dents ou leurs pointes dans la même matrice; des Enrroques étoilées, parfaitement semblables: aux tiges du Palmier marin (1); des Crabes pétrifiés (2) presque entiers avec leurs pattes & leurs mordans; des Empreintes de Chevrettes (3), de Poisfons (4), d'Insedes, caractérisées au, point de ne pouvoir les méconnoître; enfin des Bois des Feuilles & des Fruits même (5), hors de toute contellation, in habit, march all all men "Il existe, à la verité, un grand nom-

bre de Pétrifications dont les Analo-. gues vivans ne hous font point conmus; mais, il l'on me trouve pas toujours. précisément l'Espèce vivante, à laquelle on puisse rapporter tello ou telle. Espèce pétrifiée, il est aisé du moiris de. or Househall as

A Charles Carl Land (1) Voyet la planche 1 du troiseme vol. de notre Catalogue.

⁽²⁾ Ibid. pl. 3. lett. G. g. . - (3) Ibid. lett. I.

⁽⁴⁾ Ibid. pl. IV. (5) Ibid. pl. YI & VII.

reconnoître le genre qu'on doit lui assigner. Il n'en est pas de même des Pierres sigurées (1), appellées Jeux de la Nature: celles-ci n'ont qu'une ressemblance imparsaite & le plus souvent arbitraire avec les objets auxquels on les compare: c'est ce qui met une dissérence très-sensible entre les Fossiles propres & les Fossiles accidentels ou Pétriscations, quoique quelques-uns aient affecté de les consandre.

Les Curiosités de L'ART, dont il nous reste à parler, ne sont point étrangeres à un Cabinet d'Histoire Naturelle: on peut même dire qu'elles en sont une branche essentielle, puisqu'il est peu de productions de la Nature, auxquelles les Arts ne puissent ajouter un nouveau lustre & un nouveau mérite.

Les différentes Classes qui composent cette partie de notre Collection, sont: 1°. Les Habits, Meubles, Armes &

⁽¹⁾ V. le second vol. du Catalogue.

RIV. PREFACE

Ustensiles de divers Peuples anciens & modernes, Chinois, Indiens, Amériquains, &c.

- 2°. Les Bijoux, les Vases d'Agate, de Jaspe, de Cristal, d'Albâtre & autres ouvrages curieux en Coquilles, Nacre & Ivoire, avec quelques anciens Laques & quelques Porcelaines de la Chine & du Japon.
- 1.3°. Les Modèles, les Instrumens de Mathématique, de Physique, &c.
- Modernes, dont plusieurs sont du premilée mérite.
- ques, Bustes, Bas-reliefs & Médailles. (M. l'Abbé Grimaud, très-versé dans la connoissance des Antiques, nous a beaucoup aidés dans cette partie de notre Ouvrage).
- 6°. Une Collection assez considérable d'Estampes & de Peintures à Gouache, avec quelques Tableaux & Defseins Originaux des Maîtres des trois

KX

Ecoles; des Miniatures, Peintures en émail & autres curiosités semblables. Cette Partie a été faite par M. Remy, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, connu par les Catalogues qu'il a donnés de plusieurs beaux Cabinets, & , en dernier lieu, par celui qu'il vient de publier de la riche Collection de Tableaux de seu M. de Julienne.

7°. Enfin notre Ribliachéque, peu nombreuse à la vérité, mais qui contient une suite assez complette des meilleurs Livres qui ont paru sur l'Histoire Naturelle.

Afin de ne sien laisser à désirer de tout ce qui pouvois contribuer à rendre ce Catalogue utile, on y a joint des Tables Alphabétiques & Synoptiques, avec des Gravures d'un certain nombre de morceaux rares ou nouvellement connus, & sur-tout de ceux qui n'avoient point encore été gravés: nous comptions en donner un plus grand nombre; mais le tems ne nous l'a pas permis: les Planches mêmes ont été

PRÉFACE.

zzvi

finies trop tard, pour que nous puissons les citer dans le corps de l'Ouvrage. La Table Alphabétique est suivie d'une Explication succincte de ces Planches; avec un renvoi à chacun des articles du Catalogue où il en est parlé.



TABLE SYNOPTIQUE

DU PREMIER VOLUME.

PREMIERE PARTIE.	. ;
	age 1;
ORDREI.	್ರಾಧ್ಯ
Polypiers socides ou pierreux	•
Gre 1. Coraux.	5
2. Madrépores.	1 1
3. Astroites.	21

2. Madrépores.	1 1
3. Aftroues.	2 [
1. 4. Tubipores.	24
. Millepores.	26
6. Rétépores.	3a
7. Méandrites.	32
8. Fongipores.	·· 36

ORDRE II.

POLYPIERS MOUX OU FLEXIBLES.

Gte	1.	Faux Coraux.	43
•.	2.	Lithophytes.	47
•		Corallines.	56

TABLE.	٠
G 4- Escares mostles.	36
5. Eponges.	59
6. Alcyons.	66
SECONDE PARTIE.	•
Coquities	7 E
SECTION, L.	
Coquieles de mer.	75
CLASSE.L.	,
Coquilles de Mer, univalves	
FAMILLE I.	
L É P A S.	
Ga 1. Lépas entiers.	78
' 2. percés au sommet.	88
3. chambrés.	89
4. à appendice en demi-cornet	. 9 E
FAMILLE II	
Oreilles de mer.	
1. Oreilles de mer, à trous.	93
2. Sans trous.	95

-	SYNOPTIQUE.	ZX.
	FAMILLE III.	
	TUYAUR DE MER.	
Ģ≈ 1. T 2.	uyaux de mer, simples ou isole groupés ou Ver	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
	culaires.	102
3.	non testacés.	104
	FAMILLE IV.	
	NAUTILES.	
a. J	Vauciles chambrés.	: 107
2.	non chambrés.	COL
	FAMILLE V.	r
	Limaçons.	
z. 1	imagons à bouche ronde.	110
2.	à bouche demi-ron	de,
	dits <i>Nérites</i> .	116
3.	à bouche ovale, dits	Sa-
	baes.	123
	FAMILLE VI.	
	Buccins.	
1. B	accine à bouche entiere.	133
2.	à bouche échancrée.	136

à pétite queue.

143 : 155

TABLE

FAMILLE VII.

	Rochers.	
Gre 1. Re	ochers sans queue.	159
2.	à petite queue.	168
3.	aîlés, sans pattes.	179
4.	aîlés, à pattes.	. 188
•	FAMILLE VIII.	
	Pourpres.	
1. Pa	ourpres à petite queue.	₹94
2.	à longue queue.	202
	FAMILLE IX.	
	Tonns.	
1. To	nnes à bouche entiere.	206
2.	à bouche échancrée.	208
3.	à queue.	216
	FAMILLE X.	
	V a s.:	
1. Vi	s listes,	219
2.	Arićes.	221
3.	tuberculeuses.	226
•	FAMILLE XI.	
	VOLUTES.	
1. 70	lutes coniques, on Cornets.	212

SYNOPTIQUE.	xxx
Gre 2. Volutes cylindriques, on Rouleaux	. 25E
3. échancrées, ou Olives.	257
FAMILLE XII.	
Porcelaines.	•
1. Percelaines à bouche moins étroite	. 264
2. à bouche plus étroite.	-
CLASSE II.	
Coquilles de mer bivalves	; <u>.</u>
FAMILLE I.	
· Huitres.	
1. Huisres proprement dites.	- 28e
2. feuilletées.	193
3. épineules.	298
4. Anomies ou Térébratules.	311
FAMILLE II.	
Peignes.	:
1. Peignes à oreilles égales.	316
2. à oreilles inégales, dis	3
Péconcles.	319
3. fans oreilles.	327
FAMILLE IIL	
CAMBS.	
1. Cames à bases rondes régulieres.	32男

;

Gr. 2. Cames à bases rondes irr à bases ovales rég 4. à bases ovales irr	ulieres339
FAMILLEI	y.
C OR UR'S.	"
1. Caurs proproment dits.	-349
2. Arches. 3. Cames tronquées ou Conqu	357. uaa da Wamus
, cantes tronquees ou conqu	ces at 7 thas.
FAMILLE	
Tellines.	•
. Tellines béantes à une e	zarémité. 470
2. béantes aux de	
з. Manches de comeau.	,378
FAMILLE V	7 I.
Moules.	•
1. Moules proprement dice	s, 380
; 2. cylindriques, or	Dartes. , 386
3. triangulaires, marines.	ou <i>Pinnes-</i> 488
•	
CLASSE II	I.
Coquitles de mer mul	TIVALVES.
FAMILLE	I.
DECABRIONS.	392
•	FAMILLE

TABLET

iexxlj

·	•
SYNOPTIQUE.	azizii j
FAMILLE II.	
PHOLADES.	-
G ^{re} 1. <i>Pholades</i> fextivalves.	396
2. quintivalves.	397
FAMILLE III.	
TUYAUX.	
1. Tuyaux trivalves.	398
2. quintivalves.	39 9
FAMILLE IV.	
Glands de mer.	401
FAMILLE V.	•
Conques anatiferes et Poucepieds	401
FAMILLE VI.	
Oursins.	
Gn I. Turbans.	410
2. Caurs marins.	418
3. Eufs marins.	ibid.
4. Pavois on Boucliers.	. 411
5. Gâteaux ou Beignets.	424
6. Rotules.	425
SECTION IL	
Coquilles fluviatiles.	427.
Tome I.	
•	

•

١

•

•		71	T.
-	44	-	Ψ.

TABLE

SECTION III.

Coquilles terrestres.

436

TROISIEME PARTIE.

ZOOPHYTES.

45 I

FAMILLE I.

Etoiles de Mer.

Gre 1. Etoiles de mer, à rayons fendus 454 2. à rayons entiers. 464

FAMILLE IL

Mollusques.

469

QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉE.S.

Gn 1. Grustacles à corps allongé. 471

. à corps large. 47

à corps arrondi. 474

CINQUIEME PARTIE.

Poissons.

4.

475

TABLE SYNOPTIQUE.	XXXV
SIXIEME PARTIE.	
Amphibies.	478
SEPTIEME PARTIE.	
Insectes.	484
HUITIEME PARTIE.	
OISEAUX.	490
NEUVIEME PARTIE.	
QUADRUPEDES.	49£
DIXIEME PARTIE.	
L'Homme.	500

L'Homme. 500

APPENDICE

Bezoards et Calculs. 501

ONZIEME PARTIE.

Végétaux. 509

APPROBATION

DE M. ADANSON.

DE l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, Cenfeur Royal.

J'AI lû, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier; un Ouvrage intitulé: Catalogue systématique & raisonné des Curiosités de la Nature & de l'Art, qui composens le Cabinet de M. DAVILA; & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression.

Ce Cabinet, vraisemblablement le plus riche qu'aucun Particulier air encore formé, sur tout quant à la partie de l'Histoire Naturelle, est d'autant plus précieux qu'il renserme des Suites immenses des productions des trois Regnes de la Nature. Il seroit sacheux que certe Collection, qui nous est très-connue, & qui est destinée à être mise en vente, sût démembrée & dispersée dans divers petits Cabinets particuliers, étant très-digne de l'attention de quelque Souverain qui en seroit l'acquission, autant par magnificence que pour procurer à ses Peuples des objets de connoissances naturelles, dont l'application bien entendue mene le plus souvent à quelque chose d'utile pour le commerce de la Société. Fait à Paris, se 13 Mai 1767.

ADANSON.



CATALOGUE

RAISONNÉ DES CURIOSITES DHISTOIRE NATURELLÉ

DU CABINE,T
DE M. D'AVII. À.

PREMIERE PARTIE.

POLYPIERS

toutes les productions marines qui ont été prises si longtems pour des plantes, & que les découvertes de MM. Peys-sonel, Tremblay, de Réaumur, de Jussieu, Ellis & Donati ont démontré appartenir au Regne animal. On peut voir dans les Traités de ces sçavans Naturalistes les preuves nombreuses eti

ľoly⊲ Pier¢ POLY-

autorisent ce sentiment. Sans entrer dans de plus grands détails à cet égard, nous nous contenterons de dire ici que ces productions si singulieres & si variées sont l'ouvrage & la demeure d'animaux encore peu connus à cause de leur petitesse, auxquels on a donné le nom de Polypes. Ces Polypes que le Comte de Marsigly & quelques autres ont cru être les fleurs de ces prétendues · Plantes, ne sont peut-être eux-mêmes que des fourreaux minces & déliés remplis d'animalcules presque imperceptibles (a); mais que le Polype soit pris pour famille ou pour individu, il n'en est pas moins constant que les productions dont nous allons parler font autant de ruches extrêmement peuplées, comme il est aisé de s'en convaincre en les observant au microscope, lorsqu'elles sont encore dans leur élément : on

⁽a) Voyez la Lettre de M. de Romé de l'Isle à M. Bertrand sur les Polypes d'Eau douce. Paris, La Combe, 1766, in-12.

voit alors des milliers de Polypes sortir Porr de toutes les tubules dont elles sont garnies, & y rentrer avec précipitation lorsqu'on les tire hors de l'eau. Les habitations de cette Classe d'Etres animés sont aussi variées dans leur forme que dans leur tissu. On peut néanmoins les réduire à deux Ordres principaux, dont le premier comprendra les Polypiers de substance solide ou pierreuse; & le second, les Polypiers de substance molle ou flexible. Il auroit peut être été plus exact d'établir nos classifications sur la forme propre & individuelle des animaux qui habitent & construisent ces Polypiers; mais, faute de connoissances assez étendues sur cet objet, nous adoptons les divisions qu'a établi le célebre Wallerius pour les Polypiers fossiles, & celles de M. Ellis

pour les Corallines, en y faisant quelques légers changemens qui nous ont paru propres à jetter du jour sur cette

partie de l'Histoire Naturelle.

Le premier Ordre de cette Classe

contient huit Genres, qui sont

- 10. Les Coraux proprement dits.
- 2°. Les Madrépores.
- 3°. Les Astroïtes.
- 4°. Les Tubipores.
- 5°. Les Millepores.
- 6°. Les Rétépores.
- 7°. Les Mæandrites.
- 8°. Les Fongipores.

Le second ordre est composé de six Genres, qui sont

- 1'o. Les Faux Coraux.
- 2°. Les Kératophites ou Litophites.
- 3°. Les Corallines.
- 4°. Les Escares molles.
- 5°. Les Éponges.
- 6°. Les Alcyons.





ORDRE PREMIER.

POLIPIERS

DE SUBSTANCE SOLIDE OU PIERREUSE

GENRE PREMIER.

Ce sont des Polypiers d'une substance dure & compacte, intérieurement massive, pleine & solide, sans aucun trou ni porosité apparente, quoiqu'elle soit revêtue d'une écorce tartareuse garnie de tubules & de petits trous. On enleve aisément cette écorce dans l'instant que le Corail sort de l'eau; mais après qu'il a été exposé à l'air un certain temps, on ne peut la détacher sans la réduire en poudre. C'est dans les tubules qui la composent que logent les animaux du Corail. Tous les Polypiers de ce genre sont ordinairement branchus, légerement striés, & présen-

A iij

CORAUX. tent aux yeux la figure d'un Arbrisseau dépouillé de ses seuilles : la grosseur de la tige n'excéde guère un pouce, & sa plus grande hauteur est d'un pied ou un peu plus.

ARTICLE I. Un très-bel Arbrisseau de Corail rouge, revêtu en partie de son écorce, portant onze pouces de haut sur huit de large, monté sur un pied de bois des Indes (a). Ce morceau, qui est d'une forme très élégante, est encore remarquable par deux branches qui se sont trouvées cassées dans le tems qu'il étoit dans la mer, lesquelles étant tombées entre les autres branches, s'y trouvent comme collées & recouvertes de la même écorce qui envelope le reste. Cet accident est d'autant plus curieux qu'il peut contribuer à rendre raison de la formation du Corail.

2. Un autre Arbrisseau de même Corail, entierement revêtu de son écorce, ayant sept pouces de haut sur huit de large. Il adhére par sa base à une espéce de rocher qui paroît avoir

⁽a) Nous avertissons une fois pour toutes que presque tous les Polypiers des Articles suivans sont pareillement montés sur des pieds de bois des Indes, ou de bois noirci, excepté ceux qui ont un support naturel, ou quelqu'autre support particulier dont nous parsétons à leur Article.

été formé d'un assemblage confus de divers CORAUX, Polypiers.

3. Un magnifique Arbrisseau de Corail rougesanguin, dépouillé de son écorce, & dont les branches s'étendent en éventail. Ce morceau qui est monté sur un pied de bois noir, orné de carrouches de cuivre doré, est un des plus grands que l'on connoisse. Il porte neuf pouces de haut sur un pied de large, & est presque semblable à celui dont parle Séba *.

4. Un autre d'un rouge plus foncé que le de son Cabiprécédent, à branches dispersées en tout sens, pl. 115, N° monté sur un pied de cuivre doré en or moulu enrichi de bordures, dentelures & fleurons de même Corail. Ce morceau, haut de cinq pouces & large de neuf, est des plus curieux.

s. Un autre Arbrisseau d'un rouge pâle, mais remarquable par la grosseur extraordinaite de ses trois principales branches, dont une a plus d'un pouce de diametre, & les autres un peu moins. Le tronc a près de trois pouces de diametre dans sa plus grande largeur. Toute la pléce a sept pouces de haut sur neuf & demi de large.

6. Un autre d'un rouge plus foncé que le précédent. Il se partage en deux branches principales d'une belle grosseur. Sa hauteur est de neuf pouces neuf lignes sur neuf pouces de large.

A iv

CORAUX.

- 7. Un autre de la plus riche couleur & parsifaitement beau. Il a six pouces de haut sur cinq de large, & est monté sur un pied de laque de même couleur, imitant le Corail.
- 8. Un autre d'un beau rouge foncé. Ce morceau est enrichi de deux grandes huîtres & d'un tube vermiculaire de deux lignes de diametre, lesquels sont recouverts de la substance même du Corail.
- 9. Un magnifique Arbrisseau de vrai Corail blanc, portant huit pouces de haut. Il est en tout semblable au Corail rouge, à la couleur près, ce qui le rend très rare.
- 10. Trois petits morceaux de Corail, rares & des plus curieux; sçavoir, un morceau de Corail en partie rouge & en partie blanc. Un traversé dans toute sa longueur par une branche de l'Espéce des Kératophites, connue sous le nom de Corail noir. Celui-ci est d'un beau noir luisant, & sert de base au Corail rouge qui l'enveloppe. Une interruption qui se trouve naturellement vers le milieu de ce morceau, en laisse voir tout le mécanisme. Et une branche de faux Corail noir, revêtue d'une croute grissère & celluleuse qui est elle-même recouverte d'une couche de vrai Corail rouge, dont les fractures laissent appercevoir les couches intérieures.
 - 11. Deux piéces de Corail rouge avec son

corce, dont une fait partie d'un groupe de CORAUX, différens Polypiers entassés l'un sur l'autre en forme de rocher; tels que des Eponges, des Litophites, des Corallines, des Tubes vermiculaires & quelques petites Anomies. L'autre est aussi chargée de ces Corps étrangers.

12. Deux autres Groupes du même Corail & des mêmes Polypiers, sur chacun desquels on remarque de plus une huître complette. Celle du plus petit est blanche, feuilletée & peu commune.

13. Seize petits morceaux de Corail, trèsintéressans pour ceux qui en étudient l'Histoire; sçavoir, 10. Cinq de Corail blanc de différentes nuances, l'un desquels se divise en deux branches de forme applatie & très minces, & un autre fort singulier dont l'extrêmité supérieure s'applatit & s'élargit en forme de feuille. 2°. Un petit échantillon de Corail blanc & rouge. 3°. Un petit pied de Corail rouge qui différe des autres espéces connues, en ce que ses stries sont plus profondes sur-tout vers l'extrêmité des branches. 4°. Un morceau dont les branches sont entrelacées les unes dans les autres, & qui paroît être une variété. 5°. Trois morceaux, dont un de Corail blanc, un de Corail noir, & un de Madrépore branchu, remarquables en ce qu'ils sont revêtus de Corail touge, 6°. Un autre morceau des plus extraor-

CORAUX. dinaires; c'est une branche de Corail rouge, converte d'une croute grisâtre; laquelle est elle-même recouverte par une seconde couche de Corail rouge qui a conservé une partie de son écorce. Entre ces deux couches est renfermé un Tube vermiculaire assez considérable. 7°. Un Galet & trois petites Valves d'Huîtres, dont deux feuilletées, avec des branches de Corail qui y sont adhérentes. 8°. Une petite Anomie aussi chargée de Corail.

14. Un petit Bocal très-curieux contenant quelques branches de Corail rouge, chargées de leurs Polypes des mieux conservés dans une liqueur appropriée. On voit très-distinctement leurs bras étendus en forme d'étoiles, & semblables aux pétales d'une petite fleur blanche.

15. Vingt échantillons de Corail numérotés 1=20; où l'on trouve toutes les gradations de sa couleur depuis le rouge le plus pâle jusqu'au rouge le plus foncé. Plus, sept douzaines de grains de même Corail de la grosseur d'un gros pois, dont chaque douzaine aussi numérotée offre une variété de nuances très-suivie. Ces échantillons ont été envoyés de la manufacture de Naples.

GENRE SECOND.

MADRÉPORES.

POLYPIERS d'une substance dure & MADE pierreuse, moins compacte que la précédente, composés de branches en forme d'Arbrisseau, garnis de tubules. sans écorce, percés d'une foule de trous étoilés, la plûpart très-sensibles & d'une forme réguliere qui est toujours la même dans chaque espéce, quoiqu'elle varie à l'infini dans les espèces différentes; les Madrépores différent des Coraux simples par les pores étoilés dont ils sont pourvus & par le défaut d'écorce. Les Polypes qui les habitent occupent l'extrêmité des cellules.

16. Un très - beau Madrépore blanc de la Méditerranée à rameaux arrondis, lissés, tortueux, entrelassés les uns dans les autres, parsemés de grands trous ou pores, assez éloignés les uns des autres, débordant un peu la super- 106, N°. 1 & ficie, étoilés & cannelés en-dedans; connu sous 2. Gualtieri ind. testar. le nom de Corail blanc oculé *. Ce morceau, N°. 3.

Madré-Pores. qui est d'une blancheur parfaite, forme un Arbbre de neuf pouces de haut sur autant de large.

17. Un autre Madrépore blanc oculé de la même espèce, à branches plus nombreuses & plus déliées. Il porte onze pouces de haut sur 10 de large.

18. Trois autres Madrépores; sçavoir., un blanc oculé de l'Amérique, à étoiles moins éparfes que le précédent; un, en buisson, couleur lilas, à petites branches rameuses, semées de pores étoilés assez saillants. Le troisième est d'un très beau violet à petites branches chagrinées, un peu applaties & comprimées. Ces branches ont les deux surfaces séparées par une suite de petits trous qui regnent le long des côtés, ce qui leur donne l'apparence de deux piéces appliquées l'une sur l'autre. Ces trois morceaux ne sont pas communs.

19. Un rare & bel Arbissean de Madrépore blanc étoilé des Indes, à étoiles plus nombreuses, moins profondes, moins faillantes & à moins de rayons que celles des mécédens; la surface des branches & du tronc paroît à la loupe comme grainelée. Il est monté sur un support de bois des Indes qui entre à coulisse dans une boëte du même bois & vitrée.

20. Un autre Madrépore branchu étoilé, de la même espèce que le précédent. Il est remarquable en ce qu'il s'est formé sur un gros Lithophite, dont il recouvre deux des principales MADRÉbranches; il est aussi chargé de plusieurs huî- PORIS. tres. Les autres branches du Lithophite qui s'étendent en éventail sont recouvertes de l'écorce tartareuse, rouge & celluleuse qui leur est propre.

20 bis. Un Madrépore branchu des Indes Orientales, rare, blanc de lait, à branches fines, nombreuses, chargées de petites tubules étoilées, fort serrées. Sa forme est des plus gracieuses, & il adhère par sa base à un Polypier en forme de concrétion blanche & branchue de l'espéce des faux Coraux.

21. Un très-grand Madrépore rameux de la Méditerranée, à étoiles larges & profondes situées aux extrêmités des branches; le reste de sa superficie est simplement strié, sans pores sensibles, & tire sur le rougeatre *. Cet arbre mer Adriatique qui est d'une bauté surprenante, porte dixneuf pouces de haut sur autant de large.

22. Un autre de la même espéce, grisatre, à branches moins grosses, & portant treize pouces de haut sur dix-sept de large.

23. Un autre des commes espéce & couleur, mais d'une nature beautoup plus compacte, & à branches très grosses. Ce morceau, qui est d'une pesanteur remarquable pour un Madrépore, 2 14 pouces de haut sur autant de large.

24. Un autre de même espèce, chargé de

MADRÍ- branches de Corail rouge, de Tubes vermicu-

laires, d'Huîtres, d'Anomies, de Corallines & autres Corps marins qui rendent cet article fort curieux. Il a onze pouces de haut sur autant de large.

25. Un autre avec les mêmes accidens, mais moins large.

26. Un autre semblable de treize pouces de haut sur sept de large.

27. Un très-grand Madrépore abrotanoide gris-jaunâtre, appellé Bois de Cerf, à rameaux arrondis, pointus, dont toute la superficie est hérissée de Tubules saillantes, étoilées en-dedans. Ce beau morceau porte vingt-cinq pouces de haut sur vingt trois de large.

28. Un autre Madrépore Bois de Cerf, adhérent naturellement à un grand Millepore, d'un blanc sale, étendu en éventail, dont l'extrêmité des feuilles est profondément decoupée. A cette particularité près, ce groupe ressemble parfaitement, tant pour la grandeur que pour la forme,

Descr. de à celui qui est représenté dans Séba *.

29. Un autre Madrépore de même espéce gris-cendré, à grosses branches, se subdivisant vers l'extrêmité en plusieurs rameaux en forme de bouquets. Il porte quinze pouces de haut sur autant de large.

30. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un gris-jaunâtre en forme de bouquet, à branches minces & pointues, garnies de Tubules plus saillantes que dans l'espéce précédente, ce qui lui a fait donner le nom d'Épi de Bled; & un en forme de buisson d'un blanc-bleuâtre, à branches plus grosses & plus rassemblées, également hérissées de longues Tubules. C'est le Madrepora albida digitata de Gualtieri*.

Madré-Pores.

* Ind. teftar.

- 31. Un Madrépore blanc en buisson, de six pouces & demi de diamètre, d'une forme arrondie très-agréable, à branches minces & petites, partant en grand nombre d'un même tronc d'où elles s'élevent en tout sens. Elles sont chargées de Tubules saillantes, étoilées endedans comme les espéces précédentes.
- 32. Un autre Madrépore en buisson, à branches plus grosses, & d'un beau blanc de neige, de forme presque ronde & de la plus parsaite conservation. Il a dix pouces de diamètre, & est porté naturellement sur son pied qui est aussi garni de Tubules, mais moins saillantes que celles des branches.
- 33. Un autre Madrépore en buisson, de couleur grise, ayant près d'un pied de diamètre. Il est pareillement porté sur une base de même nature que le reste.
- 34. Un beau Madrépore branchu, blanc sale mêlé de rouge, à branches épaisses, tuberculeuses qui s'élevent ensemble de la tige dans

MADRÍ- une direction presque verticale, larges & fourports chues aux extrêmités. Leur surface est entiere-

- * Gualtieri ment couverte de petits pores étoilés *. Il porte ind. test. N°. neuf pouces & demi de haut sur huit & demi de large.
 - 35. Un très-beau Madrépore de la même espèce, blanc-sauve, à branches plus nombreuses, dont les principales se subdivisent en d'autres plus petites & comprimées qui s'étendens
- *Idem. N°. en différens sens, & imitent les Choux fleurs *.

 Il a onze pouces de haut sur presque autant de large.
 - 36. Un autre de même espéce d'un très beau blanc, de sorme ovale. Son plus grand diamètre est de neuf pouces & demi, & sa hauteur de cinq pouces & demi.
 - 37. Un autre d'un blanc-jaunâtre, à branches plus larges, plus applaties & plus éparfes, mais du reste semblable au précédent. Il adhére à un autre Madrépore de forme orbiculaire. dont toute la surface est parsemée de petites étoiles, & qui lui sert de base. Ce morceau, des plus agréables, a dix pouces de haut sur quatorze de large.
 - 38. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un blanc rougeâtre, en forme de buisson, à petites branches qui se subdivisent de tous côtés en d'autres plus petites à plusieurs sourches, & adhérent à une branche de l'espéce

pèce décrite Art. 27, sous le nom de Bois de MADRI Cerf. L'autre est de même espèce que celui de PORIS. l'Art. 35.

30. Deux autres de moyenne grandeur, dont un de l'espèce du premier de l'Art. précédent, & un de celle de l'Art. 3 ?.

40. Un autre Madrépore blanc, en buisson, à branches fort serrées, fourchues & tuberculeuses. Cette espéce paroît tenir le milieu entre celle de l'Art. 35 & la premiere de l'Art. 38.

41. Un Madrépore gris, à rameaux arrondis, fort serrés les uns contre les autres, épais, mousses & noueux aux extrêmités, parsemés de pores étoilés, très-petits. On remarque à sa base * & sur quelques-unes de ses branches, des * séba, tom: Madrépores agaries qui s'y sont attachés. Ce No. 11. morceau, qui a cinq pouces & demi de haut sur huit de large, est fort grand pour son espéce.

- 41. Deux Madrépores en buisson, dont un de moyenne grandeur, blanc-jaunâtre, à branches sinueuses & tortues qui se joignent par les côtés en façon de treillis. Elles sont hérissées de tubules & chargées de petits rameaux qui forment, en s'élevant, une espèce de coupe à bords évasés; & un de l'espèce du premier de l'Art. 38.
- 43. Deux autres, dont un de l'espèce du premier de l'Article précédent, & un de celle de l'Art. 35.

Tome I.

PORES.

3, pl. 113.

44. Un grand & rare Madrépore gris-obscur, à rameaux larges & applatis, semblables aux Cornes de Daim; leur superficie est hérissée séba, tom de tubules *. Ce morceau porte un pied de haut sur dix-huit pouces de large.

- 45. Un autre, blanc-sale, ressemblant à une grande feuille contournée, dont les bords se rapprochent un peu en forme de cornet. On remarque çà & là dans l'intérieur quelques reiettons de la même forme. Ce Madrépore est couvert de tubules fort saillantes, & connu fous le nom de Char de Neptune, il porte vingt-& un pouces de haut sur vingt de large.
- 46. Un autre Char de Neptune de moyenne grandeur.
- 47. Deux jolis Madrépores de moyenne grandeur, dont un d'Amérique, rare, de forme mince & applatie, semblable à l'Agaric, à surface supérieure couverte de sillons ondu-Séba, pl. leux & étoilés *, & un de l'espèce de l'Article précédent, mais de couleur plus blanche.
- 48. Un Madrépore agaric de forme trèsgracieuse; dissérent du précédent en ce que ses feuilles sont en grand nombre, & ont nonseulement la surface supérieure, mais encore l'inférieure couverte des mêmes sillons ondu-* Séba, ibid. leux & étoilés *. Il porte dix pouces de haut sur neuf de large.

49. Un autre de même espéce, mais de forme différente.

Madrá. Pores.

- 50. Un Madrépore agaric en forme d'éventail.
 51. Un autre à plusieurs seuilles, diversement
- 52. Un Madrépore, nommé Calice ou Taffe, fait en forme d'entonnoir, & duquel les surfaces intérieure & extérieure sont légerement cannelées & hérissées de petits trous étoilés peu saillans *.
- 33. Cinq petits Madrépores rares & d'ef- Gualtieri. inpeces différentes; sçavoir, un à petites bran-dex testar. ches chargées de rejettons tortus & frisés, disposés en éventail & couverts de petits grains arrondis & inégaux dont ils paroissent hérisses *. * Guakiers, ind. test. N°. Un en forme d'If, à tige principale environnée 1231. dans toute sa longueur de petites branches alternes & fourchues, forées à l'extrêmité de tabules plus sensibles que dans les autres patties. Un en petit buisson, à branches arrondies, se croisant & s'entrelaçant de maniere à former une espéce de réseau à jour malgré son épaisseur. Elles sont parsemées de petits pores étoilés. Un à feuilles crêpues & fort serrées, parsemées en entier de pores étoilés très-sensibles. Et un en forme d'Agaric, d'une espéce particuliere. La surface supérieure de ses feuilles est criblée çà & là de larges & profondes étoiles, légerement saillantes, & dont les stries

ont i B i j Madrí-Pores. prolongent sur les parties des seuilles qui en sont dépourvues. On y remarque aussi quelques gros tubercules striés comme le reste.

- Agaric à surface extérieure parsemée de pores étoilés peu saillans, assez larges, & dont les stries sont en-dedans, adhérant à un gros gallet qui sert aussi de support à quelques Astroites & à un petit Madrépore, peu dissérent du second de l'Article précédent; un de l'espèce du premier de l'Article 38, formant un petit bouquet sur un autre Madrépore auquel il adhére; & un de l'espèce du quatrième de l'article précédent.
- 55. Quatre petits Madrépores; sçavoir, un rare de Curaçao, à branches peu nombreuses, larges, épaisses, tuberculeuses, dont l'extrêmité est applatie & comprimée. Toute sa superficie est couverte de pores étoilés comme l'espéce de l'Art. 41, dont il paroît être une variété. Un Madrépore agaric, semblable au premier de l'Art. 47. Un Madrépore branchu de l'espéce décrite Art. 41; & un semblable au second de l'Article précédent.
- 55 (bis). Un Madrépore Agaric blanc, trèsrare, à partie supérieure, revêtue de protubérances cylindriques grosses, étoilées, plus ou moins faillantes, formées de lames très finement dentelées, qui en rendent la surface comme veloutée. La partie inférieure ne différe en rien de celle des

autres Madrépores Agarics. Ce morceau curieux nous est arrivé depuis peu des Indes.

GENRE TROISIÉME.

ASTROÏTES.

POLYPIERS de la nature des précédens, & qui n'en différent que par leur ASTROITES structure. Ils sont composés de tubes parallèles joints ensemble par leurs côtés, & dont la cavité est remplie de plusieurs lames qui partent de leurs parois & vont aboutir à un centre, ce qui forme des étoiles rondes, ovales ou anguleuses plus ou moins grandes & à plus ou moins de rayons. Les Astroïtes différent des Madrépores en ce qu'ils ont des pores étoilés joints & parallèles qui n'en font qu'une seule masse, & des Tubipores, en ce que ceux ci ont des tubes fourchus & irréguliers fort faillans & non parallèles. Les Polypes des Astroïtes occupent l'extrêmité des cellules comme dans les Madrépores.

56. Un très bel Astroïte oblong, à partie supérieure convexe, & inférieure applatie, à Biii

Astroites, grandes étoiles orbiculaires bordées de petits jets faillants qui se répandent de tous côtés dans *Seba, pl. les interstices des étoiles*. Il porte seize pouces de long sur neuf de large.

57. Un bel Astroite globuleux, à petites étoiles radiées, qui vont en pente vers le mi** Seba, ph lieu, & dont les bords ne sont point frangés *.

Ce morceau, d'une beauté singuliere, est de forme orbiculaire applatie, & groupé avec un autre de même espéce & de même forme auquel il tient par une espéce d'étranglement. Ce groupe est encore embelli par un grand Millepore feuillu, étendu en forme d'éventail, & par un Madrépore agaric de l'espéce décrite Art.

47. Le tout porte vingt & un pouces de long fur quatorze de large.

58. Un Astroite globuleux à pores étoilés, amples, non-arrondis, mais anguleux; les jets * seba, pl. dont ils sont bordés sont minces & élevés *. Il adhére à un joli Madrépore en buisson de l'espèce de l'Art. 31, & porte neuf pouces de haut fur sept de large.

59. Deux Astroites, dont un en forme de calotte tuberculeuse, parsemée de petits pores * 5.ba, pl. étoilés fort nombreux *, & posée naturelle112, N°. 18. ment sur une base de même nature & un peu feuilletée. Cet Astroite vient de Curaçao, où it est commu sous les noms de Tête de More, ou de Perruque à l'Angloisé. L'autre est de même

espèce, mais en forme de rocher, & percé çà Astroites. & là de tubes cylindriques très-prosonds qui paroissent l'ouvrage de quesques Polypes parasites qui s'y logent.

60. Un autre en forme de monticule creusée par de prosonds & larges sillons, inégaux entreux. Cet astroite à petites étoiles, & de même espèce que le précédent, a été trouvé sur la patte d'un ancre de vaisseau dans les Indes Orientales. Il adhére dans toute sa base à une plaque du fer de l'ancre sur laquelle il s'est formé, ce qui le rend sort curieux.

61. Un Aftroite mince & feuilleté en forme d'Agaric. La surface supérieure de ses seuilles est parsemée de petits pores étoilés sort nombreux comme l'espèce de l'Article précédent dont il parost être une variété. Il est de figure arrondie, & porte treize pouces de diamètre.

62. Deux Astroïtes globuleux, rares & d'une belle grandeur, dont un à larges & très profondes étoiles irrégulieres, dont les bords sont minces & élevés; & un à étoiles arrondies, dont les bords larges & lamelleux sont séparés par de petits intervalles sur lesquels les lames se prolongent *.

63. Dix Astroites de diverses grandeurs; scavoir, deux à larges étoiles arrondies de l'expéce de celles de l'Article précédent; trois à étoiles arrondies, mais plus petites & de l'es-

* Seba ,pl 111. N°. 15. ASTROÏTES. péce de l'Article 56; un de l'espèce de l'Arti57; un en forme de poire à étoiles irrégulières, de l'espèce de celles de l'Article 58, mais dont les bords sont plus larges; deux de forme globuleuse un peu tuberculée, à très-petites étoiles, de l'espèce de l'Article 59; & un coupé en dissérens sens pour faire voir le méchanisme des cellules intérieures.

GENRE QUATRIÉME.

TUBIPORES.

Tubipores Polypiers dont la substance ne distére en rien des précédens. On ne les en distingue qu'à cause de leurs petits tuyaux sort saillants, quelquesois bisourchus, ramassés en une masse solide en forme de buisson. Ces tuyaux sont étoilés comme ceux des Astroïtes, mais au lieu d'être joints ensemble par leurs côtés, ils sont isolés en partie & ne sont joints que par leur base. L'animal occupe la même place que dans le Genre précédent.

64. Un très-beau Tubipore de la Méditer-

ranée en forme de buisson, à tuyaux longs, Tubipores bisourchus, isolés, & prosondément étoilés: ils s'élevent en tout sens d'un centre commun, qui leur sert de base; ce morceau porte cinq pouces de haut sur six de large, & est grand dans son espèce *.

engagés en partie dans une concrétion pierreuse, qui leur donne une forme orbiculaire *. * Seba, pl. Ces tuyaux sortent plus ou moins de la matière pierreuse qui les enveloppe, & sont plus épars que dans l'espèce précédente dont ils sont une variété.

65 (bis). Un autre aussi des Indes, mais rare, à tuyaux plus gros, plus saillans & à étoiles sormées de lames minces, déliées, presque perpendiculaires, & disposées à-peu près comme dans l'Œilles de Mer,



GENRE CINQUIÉME.

MILLEPORES.

MILLE-

Polypiers qui différent des Madrépores, des Astroites & des Tubipores, en ce que dans ceux-ci les étoiles se présentent d'une manière très-distincte, au lieu que les Millepores n'ont que des trous simples non-étoilés, du moins ils ne le paroissent pas à l'œil. Ces Polypiers ont communément la forme d'arbre ou de buisson, rameux ou seuillus comme les Madrépores: leur superficie est couverte de petits trous quelquesois peu sensibles, même à la loupe, qui pénétrent dans l'intérieur, & servent de retraite aux animaux qui les bâtissent.

66. Un rare & beau Millepore de Curaçao, à feuilles blanchâtres, larges, minces, étendues & piquées de petits trous ronds; il reffemble à un grand choux qui ne feroit pas pommé, ce qui peut le faire appeller Millepore à feuilles de Choux. L'huître extraordinaire

dont parle Séba * peut donner une idée des fetril- MILLEles de ce Millepore, que nous n'avons trouvé gravé dans aucun Auteur.

89. Nº. 10.

- 67. Un autre de même espéce, mais à feuilles plus épaisses, moins éparpillées & plus serrées, dont les extrémités ont des plis & replis qui imitent la fraise de veau. Il a quinze pouces de haut fur dix-huit de large.
 - 68. Un beau Millepore de Curação, de même hauteur & largeur que le précédent, & grandes feuilles travaillées à jour, profondément dentelées & frangées dans leurs extrémirés.
 - 69. Un autre de même espéce, adhérent à une grosse Cérébrite, qui lui sert de support. Ce groupe magnifique est encore embelli par différentes espèces d'Astroites & de Méandrites naissantes qui font au pied. Il porte quinze pouces de haut fur un pied de large.

70 Un autre Millepore de forme très-agréable, à feuilles aplatties, mmces, nombreuses & profondément découpées. Il porte treize pouces de large sur huit de haut, & est monté fur un pied de bois doté.

71. Deux Variétés de cette espèce, dont une 1 dentelures plus allongées, plus droites, & en. forme de petites mains étendues, qui l'ont fait appeller Digitata; l'autre incruste les branches MILLEPO-

d'un Lithophyte porté sur un petit pied de bois marbré.

- 72. Deux autres Variétés de moyenne grandeur, dont une en éventail, à branches applaties, s'entrelaçant en façon de grillage, & une moins évafée, ayant pour base naturelle un groupe d'Astroïtes & de Corallines.
- 73. Un autre de même espéce, mais trèsremarquable, en ce qu'il s'est formé sur une grosse bouteille, dont il revêt la superficie. Toutes les branches seuillues de ce Millepore sont adhérentes au goulot de la bouteille, d'où elles s'étendent en dissérens sens & sorment un bouquet aussi agréable que curieux. Les Polypes ont étendu leur ouvrage tout autour des bords du goulot, sans en fermer l'orifice ni pénérrer en-dedans, comme on s'en est assuré par une ouverture pratiquée au ventre de la bouteille pour voir dans l'intérieur. Ce morceau intéressant a été pêché à la Barbade.
- 74. Un beau Millepore en buisson, à branches moins applaties, dont les extrémités se terminent en rameaux bisourchus, arrondis & pointus. Il porte dix pouces de haut sur quinze de large.
- 75. Un grand Millepore des Indes., rare & des mieux conservés, à branches chargées de rameaux nombreux & délicats, diversement contournés, s'entrelaçant les uns dans les au-

res, & formant un buisson des plus épais, MILLEPOd'une figure agréable. Ce morceau a quinze RES. pouces de long sur quatorze de large.

75 (bis). Trois jolis Millepores, dont un à branches courtes & rondes, qui se divisent en plusieurs petits rameaux sourchus & comprimés: un à branches applaties, dont les ramisications se partagent comme le bois de Cerf, ce qui lui en a fait donner le nom *, & un à branhist. de la hist. de l



GENRE SIXIÉME.

RETÉPORES ET ESCARRES PIERREUSES.

Ritiforais C es Polypiers qui approchent beaucoup des Millepores pour la forme de
leurs trous, n'en différent que parce
qu'ils sont à seuilles plates & irrégulières en forme de dentelle, d'écorce
ou d'éventail. Leur substance est mince,
poreuse & percée ou piquée d'une insinité de trous, dont les uns sont à jour
& très-sensibles, les autres le sont
moins, & les autres sont à peine visibles. C'est dans ces petites cavités que
logent les animalcules.

76. Un beau Rétépore de la Méditerranée d'un blanc rougeâtre nommé Manchettes de Neptune; il est à larges feuilles, minces, & délicates, percées à jour de trous ovales com* Seba, tom. me de la dentelle *. Ce morceau, qui a quatre 1.6. 101, pouces & demi de haut sur six & demi de large, est rate de cette grandeur.

77. Quatre autres Escarres pierreuses ou frondipores de belle grandeur; sçavoir, une à larges

feuilles, dont les bords se joignent ensemble Rétéports irréguliérement de côté & d'autre, & dont les deux superficies sont composées de cellules ovales *. Une de même espèce groupée avec de gros tubes vermiculaires, diversement entor-rall. pl. 30, tillés sur un gallet, qui leur sert de base, & deux Escarres à plusieurs seuilles couchées les unes sur les autres en forme d'Agaric, dont les petits pores sont à peine visibles, même à la loupe *.

78. Huit petites Escarres, tant Rétépores que nat. p. 600. Frondipores; sçavoir, un Frondipore en façon d'écorce ou de croûte piquée de petits points comme de trous d'aiguille, formant plusieurs couches concentriques sur une branche de Fucus. Un dont les petites branches applaties ressemblent aux Cornes de Daim, & lui en ont fait donner le nom; un de l'espèce des deux premiers de l'article précédent; un à trèspetits pores de l'espéce des deux derniers du même article, mais en forme de bouquet. Trois Rétépores dentelles, dont deux de l'espèce & conleur de celui de l'article 76. & le troisséme des Indes, d'un très-beau blanc à pores moins ouverts *. Un Rétépore à larges mailles chargées de petits nœuds granulés, imitant un filet, 100, Nº. 11. & différent de toutes les espéces précédentes.

79. Six autres Escarres pierreuses, dont une en forme d'écorce incrustant une grosse épon-

ge ; une de l'espéce de la premiere de l'arti-Rétépores cle 77; deux de celle de l'article 76; & deux à larges mailles, comme la derniere de l'article précédent.

GENRE SEPTIÉME.

MÉANDRITES.

POLYPIERS qui différent des précédens en ee qu'ils ne sont ni lisses, ni poreux, ni étoilés, mais profondément fillonnés de différentes manières : ils sont ordinairement de forme orbiculaire avec des amfractuosités sur la surface & aux extrémités qui représentent des Ondes, des Vermisseaux ou un Cerveau humain, ce qui leur a fait aussi donner le nom de Cérébrites. L'animal occupe la superficie comme dans les Madrépores.

80. Une très-grosse Méandrite d'Amérique de forme orbiculaire, à côtes minces, aiguës, sinueuses, & lamelleuses, laissant des intervalles peu larges, au milieu desquels les lames viennent viennent aboutir *. Elle porte dix pouces & Miandrie demi de diametre, & adhère à un grand Panache TES.

* Oualded ind. testate

81. Une grosse Méandrite, à côtes plus éle- N°-44vées que la précédente, d'une forme très-particuliere. Outre les sinuosités qui sont propres à ce genre, elle est encore traversée par de larges amfractuosités très-prosondes, qui la sont ressembler à un groupe de plusieurs Méandrites posées les unes sur les autres.

82. Deux autres Méandrites à côtes minces, dont une a la forme du gros Coco de mer des Maldives qui représente deux fesses. Les côtes dont elle est sillonnée sont garnies de lames dentelées & saillantes. L'autre, qui ressemble au sabot d'un cheval, a les côtes moins lamelleuses & un peu plus épaisses *.

* Séba, pla

83. Une autre de forme orbiculaire, à côtes plus épaisses que les précédentes, laissant de larges intervalles, chargés de lames dentelées. Son diametre est de sept pouces *.

*Gualsletl,

84. Trois autres affez grandes & des espéces ci-dessus décrites.

85. Six autres, dont quatre de moyenne grandeur & deux petites; sçavoir, une en forme de Priapolite, à bandes larges & applaties dont les contours tortueux forment par intervalles des étoiles *. Cette variété est rare & curieuse. Une de la Vera-Crux, à côtes minces *

* 96ba , p**l.** 12. N°. 6.

Tome I.

MAANDER- & de couleur rougearre; & quarre de l'espéce de l'Art. 80, dont les deux petites paroissent être une variété.

86. Une magnifique Méandrite orbiculaire,

à bandes très-saillantes, plus larges & d'une ftructure plus serrée que les fillons qui les sépazent. Ces bandes ont ceci de particulier, qu'au lieur d'aller en s'étrecissant vers le sommet. comme dans les autres espéces, elles sont creusées en gouttieres, s'étrecissent vers la base & forment comme autant de ruisseaux tortueux dont le lit est plus ou moins large. Cette espéce n'est pas commune, celle que nous citons de Séba * en approche; mais les bandes en pa-

roiffent plus petites & les interstices plus larges que dans la nôtre, qui a sept pouces de dia-

mètre.

87. Une autre de même espéce, de trois pouces & demi de diamètre.

88. Une autre de forme oblongue & de même espéce, à bandes encore plus larges. Elle tient le milieu pour la grosseur entre les deux précédentes.

89. Une belle Méandrite de forme sphéroïdale applatie, à côtes épaisses par la base, minces & canelées à leur extrêmiré, séparées par

séta, pl. de profonds & larges fillons lamelleux *. Elle porte onze pouces de diamètre. Cette espéce a beaucoup de ressemblance, par sa partie inSOLIDES OU PIERREUX.

lérieure, à l'espèce de Fongipore, appellée Œil
Més de mer; elle est, comme lui, garnie d'un res.

pédicule, & n'en dissére qu'en ce que ses cali
ces se joignent ensemble & forment une seule

masse, dont la partie supérieure est silkonnée &

ondulée. Nous avons cru pouvoir la ranger

dans ce genre avec d'autant plus de sondement

qu'elle paroît servir de passage aux véritables

Champignons de met, dont nous parlerons dans

le suivant.

90. Une autre de même espèce, de sorme ovoide applatie. Elle dissere de la précédente en ce que l'extrêmité de ses côtes, au lieu d'être creusée par un petit sillon; est garnie d'une suite de petites cellules sormées par l'extrêmité des lames qui se joignent. Elle est encore remarquable par un grand trou à bords lamelleux en sorme d'Umbilic, placé vers le milieu de sa surface supérieure. Ce beau morceau, qui a neus pouces & demi de long sur six & demi de large, est dans une boête vitrée.

91: Une autre de l'espèce de l'Art: 89, mais plus petite *.

92. Quatre autres jolies Méandrites qui sont ind des variétés des précédentes; sçavoir, une à côtes minces garnies de lames larges & trèsfines; une à plis grossiers & lamelleux, dont les interstices sont très-prosonds *; & deux de forme ovoide, à bords élevés & repliés, en

* Séba , pk.

MEANDRI- forme de festons, dont les jointures sont plus ou moins serrées; & les intervalles des plis gar-

* seba, iii nis de lames plus ou moins larges *. pl. 112. N°.

21-27.

Mulzum Richter, tab. Litt. C.

109. Nº. 6.

HUITIÉME. GENRE

FONGIPORES.

FONGIPO- OLYPIERS de substance dure & pierreuse, comme les précédens. Ce qui les différencie est leur structure lamelleuse ou feuilletée, & plus ou moins semblable à un Champignon terrestre. dont la partie inférieure seroit en-dessus. Les espéces en sont fort nombreuses; les unes sont à lames dentelées, les autres à lames unies. Les Polypes habitent les interstices des lames.

93. Un très-beau Fongipore en bouquet; des Indes Crientales, connu sous le nom d'Œillet de mer. Les Oeillets dont ce pied est garni sont de forme irrégulière & plissée, à lames Seba, pl. saillantes & pointues, & à perites dentelures *. 94. Trois autres Fongipores en bouquet;

scavoir, un à Oeillets de forme regulière & arsondie, garnis, tant dans le calice que le long SOLIDES OU PIERREUX.

de la tige, de lames à grandes dentelures *; un Fongieuà Oeillets plus petits, & à dentelures de lames * Séba, pl. peu sensibles *; & un à sleurs, de même forme 109, N° ; que celles de l'Art. précédent, mais plus peti- * Séba, ibid. tes & très-semblables aux véritables Oeillets.

95. Trois autres Variétés; sçavoir, une à trois plis réguliers, comme les bords d'un chapeau; une à huit plis, comme celle représentée dans Séba *, mais de forme arrondie & plus * Bid. 22. ramassée; & une à un seul calice de forme ovale & comprimée, qui tient à un long pédicule. Cette derniere vient de Curaçao, les deux autres sont des Indes.

96. Trois autres Oeillets de mer, des Indes, dont un en bouquet de forme un peu sinueuse & fort applatie; un d. forme ovale & applatie, à lames très-larges & dentelées, adhérant à un gros fucus qui lui sert de pédicule *. Le *Stba, pl. dernier approche du précédent, & tient à un leur. A. Caillou avec quelques Astroites *. * Ibid. pla

97. Trois Fongipores en bouquet, à branches comprimées, des Variétés déja décrites, l'un à grands Oeillets, l'autre à petits*, & l'autre de moyenne grandeur.

98. Neuf Variétés intéressantes; sçavoir, 1°. des Caryophilloides en bouquet *. 2°. Six *Rumphius herbar. amb caryophilloides détachés, dont un lisse à calice part. 6, tab prosond, un articulé, trois striés *, & un à ca. 87, N°. 3. lice, en partie sermé & en partie ouvert. Tous,

FONGIPO

excepté celui-ci, adhérent à de petites branches de Corail rouge. 3°. Un Fongipore rare, de forme ovale comprimée, dont la circonférence est garnie de lames plus ou moins grandes & non dentelées, chaque interstice des grandes lames en contient trois plus petites & moins sailsantes. 4°. Deux petits Boutons étolés, qui sont l'analogue marin des Porpites. 5°. Deux Deillets des espèces déja décrites.

99. Six gros Oeillets, rapportés en forme de bouquet sur une tige, ou ils sont placés d'une maniere fort naturelle. Le pied de la tige est garni d'astroites & de glands de mer.

100. Un très rare Fongipore, appellé le Chou de mer. Il est du plus beau blanc, à seuil-les papiracées, frisées & dentelées, dont les deux surfaces sont couvertes de lames longitudinales. Ce morceau, qui est d'une beauté singuliere & très-grand dans son espèce, porte cinq pouces de haut sur sept de large.

* Séba , pl. 108 , Nº. 3 &c 101. Un de même espèce, mais plus petit *.

Mitre Polonoise, de forme arrondie & trèsgracieuse. Sa partie convexe est terminée par un gros tubercule en façon de Bouton, d'où partent, en tout sens, des lames minces fort serrées, dont les dentelures très-saillantes sorment, de distance en distance, de petits Tuber- Forespocules éroilés, qui le distinguent des autres es- R.S. péces. Sa partie concave est garnie de stries granuleuses & pointues *. Ce rare morceau a cinq pouces de haut sur huit de large.

t. 6. tab. 88.

104. Un autre de même espéce, mais plus No. 3. Mém. petit, qui en différe d'ailleurs en ce qu'il n'a Scan. 1700.P. point de bouton à son sommet.

105. Un beau Champignon de mer, de forme arrondie un peu conique, à lames minces, brges, légerement dentelées, partant d'une sente prosonde qui est au sommet de la partie convexe. & allant aboutir en droite ligne à la circonférence. où elles se repliem pour remonter au sommet de la partie concave. Il est plus grand que celui que nous citons *.

111. N. 1.

106. Un autre de même espéce & à peu-près de même forme, mais un peu plus grand. Les lames dentelées y font disposées d'une maniere régulière, & forment, vers le sommet, quelques plis & replis semblables à la fraise de veau.

· 107. Deux champignons de moyenne grandeur, de forme moins convexe, mais d'ailleurs semblables à ceux des Art. 105 & 106. L'un des deux est de plus remarquable par huir petits Champignons naissants qui adhérent à sa parbe concave.

108. Deux autres Champignons de même C iv

Foneiro- grandeur, dont un a sa partie concave enrichie de huit pet ts Champignons en sorme d'œillets; l'autre ne dissére des précédens qu'ence qu'il est de sorme applatie.

109. Deux Champignons de forme oblongue, à partie supérieure convexe & inférieure applatie. L'un est à lames minces, droites & seba, pl. légerement dentelées *; l'autre en dissére par

1112. N°. 29. ses lames sinueuses & entrecoupées qui lui don-

nent un œil chatoyant.

Bonnets de Neptune, de forme ovoide allongée, très-convexe, à sommet traversé d'un fillon peu profond, à lames dentelées, non continues, mais par boucles irrégulières, imitant affez la toison d'un mouton. & à bords ses-

* 56ba, pl. tonnés, un peu comprimés vers le milieu *;

511 . N°. 5. il porte 16 pouces de long fur 5 & demi de haut, 5 dans fa plus grande largeur, & 3 dans l'étranglement du milieu.

gue, moins allongée & moins convexe, appellé la grande limace; ses lames sont, comme dans le précédent, interrompues dans leur direction; mais à écailles plus grandes, légèrement dentelées, & sormant à la partie supérieure un sillon assez prosond *. Ce morceau

* 56ba, pl. rieure un fillon affez profond *. Ce morceau porte un pied de long sur quatre pouces de large.

112. Un autre de même espéce & de for- FONGIPOme très-allongée, ayant plus de 11 pouces de RIS. long sur 3 de large.

113. Un Fongipore de forme ovoide allongée, différent des précédens, en ce qu'il est couvert de lames écailleuses très-petites, environnées d'autres plus minces, & plus enfoncées, qui partent de dissérens centres. Il a 9 pouces de long sur 4 de large, & ressemble assez, quand il est sur sa base, à un chien accroupi sur ses quatre pattes, dont la queue seroit repliée en-dessous.


mes minces, écailleuses, droites, sort serrées les unes contre les autres; on voit sur le milieu du dos un sillon fait en pente, garni de lames radiées *. Ce joli champignon est con
"Séba, "

nu sous le nom de Taupe Marine où de Che-& pl. 122

nille.

115. Un autre de même espéce, mais courbé de façon qu'il ressemble parsaitement à une grosse chenille pliée en deux, dont la tête & la queue se rapprochent.

116. Un Fongipore, de forme soblongue & fort convexe, différent de tous ceux cidessus décrits, en ce qu'au lieu du sillon plus ou moins prosond dont ils sont pourvus, celui-ci est garni de lames à grandes dentelures & parallèles qui s'étendent dans toute fa longueur, & se prolongent jusqu'aux bords. Celles de côtés sont disposées comme dans l'espéce de l'art. 105.





ORDRE SECOND.

POLIPIERS

DE SUBSTANCE MOLLE OU FLEXIBLE.

GENRE PREMIER.

FAUR CORAUX.

POLYPIERS qui sont en général d'une substance moins dure que les précédens, quoiqu'il s'en rencontre quelques espéces d'une dureté assez considérable. Nous avons cru devoir comprendre dans ce Genre toutes celles qui ne conviennent à aucuns des Genres cidessus décrits; de ce nombre sont les saux Coraux articulés, dont la substance alternativement dure & slexible paroît servir de passage du premier au second Ordre. Les Polypiers de ce Genre différent des vrais Coraux en ce

FAUX CO-

la superficie des branches & du tronc.

117. Trois faux Coraux, dont un rare; en buisson, à branches sines, arrondies, articu-

tance cornée ou moins serrée. Ils différent des Madrépores, Millepores, &c.
en ce qu'on n'y voit point de pores ni
d'étoiles. Il y en a de beaucoup d'espéces
qui sont toutes en forme d'Arbrisseau,
mais qui différent en grandeur, en couleur & en dureté. Les Polypes habitent

lées, blanches, & se divisant en petits rameaux qui partent plusieurs ensemble de la
même articulation en sorme d'étoiles, & sont
en s'entrelaçant une masse sort toussue. Les
deux autres sont à petits rameaux arrondis,
courts, non articulés, & adhèrent chacun
à un petit coquillage du genre des Sabots,
qui est aussi recouvert de la même substance
séba, pl blanchâtre *. Cette circonstance, jointe au
N°. 8. désaut de pores, de cavités, & d'écorce celsuleuse, pourroit saire regarder ce saux Corail comme une véritable concrétion, s'il n'avoit d'ailleurs une organisation aussi réguliere
que celle des autres Polypiers.

118. Trois variétés de faux Coraux de l'Isle de France, à branches fines, arrondies,

granuleules, qui ne diffèrent que par leur FAUX Cocouleur, elle est blanche dans l'un, rouge RAUX. dans l'autre. & jonquille dans le troisième. Plus, deux faux Coraux blanchâtres, dont un à branches articulées, fourchues, granuleuses, & percées d'une petite cavité à l'extrémité; & un à très-petites branches ramassées ensemble en forme de pelotte, de l'espèce des deux derniers de l'article précédent.

119. Cinq autres faux Coraux de même espèce, formant quatre variétés; scavoir, un blanc - sale tirant un peu sur le lilas, à branches applaties & tuberculeuses, dont les extrémités sont fourchues & comprimées; un blanc-jaunâtre à branches arrondies, noueuses & fort serrées, dont les extrémités finissent en boutons, comme certaines Stalagmites; un à branches nombreuses, fines, granuleuses, bifourchues, de couleur blanche; & les deux autres à branches minces, arrondies, tuberculeuses, qui s'étendent en tout sens, & forment une masse orb culaire *.

120. Un très-bel arbrisseau de saux Corail blanc articulé, dont les digitations sont d'une substance pierreuse, gris blanchâtre, assez. prosondément striées, & dont les articulations. font presque lisses, petites, & d'une substance * seba, pt. cornée d'un brun noirâtre *; il porte 13 pou- Gualtieri. inces de haut sur 10 de large.

Séba, ibid.

dex restar. Nº. 16.

POLYPIERS

121. Trois petits faux Coraux articulés: FAUX CO-RAUX. l'un approche de l'espéce précédente; mais il en diffère par ses articulations qui sont beau-* seba, pl. coup plus grosses & plus larges *; l'autre est tio. Nº. 2. Rumph. herb. le faux Corail rouge articulé *, & le troisiéamb. tom. 6: me est une espèce particulière de couleur blan-* Séba, pl. che, à branches fines, déliées, demi transpa-104, No. 1. rentes, dont les articulations, au lieu d'être enfoncées, sont plus saillantes que le reste; ce qui peut le faire nommer faux Corail noueux ou géniculé. Il se termine par un pédicule applati, & a beaucoup de ressemblance avec *Stia, pl celui que nous citons *. 106, No. 4.



SECOND GENRE.

KÉRATOPHITES OU LITHOPHITES.

POLYPIERS branchus comme les KÍRATOprécédens, mais différens en ce qu'ils OU LITROfont d'une substance moins dure, plus PHITES.
flexible, & totalement cornée. Leurs
troncs & leurs branches sont ordinairement revêtus d'une espèce d'écorce
celluleuse & friable qui varie beaucoup,
soit pour la forme & l'épaisseur, soit
pour la couleur. C'est dans les trous de
cette écorce que logent les Polypes.
Les Kératophites, comme les Coraux,
se trouvent attachés à des rochers, à
des coquilles ou à d'autres corps durs,
auxquels ils adhérent par le moyen d'un
pédicule assez large qui leur sert de base.

122. Un très-grand Kératophite des Indes, connu sous le nom impropre de Corail Noir. Il est légèrement strié, & ses principales branches se divisent en un très-grand nombre de petits rameaux slexibles, dont les extrémités sont très-sines, d'un roux noirâtre, & demi-

OU LITHO-

Kérato- transparentes *. Il adhère par un gros & large pédicule à un Madrépore de l'espèce des Méandrites qui lui sert de base. Ce morceau a trois

* Seba, Pl. pieds & demi de hauteur. 104. N°. 20

123. Un Kératophire ou Corail noir de Malthe, lequel ne dissère du précédent que par ses branches, dont les extrémités, quoique très-déliées, ne sont nullement transparentes; il a près de deux pieds de hauteur.

123. (bis). Cinquitres variétés de Corail noir : l'une est le vrai Corail noir, à rameaux peu nombreux, arrondis, d'une grosseur presque égale dans toute leur longueur, extrêmement lisses & luisans: l'autre est en forme d'éventail à rameaux applatis fort tortueux, légèrement striés, & d'un noir moins foncé. Les trois autres morceaux sont dépourvus de branches, & ne consistent qu'en une tige plus ou moins groffe & tortueuse. Dans l'un, cette tige est de la grosseur du petit doigt, peu courbée. & parsemée de petits points rudes au toucher; l'autre est plus tortueuse, de la grosseur d'une plume à écrire, & comme chagrinée à la surface; l'autre enfin est encore plus fine. & s'étend en spirale comme un tire-bourre. Elle est revêtue d'une écorce blanchâtre & épi-

* Séba, pl. neule, chargée de petites escarres * & de rété-114 Nº. 3. pores-dentellés.

> 124. Deux autres Kératophites, dont un brun

brun foncé à branches droites, un peu ap-

platies, d'où partent, à distances égales & PHITES OF

dans une direction presque horisontale, plu-Lithophie, sieurs petits jets granuleux & pointus, qui lui ont fait donner le nom de Lithophite plume de Mer*, il a plus de deux pieds de hauteur; * séba 1 l'autre brun verdâtre, est à tige ronde, droite,

jettant de tous côtés quantité de rameaux courts, roides, déliés, épineux. Il est connu sous le nom de Cyprès Marin *, & a beaucoup de ressemblance avec les branches d'as-

perges.

125. Un Kératophite arbrisseau, à branches applaties, revêtues en partie de leur écorce celluleuse qui est d'un beau rouge de Corail. Les parties qui sont dépourvues de cette écorce, one la couleur & la transparence de l'écaille. Il porte deux pieds de haut.

126. Un Kératophite de la Méditerranée, à branches principales chargées de petits rameaux capillaires, revêtues d'une écorce tartareuse d'un rouge pâle, dont les cellules sont très-petites & peu sensibles *. La substance cornée de ce Lithophite est d'un beau noir il adhère hist phys. de par sa base à une grande pierre fort pesante, fig. 83. & porte deux pieds de haut sur autant de large.

127. Un autre des Indes à branches droites garnies dans toute leur longueur de jets nom;

Tome I.

breux & un peu recourbés; la ressemblance PHITES OF finguliere qu'il a avec le Romarin lui en a fair LITHOPHI- donner le nom. Son écorce est d'un gris rougeaere. Il adhére par sa base à un Astroïte, & porte wingt pouces de haut sur seize de large.

> 1 28. Un autre d'Amérique à branches moins droites, & chargées de jets beaucoup plus longs, qui, par leur flexibilité, forment une espéce de Panache. La couleur de l'écorce est d'un gris jaunâtre; il a trois pieds & demi de haut sur vingt pouces de large.

> 129. Un de même hauteur, mais un peus moins large.

130. Un très-beau Kératophite à tige garnie de branches alternes, nombreuses, fléxibles, étendues en éventail, revêtues d'une écorce blanchâtre, dont les cellules sont fort saillantes & disposées autour de la tige, & des rejettons on forme de petites grappes à égale distance les Marfigly unes des autres *. Ce morceau qui a deux pieds

Min. delamer. unes des autres . Ce morceau qui a deux pieds pl. 10. fg. 94 de haut sur dix-sept pouces de large, est encore remarquable par une vingtaine de petites étoiles de mer, de l'espèce des Scolopendroides qui

y sont adhérentes.

131. Un Kératophite de Malthe, brun verdâtre, à branches principales, garnies aux extrêmités de petits rameaux capillaires très-flexibles; il est de plus recommandable par deux huires de l'espèce connue sous le nom d'Hirondelle, qui y font adhérentes. Sa hauteur est de Kér deux pieds sur autant de large.

KÉRATOPHITES OU
LITHOPHI

132. Un autre de Cadix, à tige se subdivi
fant en un petit nombre de jets droits & extrê
mement longs, revêtus d'une écorce rougeâtie; la substance intérieure de ce Lithophite est
verdâtre. Il a trois pieds & demi de hauteur,
& adhere à un rocher chargé de vermiculaires.

communs; sçavoir, deux à substance intérieure opaque & noire dans les parties les plus grosses, transparente & couleur de corne aux extrêmités des branches qui sont applaties; ils différent entre eux par l'écorce celluleuse dont ils sont revêtus. Elle est granuleuse & violette dans l'un, jaune ponctuée de pourpre dans l'autre; & un couleur de lilas, de l'espèce de celui de l'article 127, adhérent par sa base à une petire Huitre.

en plusieurs rameaux qui montent droit en haut *. L'écorce tartareuse dont il est revêtu est * sébe, pligristre sur certaines branches, rouge de plomb lett. a. sur d'autres, épaisse, sistuleuse & verdâtre en quelques endroits. Un à branches tortueuses, couvertes d'une écorce noueuse, rouge pâle *. * sébe, pligristre sur d'autres d'une écorce noueuse, rouge pâle *. * sébe, pligristre sur d'une écorce noueuse, rouge pâle *. * sébe, pligristre sur de l'espèce de celui de plus saillans; & un de l'espèce de celui de

RÉRATO- l'article 126, dont les branches sont chargées phites ou d'un groupe de vermiculaires, minces & déliés LITHOPHI- comme des fils.

135. Dix petits Kératophites; sçavoir, un à écorce grisatre, épaisse, un peu applatie, hérissée de tubules saillantes & friables. Un à branches chargées de rameaux longs, étroits, applatis, blanchâtres, & semblables aux feuilles de Lavande. Un couleur de lilas de l'espéce du dernier de l'article 133. Un comme le premier de l'article précédent. Un en forme d'éventail & de couleur poupre, à rameaux plus nombreux, dont plusieurs se réunissent en s'abouchant *. Un à écorce jonquille,

Séba, pl. Pos, n°. 1, Lett. B.

plus nombreux, dont plusieurs se réunissent en s'abouchant *. Un à écorce jonquille, hérissée de tubules. Un à écorce noueuse d'un rouge pâle, de l'espece du second de l'article précédent. Et trois à branches très-sines, des variétés déjà décrites.

136. Un Kératophite de l'espèce décrite art. 126, adhérent par sa base à une grosse bouteille de terre, sur laquelle il s'est formé.

137. Un Kératophite digité de la grande efpece, à branches de la groffeur du doigt, fourchues, couvertes d'une ecorce grisatre fort épaisse, parsemée de tubules peu saillantes. Ce morceau qui vient d'Amérique, porte 17 pouces de haut sur autant de large.

138. Un Kératophite digité d'Amérique, à branches moins grosses, dont les principales se

partagent en deux plus petites, chacune des- KERATO quelles se divise encore en deux, & celles-ci de PHITES OU même. Il est revêtu d'une ecorce épaisse, rouge & parsemée de pores très-sensibles comme certaines espéces de Madrépores. Il adhere à son rocher avec un Astroite, & porte près de deux pieds de hauteur.

139. Un Kératophite arbrisseau d'Amérique. revêtu d'une ecorce pierreuse, grisatre, ridée, annuleuse; ses branches sont garnies de deux rangs de petits rejettons, courts & disposés en forme d'arrête, qui sont probablement, ainst que l'ecorce, l'ouvrage de Polypes d'un autré genre.Ce morceau porte deux pieds de hauteur.

140. Deux autres Kératophites d'Amérique, dont un en forme d'éventail, à branches trèsnombreuses, grosses & peu slexibles, revêtues d'une écorce grifâtre, épaisse & parsemée de petits trous; l'autre est en arbrisseau, & a quelquesunes de ses branches couvertes d'une ecorce tartareuse, épaisse & friable, d'un rouge pourpre, ayant tous les caracteres de ce genre de Polypiers: mais les autres branches ont servi. de retraite à des animaux d'un autre genre qui s'y sont attachés, & qui les ont recouvertes, les uns de l'incrustation grisâtre & annuleuse de l'article précédent, les autres d'une incrustationpierreuse du genre des Millepores; cette derniere substance recouvre aussi plusieurs glands.

de mer qui s'étoient fixés sur ce Lithophite. PHITES OU Ces divers accidens le rendent extrêmement LITHOPHI- CHICUX.

141. Six Kératophites d'Amérique en forme d'éventail, dont trois revêtus d'une écorce brune, mais avec ces différences que dans l'un cerre écorce est parsemée de petites tubules qui ne d'bordent point la superficie; dans l'autre ces tubules sont saillantes & très-nombreuses *;

Sc. an. 1700, P. 34 pl. 25

l'Académ. des elles sont aussi saillantes, mais plus grosses & plus éparles dans le troisiéme. Un à ecorce griscendré, applatie, & à pores peu saillans. Un à écorce de même couleur, mais arrondie & parsemée de pores assez larges. * Et un de l'espéce E Thid. pl. 3. de celui de l'article 139.

142. Deux grands Kératophites d'Amérique, dont un digité de l'es, éce de celui de l'art. 138, adhérent à un rocher formé de conc-étions marines qui lui sert de support. L'autre est de l'espèce du quatriéme de l'article précédent


143. Un magnifique Panache de mer d'Amérique, se partageant dès la racine en plusieurs rameaux anguleux, chargés d'un g and nombre d'autres, dont les extrêmités s'entrelacent * Marfigly, en forme de rets *. Il est couvert d'une ecorce

pl. 19, fig 86. couleur de lilas, ainsi que les petits rejettons qui y adhérent, & porte trois pieds de haut sur autant de large.

MOUX OU FLEXIBLES.

344. Un Kératophite à branches reticulées, KÉRATOqui ne differe du précédent que par son ecorce PHITES OU qui est de couleur jaune. Il a quarante pouces de haut sur plus de deux pieds de large.

145. Deux autres Kératophites à panache, dont un est totalement incrusté d'une matiere grifatre & pierreule, de l'espèce de celle de l'article 139, ce qui le rend fort pésant; l'autre est de l'espèce de l'article précédent, & adhére à une concrétion pierreuse,



TROISIEME ET QUATRIEME GENRE.

CORALLINES ET ESCARES MOLLES.

POLYPIERS, d'une substance ou cornée CORALLI- ou crustacée, ou pierreuse, qui ont la forme de plantes, & qui sont composées de plusieurs branches minces, subdivisées en sines ramissications, comme quelques espéces de mousses, ce qui les avoit fait ranger dans cette classe par les Botanistes, avant les découvertes de M. Ellis. Cet habile Observateur les distingue en vésiculeuses, en tubuleuses, en celluleuses & en arriculées * Comme son

*Voyez PEC celluleuses & en articulées *. Comme son de Philt nat. ouvrage est entre les mains de tout le des Cotallines. de la Haye monde, nous ne dirons rien ici des ca1756, in-4°.

ractéres spécifiques qui différencient ces Polypiers, ni des animaux qui les

habitent.

146. Deux belles Corallines vésiculeuses,

*Ellis, pl. l'une est la Queue d'Ecureuil * adhérente à un

2, n°. 4, let. manche de couteau bivalve : trois des princic.

paux jets de cette Coralline, ont plus d'un

*Ellis, pl.
pied de hauteur. L'autre est le Cheveu de mer *

MOUX OU FLEXIBLES.

edhérent à une moule aussi bivalve. Plus le CORALLIS même sur un gros sucus.

148. Douze jolies Corallines, dont sept véficuleuses qui sont l'Antenne d'Ecrevisse ou barbe de mer, des deux variétés décrites dans Ellis 4. Le Cheveu de mer, adhérent à un fucus. Le Cy. let. a. & b. près de mer s. La Coralline à lentes 6. La Co- 1 Ibid. pl. 3; ralline à cosses environnant un fucus 7, & la "lbid.pl. 154 Queue d'Ecureuil. Deux Corallines tubuleuses; 7. 14, b. 7. 16id. pl. 7. scavoir une à petites ramifications 8; & une du n°: 11. b. Cap de Bonne Espérance, ridée comme la 16, fig. a. Trachée-art.re formant un faisceau de petits tubes paralleles & fort ferrés?. Trois Corallines fig. b. telluleuses adhérentes à des fucus; sçavoir, la 20, n°. 3. b. Rampante 10, la Coralline à cils 21, & la Co20, nº. 5. d. Talline à touffe couleur d'yvoire 12; plus trois 12 16:d. p Escares molles, qui sont l'Escare à feuilles étroites 13, celle à feuilles larges 14, & l'Escare millepore spongieuse & irréguliere, dont les ouver-19, nº. 2. 2. tures sont garnies de poils 15. 15 Ellis pt.

149. Douze Corallines articulées, sçavoir, 31, sig. b. la Bugle coralline, ou Consoude moyenne à tubes déliés si la bugle coralline à tubes plus épais: 16 lbid. pl. la commune, ou blanche des Apothicaires: 17 la 17 lbid. pl. 24 n°. 1, a.

CORALEI commune à extrémités terminées en bouton : 18 Coralline à têtes en forme de lance & à articu-Bid. pl. 24, lations plattes 1: la Coralline rouge semblable 16id. fig. e. à des cheveux 2 : la blanche à articulations dé-# Did. fig. d. liées 3: la Coralline à branches arrondies, donc les extrêmités s'applatissent & se contournent à la dernière articulation : la Coralline à branches applaties, rameules & mobiles de la grande espèce : la Coralline à seuilles très-applaties, rondes au sommet : la blanche à 4 Bid. pt. feuilles atticulées de la Jamaïque 4, & une très - rare à longue tige, ornée à l'un des bouts d'une houpe de filamens articulés, trèsdéliés, semblables à un pinceau. C'est le vrai

pinceau de mer.

pl. 338.

A50. Les deux espéces d'Acétabule, décrites dans Tournefort & Bauhin. L'un est le grand Acétabule de mer, formant un groupe de six pouces de haut sur autant de large, adhérent Townson, à une pierre s. L'autre est de la petite espèce

& a here à une valve de coquille du genre des cœurs. · Il n'est pas bien décidé que cette production singuliere soit un Polypier. M. Donati do: t l'autorité est d'un grand poids en cette

Donati, matiere, la range dans les plantes marines PL 3, fig. I.



GENRE CINQUIEME.

EPONGES.

POLYPIERS d'une substance molle Eponement & élastique, composés de plusieurs sibres qui s'entrelaçant les unes dans les autres, s'unissent & forment une espece de rézeau percé de tubes plus ou moins larges & prosonds; ces tubes paroissent remplis d'une substance molle & blanchâtre, & il résulte de leurs diverses inflexions, un grand nombre de variétés dans les éponges. Les cavités dont elles sont remplies, sont probablement l'ouvrage & la demeure d'une certaine classe d'animal-cules encore peu connus.

151. Deux très-grandes Eponges fines, de l'espèce commune, l'une en forme de manchon & l'autre en chapeau rabattu, nommées le Manchon & le Chapeau de Neptune.

152. Quatre autres de la même espéce, remarquables par leurs formes singulieres, nomFPONGES.

mées l'Eventail, le Turban, la Calotte, & le Mortier.

- 153. Onze Eponges fines de formes trèsvariées, de l'espéce des précédentes, & l'Epongedes Frotteurs.
- 154. Deux Eponges d'Amérique, dont une de forme longue comprimée, à côtés garnis de petits trous, à partie supérieure percée d'une suite de trous larges & prosonds, rangés sur une même ligne, qui lui ont fait donner le nom de Flutte de Pan, elle a seize pouces de de long; l'autre est rameuse & digitée, à seuilles applaties, & adhere à une belle moule Magellanique de l'espèce chatoyante.
- 155. Deux Eponges rameuses, à branches nombreuses de substance friable, qui dans l'une sont étendues en éventail, comme certains lithophites, & ramassées en sorme de gerbe dans l'autre. La premiere porte vingt-fix pouces de haut, & la seconde vingt-deux.
- 156. Quatre Eponges rameuses, dont trois de substance molle & sléxible, plus ou moins * séba, pl. sines & serrées*, & une de l'espece décrite dans 27, n°.5, 6 l'article précédent.
 - 157. Une Eponge en forme de colomne, à fibres rudes & serrées, à circonsérence parsemée de grandes cavirés irrégulieres, & à sommet percé d'une large ouverture cylindrique, qui pénétre jusqu'à la base. Elle est de couleur rousse,

158. Trois Eponges en colomnes; sçavoir, Eponess, une à tissu sin peu serré, uniforme dans toute sa longueur, sans autre grande cavité que celle qui la traverse d'un bout à l'autre *; une de la *séba, prosseur du doigt, sun peu applatie, qui au sieu d'être percée dans sa longueur d'une seule cavité comme la précédente, l'est transpersaire de deux rangées de trous opposés, qui se suivent à distances égales; elle parost être une variété de la flutte de Pan; la troisième est de l'espèce de celle de l'article précédent; mais elle a deux cylindres joints par les côtés.

159. Une autre Eponge en colomne pyramidale, de couleur brune, nommée le Cierge, elle differe des précédentes, en ce que ses fibres sont plus serrées, & qu'elle est comme crevassée dans tout son pourtour. Ce beau morceau a 26 pouces de haut.

160. Une autre de même forme, mais à tissis encore plus serré & plus compacte, brun-noi-râtre & à superficie hérissée de tubercules. Elle est sur-tout remarquable par sa hauteur qui est de 41 pouces.

161. Une Eponge de même espèce, mais dissérente pour la forme. C'est un groupe de cinq gros tuyaux, placés l'un près de l'autre, comme des tuyaux d'orgue; il a 22 pouces de haut.

162. Trois Eponges en colomne des variétés

EPONGES.

déjà décrites. L'une est à deux tuyaux, de même tissu que la premiere de l'article 158; l'autre à quatre tuyaux, de même espèce que celle de l'article 160. La troisième réunit sur un seul tube le tissu comp sête & serré, & le tissu mince & lâche de ces deux espèces.

163. Une grande Eponge, nommée le Bonnet de Neptune, sa partie convexe est tuberculeuse & à larges canelures, & sa partie concave tapissée de sibres longitudinales qui vont du sommet à la circonsérence, d'une maniere sort réguliere.

164. Trois jolies Eponges de formes singulieres. L'une applatie, d'un tissu fort serré garni de pointes, ressemble exactement à une Mûre d'Evêque. L'aurre d'un tissu plus lâche, aussi hérissé de pointes, n'imite pas moins bien une Crosse; la troisième, d'un tissu semblable à la mie de pain, est de sorme ovale comprimée, & s'appelle le Gobelet de Neptune.

165. Deux Eponges de même espéce que la premiere de l'article précédent, dont une semblable aux seuilles de l'Opuntia, adhérente à un Astroite qui lui sert de base; l'autre composée de quatre tubes un peu applatis, d'un tissu peu serré, & parsemés de tubules arrondies.

166. Une autre de même espéce, mais digitée, sa forme lui peut saire donner le nom de

6:

Sand de Neptune; elle adhere par sa base à un saux Corail & à un petit Kératophite.

Eponges,

167. Deux Eponges, dont une rare en forme de cornet, appellée Trompette de mer. Le tissu en est mince. & fragile, & remarquable par quantité de petits trous cylindriques, dont la cavité & les bords extérieurs sont revêtus d'une croute pierreuse, striée & étoilée, qui en bouche quelquesois l'ouverture. L'autre Eponge est à peu près de même forme, mais de texture plus solide, & privée des cellules pierreuses qu'on remarque en la précédente.

168. Sept petites Eponges, dont une à feuilles minces & découpées, en forme d'Agaric; une rameule à tubes noueux & tuberculeux, d'un tissu très-sin & très-serré; une en forme d'ensonnoir un peu comprimé; une en crosse; une en bouquet, imitant la fleur de Jacinthe; & deux à tubes cylindriques, des espéces déjà décrites.

169. Denx Eponges rares, l'une appellée la Morille, à cause de sa ressemblance parfaite avec ce végétal. Elle adhere à un saux Corail. L'autre de sorme orbiculaire, peut être nommée l'Eponge oursin. Les pointes dont elle est hérissée, & qui la traversent de part en part, sont liées les unes aux autres par des sils épars, minces & déliés comme de la toile d'araignée.

170. Trois Eponges, dont une peu com-

Eronges. mune, en forme de buisson à petites seuilles nombreuses découpées & frisées, portées sur un rocher qui leur sert de base, & deux de l'espèce de celles de l'article précédent, dont une est la Morille à seuilles plus petites, plus

Mem. du nombreuses & plus comprimées *. L'autre a les Chev. Turgot fur l'hist. nat. pointes entierement engagées dans ces sibres pl. 14, let. E. éparses, que nous avons dit ressembler à la toile d'araignée.

> 171. Une très-rare & magnifique Eponge rameuse, de couleur brune-obscure, dont les branches rondes vers la tige, s'élargissent & s'applatissent en s'élevant, & prennent la figure de cornes de Daim, elles sont entierement couvertes de petites seuilles drues, plissées & comprimées, d'un tissu ferme, serré, peu flexible. Ses branches les plus larges sont reticulées à peu près comme le Lithophite éventail. Elle porte vingt-un pouces de haut sur un pied de large.

172. Neuf Eponges de différentes espéces; sçavoir, une Eponge agaric, à seuilles blanches, nombreules, frilées, comprimées, percées cà & là de cellules arrondies & tuberculeuses en forme de verrues, dont la cavité intérieure est incrustée d'une substance friable & crétacée. Trois semblables à la mie de pain, de substance friable & comme vermoulue: l'une de forme applatie, comme un morceau de

liége,

lége, les deux autres de forme irréguliere. Epongas. Une globuleuse, percée de large: cavités cylindriques & irrégulieres, rangées parallelement comme dans les Astroites. Deux minces & plattes, dont le tissu roide, quoique lâche & peu serré, forme des cellules à réseau, fort nombreuses & jointes les unes aux autres. comme celles des mouches à miel. Une à rameaux arrondis, entrelacés les uns dans les autres, comme un groupe de tuyaux vermiculaires. Il est d'autant plus aisé d'en faire la comparaison, qu'on voit plusieurs de ces derniers qui y adhérent; & une mince & platte, plissée comme une fraise de veau.

173. Seize petites Eponges de formes trèsvariées. Sçavoir, deux digitées, l'une grise & l'autre brune, à rameaux creux & cylindriques, percés de trous plus ou moins larges. Une rameuse, grise, qui paroît être une variété de celle décrite article 171. Six variétés d'Eponges rameules, à branches applatties, l'une à feuilles larges, velues, profondément découpées; l'autre à feuilles étroites & allongées; l'autre à seuilles frisées; l'autre à petites branches rondes applatties & bifourchues; l'autre à feuilles d'Agaric, repliées les unes sur les autres; & l'antre à fevilles terminées en bouton tubuleux. Une à branches arrondies *. Une sembla. * Séba, pli

ble, dont les extrêmités s'applattissent en forme. Esongs. de main. Une applattie comme la feuille de l'Opuntia. Une à fibres droites & isolées. Une cannelée; & deux globuleuses.

GENRE SIXIÉME.

ALCYONS.

M. Ellis, paroissent principalement destinés à servir de nids & de matrices à des animaux de mer. Les Alcyons varient beaucoup dans leur sorme & dans leur substance; celle-ci est spongieuse dans quelques espéces & charnue dans d'autres. Ils ont aussi différentes sortes d'enveloppes, les uns ont une peau graveleuse, elle est calleuse, coriace ou friable dans les autres.

174. Le grand Guepier de mer. Cet Alcyon en forme de ruche, est d'une substance dure & cartonneuse, de couleur rougeâtre, percée çà & là d'un grand nombre de petits trous. Au sommet est une large ouverture en cône

renversé, qui laisse voir les compartimens celluleux dont l'intérieur est garni. Ce morceau Archons. curieux a dix pouces de haut sur huit de la ge.

175. Huit Alcyons; îçavoir, un enforme de Poire de substance lisse & friable, d'un rouge de brique *. Son extrêmité est percée d'une cavité profonde & conique, qui laisse appercevoir les bist de la mer, cellules intérieures. Un de même espèce, de pl. 16, fig. 79, couleur grise, adhérant à un groupe d'autres Alcyons en forme de Figue, revêtus d'une écorce rude & épineuse, & troués au sommet. Un de l'espèce du premier de cet article, ressemblant à des figues jointes par les côtés. & se terminant en une seule queue. Un de forme globuleuse, d'où partent en tous sens des tubes creux & spongieux, & quatre de forme plus ou moins ronde, à tissu spongieux, celluleux & peu flexible; parmi ces derniers. trois adhérent à des corallines & à des fucus.

176. Trois Alcyons branchus peu communs, en forme de cornes de Daim. La substance de l'un est spongieuse, friable, percée de distance en distance de trous arrondis qui laissent voir les cellules intérieures; celle de l'autre est coriace, dure & semée de cavités peu prosondes. Dans le troisième, elle est membraneuse, celluleuse & épineuse.

177. Quatre Alcyons de l'espèce du premier de l'article précédent; dont un singulierement

confourné. Deux Agarics, de substance Alcrons. spongieuse & friable, semée de petites cavités intérieurement celluleuses; & une autre variété d'Agaric, revêtue d'une écorce cartonneuse, percée en sept à huit endroits de trous comme les précédens, mais beaucoup plus larges.

178. Deux Alcyons, l'un desquels est une grosse masse songueuse & tuberculeuse en forsstbapl., 6 me d'Agaric *, dont l'écorce est de même consistance que celle du dernier de l'article précédent; l'autre est en forme de coupe sovale, à bords un peu comprimés, de substance dure, coriace, ridée & de vouleur brune.

179. Trois jolis Alcyons de substance cartonneuse; sçavoir, un à seuilles larges & frisées, dont les plus grands rameaux tiennent ensemble à l'aide d'un tissu mince & membraneux; elles sont slexibles, un peu élastiques, & semblables à des seuilles désséchées *. Un à

neux; elles sont flexibles, un peu élastiques,

* séba pl. & semblables à des seuilles désséchées *. Un à
feuilles plus étroites, épineuses & semblables
à celles du chardon, ce qui l'a fait nommer

Chardon de mer. Le troisséme est une seuille
large & spongieuse, qui recouvre totalement
les branches d'un petit sucus, excepté les extrêmités qui sortent en saçon de frange.

180. Quatre Alcyons différens; sçavoir, un rare des Indes, à branches rondes en forme de corail, de substance assez dure, spongieuse, friable, non élastique. Un d'Amérique, dont la substance est une espèce de peau calleuse & savonneuse, couverte de tubercules en forme de verrues trouées dans le milieu, laquelle enveloppe une concrétion de mer. Le troinéme est une masse assez informe, roide, membraneuse, celluleuse & piquante, de couleur brune tirant sur le noir *. Et un qui approche assez * Séba, Bid du précédent, mais d'une substance plus spon-pl. 95, n°. 3. gieuse & néanmoins plus compacte.

181. Treize petits Alcyons, dont un en masse arrondie, se partageant en plusieurs petites tiges velues & pointues, de substance friable & spongieuse *. Un en forme de vesse de " loup; un dans la cavité duquel est logé Bernard fig. 6. l'Hermite; un en forme de petit chapeau; les autres sont des espéces déjà décrites.

182. Huit espéces différentes d'Ovaires ou Matrices de coquillages, dont quelques-unes portent le nom vulgaire de Savonettes de mer-Sçavoir, 1°. une d'Amérique, composée de petites vessies jaunes, rondes, applaties, jointes ensemble en une de masse irréguliere, & adhérentes à une branche de Madrepore; ce sont les matrices des Pourpres communes. 2°. Une de même espéce venant de nos mers; elle est en masse arrondie * 3°. Une #Ellis Corat. à vessies en forme d'entonnoir, dont les bords sont festonnés; ce sont des matrices de Buc-

cins de la Jamaique. 4°. Des matrices de buc
Alexons.

* Ellis, pl.


33. fig. a. & tubes droits, dont le sommet est rouge de corail,

Lister, pl. 878 ils adhérent à un buccin. 6°. Deux à vessies

noires triangulaires & à tête applatie. Et trois

autres variétés de matrices, des Indes oriene

tales.





SECONDE PARTIE.

Coquilles ou Testacées.

tion des Coquilles que nous possédons, nous croyons devoir dire un mot de l'ordre que nous suivrons dans leur distribution, & donner quelques notices préliminaires & succinctes qui puissent rendre ce Catalogue utile, par l'ordre que nous tâcherons d'y observer.

Nous avons présenté dans la premiere Partie les habitations pierreuses * ou ligneuses des plus petits Animaux connus dont les Mers soient peuplées; nous avons compris dans la même Classe les productions d'Animaux encore inconnus, telles que les Eponges, &c. & enfin celles qui paroissent destinées à servir de nid & de matrices à certains Coquillages de Mer: ce qui

* Les Poly-

E iv

nous mene, par une gradation presque Coquillages insensible, à traiter des Coquillages mêmes : ce sera le sujet de cette se-conde Partie.

On distingue primitivement trois sortes de Coquilles, celles de Mer, celles d'Eau-douce, & celles de Terre. Nous en serons trois Sections; dans la premiere nous rangerons les Coquilles Marines, dans la seconde les Fluviatiles, & les Terrestres dans la troisième.

Les Coquilles Marines se trouveront ici divisées, à l'exemple de la plûpart des Auteurs qui en ont traité, en trois Classes:

Les Univalves.
Les Bivalves.
Les Mutivalves.

Nous sous-diviserons encore, conformément à la méthode la plus suivie, chaque classe en un certain nombre de familles, chaque famille en genres, chaque genre en espèces, & celles-

Mais il est bon de prévenir que, ne s'agissant ici que de Coquilles où ne se trouvent plus les Animaux auxquels elles ont été propres; ces divisions ne pourront être les mêmes qu'elles auroient été, si elles avoient dû se rapporter aux Coquillages entiers, comprenant à la fois l'Animal & la Coquille, telles qu'on en trouve de trèsheureuses & de très-justes dans l'histoire des Coquillages du Sénégal, par M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences.

On a cru d'ailleurs ne devoir point négliger de joindre aux descriptions de chaque espèce ou variété de Coquilles, les noms tirés presque toujours de quelque ressemblance frappante, & sous lesquels elles sont le plus connues, sussent ils même du nombre de ceux dits vulgairement de guerre, ou qui ne sont en usage que chez quelques Amateurs ou chez les Marchands.

On a de plus placé dans quelques Coquilles, à titre de Coquilles improprement dites, des fourreaux ou habitations d'Animaux, formées d'un grand nombre de fragmens de diverses Coquilles, joints à des brins de bois, à de gros sable, &c. sur-tout lorsque ces Coquilles se sont trouvées à peu près semblables pour la forme, à celles de ces familles.

Quant aux Coquilles Fluviatiles & Terrestres, comme nous ne connoissons des premieres que de deux sortes générales, les Univalves & les Bivalves; & des secondes que d'une sorte seulement, sçavoir les Univalves; & que d'ailleurs les samilles en sont analogues à celles des précédentes, & en même tems moins nombreuses: nous ne décrirons la collection, assez variée cependant, que nous avons des unes & des autres, que par sorme d'autant d'appendices, qui seront la seconde & la troisième Section.



SECTION PREMIERE.

Coquilles DE Mer.

CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES.

Nous rangerons dans cette Classe toutes les Coquilles où l'on ne remarque pour l'ordinaire qu'une seule pièce. Nous disons pour l'ordinaire, parce que plusieurs de ces Coquilles en ont deux lorsqu'elles sont habitées par l'Annimal: mais il n'y en a qu'une qui retienne proprement le nom de Coquille, l'autre est connue sous le nom d'Opercule.

Ces Opercules se trouvent rarement dans les Cabinets avec les Coquilles auxquelles ils appartiennent, & les samilles & genres de ces Coquilles n'étant pas même assez bien déterminés par opposition aux autres, nous n'avons point jugé devoir, comme ont fait quelques Auteurs, très estimables d'ail-

UNIVALA

76 COQUILLES UNIVALVES

UNIVAL- leurs, tirer la division générale des VIS. Univalves, ou même certaines de leurs divisions ultérieures, des caractéres de n'être point, ou d'être en effet operculés.

Nous avons donc préféré de puiser ces diverses divisions dans la forme générale des Coquilles, & ce sera de caractères moins apparens que dériveront les différences des genres, des espéces & des variétés. Les Coquilles Univalves peuvent être partagées en douze familles, qui sont:

- 1. Les Lépas ou Patelles.
- 2. Les Orcilles de Mer.
- 3. Les Tuyaux vermiculaires.
 - 4. Les Nautiles.
 - 5. Les Limaçons.
- 6. Les Buccins.
 - 7. Les Rochers.
 - 8. Les Pourpres.
 - 9. Les Tonnes.
- 10. Les Vis.
- 11. Les Volutes.
- 12. Les Porcelaines.

PREMIERE FAMILLE.

LÉPAS OU PATELLES.

Ce sont des Coquilles ouvertes, évali Fam.
lées, non contournées, de la figure Les Legas,
d'un cône tronqué, qui s'attachent aux
rochers ou à quelqu'autre corps dur.
Elles sont ou entieres, ou percées, ou
chambrées, ou à appendice intérieur;
& c'est delà que nous tirerons leur division en quatre genres, qui sont:

- 1°. Les Lépas à Coquille simple & entiere.
- 2°. Les Lépas à Coquille percée endessus.
 - 3°. Les Lépas à Coquille chambrée.
- 4°. Les Lépas à Appendice en demicornet.



GENRE PREMIER.

LÉPAS A COQUILLE SIMPLE ET ENTIERE

- I. FAM.

 I.
 - 2. Le même, avec cette seule différence, que le milieu du dedans est fauve tirant sur le gris de lin.
 - 3. Un Lépas des Indes, rare, à tête située vers les deux tiers de la longueur, à stries longitudinales, à base ovale, & de l'espéce nommée Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue *; il est marbré en-dessus.

Argenv. Pl. 2. lett. P.

- 4. Un Bouclier semblable, un peu plus grand, dépouillé, & dont les stries ont disp.ru. Ses couleurs ont un grand éclat.
- 5. Un autre dépouillé & sans stries, moins grand, & de marbrure plus chargée que le pré-

*Lift. ub. cédent *.

6. Un très-beau Bouclier à onze bandes lon-

zindinales, de forme un peu moins élevée que les précédens, sa tête est blanche & I. FAM. nacrée *. Il porte trois pouces, sur deux pouces six lignes de diamétre.

7. Un autre moins grand de l'espèce du précédent, mais dépouillé.

- 8. Un grand Lépas Magellanique, papyracé à stries longitudinales peu élevées. La tête. le bord de la base, & une zône intermédiaire sont flambés de lie de vin sur un fond blant, l'intérieur est nacré.
- 9. Six Lépas de l'espéce de celui de l'article précédent, mais moins grands, de fonds & de marbrure variés.
- 10. Sept Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, un blanc tacheté, de forme un peu applatie, à stries longitudinales serrées & granuleuses; un à tête élevée placée près de son milieu, & de forme presque conique, à stries longitudinales bien marquées. Deux Lépas coniques jaunes, l'un dans l'état naturel à tête plus obtuse, & l'autre poli. Deux de l'espéce de l'article précédent, & un Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue.
- 11. Deux très-grands Lépas Magellaniques en pendant, de forme oblongue, à tête fort élevée & chatoyante, à grosses stries ou côtes longitudinales rabotteuses, de couleus brune moirée en-dessus, nacrée en-dedans.

RO COQUILLES UNIVALVES

I. Fam. Les Lépas. 12. Deux autres de forme plus applatie.

13. Deux autres de l'espèce de ceux de l'article onze; à cela près, qu'ils sont blancs nués de marron; les sommets sont comme dans les précédens.

14. Deux grands Lépas rares Magellaniques, à côtes assez larges & peu saillantes, brun-soncé en dessus, nacrés en-dedans, à tête élevée, de sorme à peu-près conique, & nommés en Hollande Entonnoirs.

15. Deux autres qui ne différent des précédents qu'en ce que les cannelures de l'un sont blanches, & qu'on remarque aussi un peu de blanc dans le haut & le bas des cannelures de l'autre.

16. Cinq Lépas de moyenne grandeur & fort jolis; sçavoir, un rare à stries blanches & cannelures amaranthe-clair, chargées de petits grains très-fins; un autre rare encore à stries fines & serrées, à peine sensibles, rassemblées en plusieurs faisceaux alternativement blanc & cerise; deux fond blanc nué de bleu, nacrés en-dedans, & un Entonnoir de l'espèce du premier des précédens.

17. Trois Lépas rares, sçavoir, un grand blanc, nué de violet vers le haut, & de verd dans le bas, à côtes longitudinales nombreuses, & nacré tant en-dedans qu'en dehors; un de l'espèce du premier de l'article précédent,

mais

mais plus grand; & un autre un peu plus grand, nué & marbré de fauve roux, à côtes peu éle-LES LEPAS vées. & nacré tant en-dessus qu'en dessous.

18. Sept Lépas de moyenne grandeur; scavoir . un à stries & cannelures longitudinales, granuleuses & à tête élevée, bariolé de noirâtre, de fauve & de blanc *. Un à groffes * Arg. pl. \$ côtes longitudinales, laissant entr'elles de profondes cannelures, nué de marron clair sur un fond blanc, à tête blanche & de forme applatie. Un à stries larges & peu élevées, fond brun avec une zône blanche; nacré par-tout; Un à seize côtes longitudinales, marron, & autant de cannelures verdâtres. Deux semblables au premier de l'article précédent; à cela ... près, que les cannelures en sont couleur de rose, & qu'ils sont plus applatis, & un de même espéce nué de gris-de-lin.

19. Six Lépas, scavoir, deux à peu-près semblables aux deux premiers de l'article précédent. Un semblable au premier de l'article 16; un granuleux bariolé d'orangé & de blanc; un semblable au quatriéme de l'article précédent, mais plus grand; & un grand Lépas Magellanique mince, à côtes peu élevées à ondées & irrégulieres marron, sur un fond blanc & nacré:

20. Deux grands & beaux Lépas de forme un peu applatie; l'un à côtes longitudinales Tome T:

grandes & petites, alternatives, & débordant I. FAM. la base en somme de rayons; il est panaché en zigzag de blanc, de jaune clair & de brun, & a le sommet noir; on le nomme Œil de

*Arg. pl. 2. rubis radié *, l'autre est à stries blanches & lett. G. list. cannelures couleur de rose.

- 21. Deux semblables, à cette différence près, que l'Œil de Rubis est à stries moins élevées, moins radiées, & à zigzags plus marqués; & que l'autre Lépas est ici plus grand, plus oblong, & nué seulement de couleur de rose.
- 12. Trois Lépas, sçavoir, deux fauves à stries légeres & nombreuses, de forme oblongue, à côtés comprimés, ressemblants par-là à List up des bateaux, & nommés en esset de la sorte *, se un œil de Rubis semblable à celui de l'arti-

23. Trois grands Lépas, l'un à côtes gran-

cle précédent.

- des & petites, alternatives, débordant la base, de forme applatie, à tête marbrée de blanc & de fauve, brun dans le reste, & nommé Œil leil. B. de Bouc radié *; l'autre poli, de forme un peu élevée, arrondie vers le haur, à tête & bords brun-soncé, blanc-nacré dans l'intervalle; & un blanc du Brésil, marbré de fauve-roux, à grosses côtes, chargées de stries inégales, onduleuses & rabotteuses, & à base dentelée.
 - 24. Trois autres, sçavoir, un Œil de Rubis,

un Œil de Bouc; & un comme le dernier de l'article précédent, mais moins grand.

I. Fam. Les Lepasa

- 25. Quatre grands Lépas, sçavoir, deux blancs à stries longitudinales, saillantes en vive arrête & dentelées, débordant la base; un blanc un peu orangé, à tête élevée, & à stries fines; & un semblable, à stries plus larges, chargé de Glands de Mer.
- 26. Sept Lépas, sçavoir, un grand, blanc nué de fauve, de forme applatie, à larges côtes peu élevées & à stries fines & ser-rées *; un à stries longitudinales, bariolé de zônes fauves, blanches & noires; un semblable aux deux premiers de l'article précédent, mais moins grand; un à tête plus élevée & à stries non dentelées. Un granuleux semblable au premier de l'article 18, & deux de l'espèce nommée Œil de Rubis.
 - 27. Trois très-grands Lépas, sçavoir, un d'Amérique, à stries inégales & rabotteuses, marbré de blanc, de fauve & de gris-verdâtre. Un de la Méditerranée à stries saillantes, rabotteuses & débordant un peu la base, marbré par zônes de marron, & de blanc; & le troisième dépouillé, d'un beau blanc, à tête élevée & pointue.
 - 28. Huit grands Lépas, sçavoir, un blanc à stries inégales, revêtu de son épiderme. Un autre dépouillé paroissant de même espéce,

Chargé de trois tuyaux vermiculaires. Deux à Les Lepas. grosses stries long tudinales débordant la base; & marbrés par zônes de marron-clair & toncé, *Gual ind. & de verd d'eau *; deux Magellaniques de tab. 9. litt. H. l'espèce de ceux de l'article 11, & deux blancs dépouillés, semblables au dernier de l'article précédent.

29. Vingt-quatre Lépas de moyenne grandeur, scavoir, quatre à bandes larges, alternativement blanches & brunes. & à stries fines & ferrées. Deux fauves nués de verd & de gris, de l'espéce du premier de l'article 26. Deux verdatres à stries inégales, serrées & rabotteuses, parmi lesquelles il y en a, dans un, onze orangées placées à distance presqu'égale les unes des autres. Un souci lisse, à tête blanche; un à stries peu élevées, & à zônes brunes hachées sur un fond jonquille; un verd de terrasse strié, à bandes alternatives, fauves & brunes; deux à stries transversales & à petites bandes hachées, blanches & rougesbrunes. Deux petits Magellaniques papyracés, à stries brunes & cannelures blanches, mieux prononcées dans l'un que dans l'autre. Deux autres Magellaniques papyracés, de la variéré de l'article 9. Quatre Œils de Rubis, dont deux radiés & revêtus de leur épiderme; les deux autres dépouillés & non radiés. Deux de l'efpéce du premier, de l'article 28, & un.

en bateau comme les deux premiers de l'article 22.

I. FAM.

LES LEPAS. 30. Cinquante Lépas de moyenne grandeur & petits, scavoir, deux petits & plats à stries capillaires, marbrés, par zônes inégales, de brun & de gris, & à sommet blanc *. Deux autres de forme conique & à stries fines alterna-539.f. 22. tives, blanches & noires. Deux à tête comprimée, à stries fines, blanches & grises, Deux lisses & applatis, à lignes longitudinales, brunes, interrompues, sur un fond blanc. Deux applatis d'un beau couleur de rose, à stries capillaires & à sommet blanc. Un semblable, mais brun-obscur. Un blanc à grandes taches couleur de rose, régnantes dans une large zône. Deux un peu plus élevés, fauves-gris, Deux blancs à côtés comprimés, & à stries longitudinales & transversales, grosses & rabotteuses, formant un réseau imparfait. Un noir de forme conique, à huit côtes élevées, d'un blanc d'émail. Un de même espéce, à neuf côtes, blanc nué de fauve roux, & à sommet noir applati. Un à base dentelée & à côtes firices, alternativement blanches & brunes *. Le petit Lépas peint en façon de reseau *. 532. fig. 11. Deux Lépas bruns, dont les cannelures. & les 530. fig. 8. stries sont hérissées de petits points rudes *. Deux autres semblables, mais rougeâtres. Un 536. fig. 15. blanc à stries fines, granuleuses & à base pres-

I. FAM. que circulaire. Cinq Magellaniques, dont qua-LES LEPAS, tre de l'espéce de l'article 9, & un Entonnoir à bandes alternatives blanches & brunes. Deux æils de Rubis radiés, un Bouglier, & dixsept autres variétés.

> 31. Sept Lepas peu communs, tous à grands rayons, en forme d'étoile, & nommés par cette raison Astroienas; sçavoir, un blanc de forme plate, à seize rayons saillans en-dehors, & creulés en-dessous en goutiere; trois blancs roussaires à tête plus élevée, à rayons plus serrés & dentelés; un blanc à rayons épais & granuleux; & deux blancs marbrés de noir.

* Arg. pl. 2. l'un à sept, l'autre à huit rayons *.

List tab. 532e fig. 10.

32. Deux Lépas à tête recourbée & à stries fines & serrées, nommés Bonnets de Dragon: l'un d'une belle couleur de chair, & plus grand que celui représenté dans la premiere Planche

pl. I, lett. A.

* Arg. app. de l'Appendice de d'Argenville *; l'autre n'en différe qu'en ce qu'il est un peu moins grand & de couleur blanche, Ils sont de la plus parfaire conservation.

33. Deux rares Lépas Magellaniques papyracés à tête recourbée, & grands dans leur espèce. Ils sont en forme de gondole, à tête placée à l'une des extrémités de la base. & un peu recourbée sur ce même point, à stries transversales qu'on n'apperçoit qu'à la loupe, blancs en dessus, nacrés en dedans,

34. Douze autres Lépas Cabochons de moyenne grandeur & petits; sçavoir, deux Les Lepas, fauves nués de marron, à stries longitudinales, granuleuses vers le haut, tuilées dans le bas, & à léger recourbement de tête regardant l'un des deux bouts *. Un autre avec son * Gualt indi épiderme à stries, alternativement granuleuses tab. 9. litt. V. & hérissées de petites tuiles fort saillantes. Un petit blanc de la Barbade, à stries transversales & ridées, à base irréguliere, & à recourbement de tête regardant un des côtés *. Un * Litt. tabi petit blanc du même lieu à stries longitudi- 544 fig. 31. nales, revêtues de Drap Marin, à base ronde & à recourbement de tête contourné *. Un petit blanc à stries fines, transversales, granuleuses & à base ronde *. Deux blancs & gris, nués de verd, de forme conique à stries 544 fig. 30. longitudinales. & à sommet un peu recourbé. Un blanc à stries transversales, onduleuses & ridées, & à recourbement de tête descendant jusqu'à la base. Deux Bonnets de Dragon de l'espéce de ceux de l'article 32, mais plus. petits *; & un petit de l'espèce de ceux de l'ar- * Arg. pl. si ticle 33.

35. Un Lépas rare de couleur fauve, à grosles stries rabotteuses, longitudinales, & à petites transversales qui se croisent en réseau, à base ovale & à tête recourbée sur l'un de ses côtés; l'intérieur ressemble à une valve de I. FAM. LES LEPAS. * Arg. pl. 2. lett. D.

came qui seroit destituée de charniere, ce qui lui a fait donner le nom de Concho-Lépas *.

GENRE SECOND.

LÉPAS A COQUILLE PERCÉE EN DESSUS.

36. Un Lépas rare de Magellan, à base ovale, de plus de trois pouces de long, sur plus de deux de large, de sorme assez élevée, à stries longitudinales, serrées, coupées par quelques autres transversales, & à vingthuit larges rayons alternativement blancs & violets, nués d'incarnat vif, le trou ovale du sommet a un demi-pouce de long sur trois lignes de large, & est bordé de blanc.

37. Un de même espéce, à cela près ; qu'il est plus large, & que ses rayons sont alternativement violets & blancs nués de ver-

dâtre.

38. Deux Lépas en pendant, de la variété de celui de l'article précédent, mais un peu moins.

grands.

39. Douze Lépas de différentes grandeurs, tous percés au sommet; sçavoir, un à large ouverture, & à côtés comprimés, qui lui donnent la forme d'un canot. Un marbré de blancfale & de verd céladon, à stries inégales & ser-

40. Trente - quatre autres de différentes grandeurs, tant réticulés que striés, de toutes les variétés de l'article précédent, excepté la seconde.

GENRE TROISIEME.

LÉPAS A COQUILLE CHAMBRÉE,

41. VINGT-UN Lépas de moyenne grandeur & petits; sçavoir, deux blancs * flambés * LIQ. tab. de brun-rougeâtre, de forme plate, à base Adans. Hist. du irréguliere, à tête saillante en forme de bec senge. pl. 2. in peu recourbé, & à cloison paralléle à la base, occupant près de la moitié du dedans,

LES LEPAS.

Quatre autres, dont trois blancs, nués de fauveclair. & un orangé, à stries longitudinales, inégales & hérissées do petites pointes, à tête recourbée & contournée qui leur donne une forme approchante de celle des Oreilles de Mer; leur chambre est à peu-près semblable à celle des précédens. Un de forme peu disfé-. rente, mais lisse & à robe verd-de-terrasse, picottée de petits points grifâtres. Deux blancs, lisses, de forme un peu bombée, & à tête recourbée de biais jusqu'à la base, imitant trè :bien une Nacelle: ils ont beaucoup de ressem-

Hist. du blance avec le Garnot de M. Adanson *. Deux Séneg. pl. 2. plancs papyracés, de forme ovale très-applatie, approchant beaucoup du Jenac du même Au-

* Ibid fig. 10. teur *. Deux autres blancs papyracés, de forme plus allongée, & qu'on nomme Sandales. Deux à coque épaisse, à tête un peu recourbée, descendant presque jusqu'à la base, & sous laquelle on apperçoit en dedans une espéce de très-petite chambre; leur robe est lisse & panachée de petites larmes en losange,

blanches, vertes & violettes *. Deux de mê-* Rumph. tab. 40. litt. O. me espéce, mais à fond brun & larmes fauves. Deux petits fauves de la Méditerranée, en

forme de cônes évasés, & à petite chambre Arg. pl. 2. dont l'ouverture s'étend du centre à un des el. 1. nº. 12. points du bord *, nommés le Bonnee Chinois; list. tab. 146.

fig. 38.

9 I

& deux des Indes de même espécé, mais I. FAM. blancs; dont un à stries longitudinales, iné-LES LEPAS! gales & peu serrées, & l'autre lisse au sommet, imitant le bout d'un mammelon.


GENRE QUATRIEME.

LEPAS A APPENDICE EN DEMI-CORNET.

42. NEUF Lépas, sçavoir, deux blancs papyracés, à stries longitudinales, très-fines, & à grosses stries transversales, onduleuses, à base irréguliere, à tête élevée & saillante en bec de Corbin, & de l'espèce nommée Cabochon *. Deux autres de la même espèce, mais * Arg. pl. 25 dont les grosses stries transversales serpentent ind. tab. 9. & se croisent en divers sens; ce qui les fait litt. Z. paroître comme ridés. Deux autres Cabochons blancs de Saint Domingue, différens des précédens, en ce que les stries longitudinales ensont fortes & bien marquées, & que les transversales y paroissent à peine. Deux petits blancs seuillerés, formés chacun comme de sept autres papyracés, empilés, à distance inégale les uns sur les autres, & qui vont en diminuant de volume à mesure qu'ils approchent du sommet, imitant par-là un toît Chinois à plusieurs étages, d'où ils ont tiré leur nom de

COQUILLES UNIVALVES

leg. pl. 2. Toits Chinois *; & un petit blanc & conique à stries longitudinales bien marquées, à trois renslemens circulaires, terminés par un petit bouton, & nommé Bonnet de Matelos.



SECONDE FAMILLE.

OREILLES DE

II. FAM. CE sont des Coquilles ouvertes & ap-OREILLES platies qui n'ont qu'une seule spirale, & qui ressemblent assez bien à l'oreille humaine, d'où elles ont pris leur nom. Elles ont ordinairement une rangée de trous ronds disposés sur une ligne courbe; mais quelques-unes en étant privées, nous en ferons un genre à part. Ces deux genres sont :

1º. Les Oreilles de Mer à trous.

2°. Les Oreilles de Mer sans trous.



GENRE PREMIER.

OREILLES DE MER A TROUS.

43. UNE Oreille de Mer, des Indes, rare, dépouillée, d'une très-belle Nacre, ayant plusieurs semences de Perles dans son milieu, DE MER & portant cinq pouces & demi sur quatre *.

44. Deux autres un peu moins grandes, non tab. 69, litt. dépouillées, à profonds fillons, à thries élevées en vive arrête. onduleules & rabattues toutes d'un même côté en for ne de feuilles roulées. La Nacre du dedans offre aux yeux toutes les couleurs de l'Arc-en-ciel *.

45. Deux comme les précédentes, dont une dépouillée.

46. Trois belles Oreilles de Mer, Orientales, de sorme étroite allongée, l'une à stries presqu'imperceptibles, revêtue de sa pellicule d'un beau verd-pré, tacheté de blanc - sale; les deux autres dépouillées & très grandes dans leur espéce. Leur Nacre intérieure est du plus bel Orient *.

47. Sept jolies Oreilles de Mer, sçavoir, E. une rare des Indes, jaune, marbrée de blanc-lett. sale, à stries longitudinales ondu euses, coupées d'autres plus fines transversales, à bord

DE MER.

II. FAM extérieur granuleux, mais sur-tout remarqua-OREILLES ble par une suite de tubercules paralléles aux trous dont l'Oreille est percée, & qui se prolongent en spirale jusqu'à la clavicule où ils forment une espèce de Couronne. Deux autres aussi des Indes à robe aurore réticulée. & à deux larges cannelures bordant des deux côtés la rangée de trous & de tubercules. Deux de Rio de la Plata à coque plus mince & à stries plus régulieres que celles de nos Mers; & deux petites de l'espéce de l'article précédent.

48. Douze Oreilles de Mer de nos parages, sçavoir, un affortiment de six à peu près de même grandeur, percées de 4, 5, 6, 7, 8 & 9 trous, conservant leurs pellicules marbrées Arg. pl. 3. de diverses couleurs *. Une à stries en forme * Ibid. lett.D. de feuilles ou rides très-saillantes *. Deux grandes chargées de Glands de Mer, & trois dépouillées, dont une orangée aurore & cerise, de diverses nuances & d'un grand éclat, tant en dessus, qu'en dessous, & au-dedans de laquelle adherent des semences de Perles, mais dont le bord paroît avoir été rogné jusqu'en deçà des trous qui y manquent.

GENRE SECOND.

OREILLES DE MER SANS TROUS.

49. ROIS Oreilles de Mer, sçavoir, deux blanches de forme applatie, & nommées Oreilles de Venus, à stries très-sines *; & une DE MER. petite très-rare d'une autre espèce, blanche, *Arg. pl. 3. marbrée d'orangé, légerement striée, nacrée en dedans, & de sorme bombée *.



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX ET VERMICULAIRES.

On les appelle ou Tuyaux de Mer, ou Vermiculaires, selon qu'on les ren-

96 COQUILLES UNIVALVES

TIII. FAM: contre ou isolés, ou groupés ensem-TUYAUX ble en masses plus ou moins grosses, & ET VERMI-EULAIRES. ces dénominations distinctives donneront lieu à les partager ici en deux Genres:

- 1°. Les Tuyaux de Mer.
- 2°. Les Vermiculaires.

Auxquels nous ajouterons, par forme d'appendice, un troisième Genre, qui sera composé de ceux qui sont sormés d'une substance cartilagineuse & slexible, ou de grains de sable & de fragmens de Coquilles, ou de grains de sable seulement, liés ensemble par un suc glutineux, soit qu'on les trouve seuls ou groupés. Quoique nous ne regardions pas ceux de ce dernier genre; comme des Coquilles proprement dites, nous n'avons pas cru devoir les ranger ailleurs, vû leur ressemblance avec les précédens.

GENRE PREMIER.

TUYAUX DE MER

Jo. Un très-beau Tuyau de Mer de l'Isle d'Amboine, nommé l'Arrosoir ou le Pinceau III. Fam.

de Mer, de six pouces & demi de long & parsaitement conservé. Il est de couleur blanche à culaires. tête arrondie en sorme de gland, & percée de petits trous, couronnée d'une espèce de fraise sormée de petits tubes accolés & tenans les uns aux autres, comme autant de portions de rayons d'un même cercle *.

* Arg. pl. 32

51. Deux Arrosoirs de la côte Coromandel, lett. G. list. 548. fig. moins grands que le précédent, & à tuyau 3 un peu recourbé, l'un à tête & fraise applaties, & l'autre à fraise fort irréguliere. Une tête d'Arrosoir, coupée au-dessous de la fraise pour faire voir l'organisation intérieure, & un Tuyau d'Amérique blanc nué de violet, ridé, & à deux replis irréguliers, dont l'extrêmité la moins grosse est fermée par une demi-sphére lisse & luisante.

52. Le grand Tuyau de mer de l'espèce des solen du sable, de sorme cylindrique, droite, ridée, & composé comme de plusieurs picces entées l'une sur l'autre, sormant un seul tube,

Tome I.

excepté à l'extrêmité supérieure qui se partage Tuxaux en deux par une cloison longitudinale d'un ET VERMI- pouce de long. Il est fort épais, d'un blanc sale, CULAIRES.

& a dix-huit pouces de haut sur quinze lignes de diametre dans le bout le plus gros. Sa forme qui ressemble parfaitement à un cierge, lui en

1 Seba, tom. peut faire donner le nom 1.

Klein tub. mar. tab. 1, fig. 3.

53. Onze autres, sçavoir, quatre de l'espéce du précédent, & dont le plus gros qui est courbé, a 5 pouces & demi de long, sur un pouce & demi de diametre. Un cylindrique, de huit pouces & demi de long, de cinq lignes de diametre. & formé de quatre additions ou jets: & six petits d'Amérique un peu courbés, dont le diametre va en s'étrécissant comme aux pré-

2Rumph.tab. cédens 2. . AI D°. 3.

54. Dix-huit Tuyaux de mer; sçavoir, deux grands Dentales des Indes, cannelés, de couleur verte foncée dans le bas, qui s'éclaircit

3 Arg. p'. 3. jusqu'au blanc vers la pointe 3. Deux semblalett. HH. Bo-nanni. no. 8. bles, à cela près qu'ils sont plus minces, &c

A Lister, tab. à cannelures plus étroites 4. Deux autres blancs 547, fig. 1. droits & courts à cannelures plus profondes 5.

Huit Antales, lisses & blancs 6. Et quatre aulott. KK. Bo- tres légerement stries, dont deux aurore nués nanni. nº. 9. par zones de blanc, & deux couleur de rose

nués par zones de verd 7.

7 Gualt. tab. 10. litt. F.

55. Un tuyau de mer des Indes & de la plus grande rareté, de couleur blanche, auquel sa tessemblance avec un Escalier a fait donner le nom Italien de Scalata. C'est un tuyau contournérégulierement en spirale de huit orbes, qui se ET VERM sumontent les uns les autres en forme de vis CULAIRES. conique. & dont le plus bas revient en cornet former une bouche ovale; il est revêtu extérieurement & à distance égale, d'anneaux blancs, saillans en vive arrête, se rapportant & partie se joignant d'orbe en orbe, & laissant entre deux, d'un orbe à l'autre, des jours à raison de neuf par orbe, à commencer de la bouche même que le premier borde. Il a deux pouces de haut & est des mieux conservés *.

56. Deux gros tuyaux de mer, rares, de Gault tab.10. lett. ZZ. Arg. couleur grise, de forme presque cylindrique, pl. 11. lett. V. contournés en spirale, & nommés Tire-bourres. Cette espéce est remarquable par des stries circulaires onduleuses & ridées, & par une fente droite qui regne dans la longueur de toutes les spires, & qui en laisse voir en plusieurs endroits le dedans. La clavicule est applatie dans l'un & faillante dans l'autre *.

*Séba pl. 94;

57. Cinq Tire-bourres de l'espèce du dernier des précédens, groupés à côté les uns des autres sur une production de mer grisâtre & couverte de houpes de petits poils transparens, semblables à des filamens d'alun de plume.

58. Quatre autres plus grands que les précédens, groupés sur une production marine de même espéce. Gii

100 COQUILLES UNIVALVES

III. FAM.

TUYAUX nommée Solen Serpent; sçavoir, deux

ET VERMI- fauves, dont les replis se terminent par une

CULAIRES. clavicule en forme de vis très-aigue à son ex
*Gualt. tab.

10. litt. Q.

Arg.pl. 4 lett. deux ridés & tortillés, de couleur rousse, dont

un lisse d'autre strié; un à côtes long tudinales épineuses, à sillon dentelé, & à replis

*Rumplitab.

41. litt. H.

Gualt. tab. 10 & un gros & long à trois faces, dont deux
plates, & la troisséme arrondie, à stries lon-

* Bonanni. gitudinales & transversales *.

60. Dix Tuyaux de mer; sçavoir, un gros Serpent, à stries longitudinales granuleuses; plié en spirale & adhérent à un morceau de corail oculé blanc. Trois accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intestins. Deux rares à robe rabotteuse, roulés en forme de cornes d'Ammon, l'un à trois &

*Arg. pl. 4- l'autre à deux contours *. Un grand nombre de très-petits blancs, adhérens à l'Algue ma-

* List. tab. rine, nommés par Lister Nautiloides *. Trois 554.f. 5. Klein tub. mar. tab. petits Tire-bourres de l'espèce du premier de l'article 56, & trois autres de l'espèce des deux premiers de l'article précédent.

61. Deux Tuyaux de mer d'Amérique, rares, d'un petit diametre, & d'une extrême lon-gueur, tortillés chacun en deux spires d'un grand nombre de révolutions, & ressemblans à des

pents pains de Bougie, ce qui nous leur en fait donner le nom.

62. Huit Tuyaux de mer chambrés; sçavoir, ET VERMIun très-rare aurore clair, à six replis irrégu- CULAIRES, liers, & ouverture longitudinale dentelée des deux côtés, à petites chambres intérieures, tournant leurs convexités du côté du bout le plus mince, & qui paroissent destituées d'un fiphon qui les traverse toutes, tel qu'on l'observe dans celles des Nautiles chambrés. Six autres, ronds, roulés en spirale plate, à cloisons nacrées, traversées d'un siphon, nommés Ammonies, & en Hollande Cornets de Postillon *. Un autre de même espèce, percé de * Arg. pl. 54 quelques trous latéraux pour en faire voir les lett. GG. chambres; & quelques diaphragmes ou cloisons détachées garnies de leur siphon,



GENRE: SECOND

VERMICULATRES.

63. ROIS grands & beaux groupes, l'un de III. Fam. gros Tuyaux Vermiculaires du Golfe de VeTUYAUX nife, à stries longitudinales granuleuses; les CULAIRES. deux autres de la Méditarranée, moins gros, lisses & blancs. Ils adhérent l'un à un grand

* Arg. pk. 4. Peigne, l'autre à une valve de Cœur de Bœuf*.

64. Quatre autres groupes, des deux varié-

* Ibid. pl. 4. tés de l'article précédent *.

65. Neuf Variétés de Vermiculaires, sçavoir, un groupe de Vermiculaires peu communs, minces comme du fil sin & diversement

* Séba tom, tortillés *. Un autre de deux tubes à plis cir-3 tab. 100. n°. culaires en vive arête de distance en distance,

qui les sont ressembler à plusieurs gobelets empilés les uns dans les autres, & qu'on nomme Tuyaux Trompettes. Une grosse Came chargée de vermiculaires blancs & triangulaires à côte longitudinale en vive arête sur le milieu du corps. Et six autres Variétés dont quelques-unes déjà décrites.

66. Quatre groupes de Vermiculaires, dont Adanson, deux blancs operculés du Sénégal, nommés Verphinnent mets *. Et deux réguliers d'un beau pourpre

foncé. connus sous le nom de Tuyaux d'Orgue. Plus un opercule de Vermet détaché, ainsi que l'animal *.

67. Un groupe de Tuyaux d'Orgue, de près de huit pouces de longueur, sur près de lett. A six de largeur & autant de hauteur.

68. Un autre groupe de Tuyaux d'Orgue; moins gros que le précédent, mais de couleur plus vive.

69. Un grand & beau groupe de Tuyaux Vermiculaires de la Méditerranée, partie operculés, partie de l'espéce appellée Tuyaux Trompette, lequel renferme plusieurs pétoncles.

70. Deux amas de Vermiculaires très-blancs, groupés à l'entour de fragmens de bâtons, & qui posent fur des pieds de bois des Indes; & un autre amas de Vermiculaires, semblable à celui de l'article précédent, mais plus petit.

71. Un gros groupe de Vermiculaires du Sénégal, des deux espéces, brune & blanche, nommées Vermets & Dofans *, formé en * Adans. pli éventail, auguel adhérent des huîtres feuillettées & des glands de mer : il a dix pouces de haut sur douze de large, & est posé sur un pied. de bois noircia



GENRE TROISIEME.

TUYAUX ET VERMICULAIRES NON TESTACÉS.

RENTE-CINQ Tuyaux de mer; fçavoir, fix cartilagineux, dont un fimple & mince, Tuyaux un peu élastique, brun rougeatre, les cinq autres. ET VERMI- un pededanique, stanfougearie, es einq aures.

CULAIRES. font des étuis de Scolopendre, à double coque, dont l'extérieure est mince, grise noirâtre & ridée, l'intérieure un peuplus épaisse, très-lisse, de la dureté & transparence de la corne. M. Ellis *Ellis, pl 34. les nomme Coraline eubuleuse de Malte *. Trois mar. tab. 1.1. d'une autre variété, cartilagineux, longs, minces & fragiles. Douze à robe raboteuse & fragile formée de sable & de fragmens de co-* Klein, tub. quilles *. Deux autres de même espéce, mais mat. tab. 1. f. de consistance plus solide; six autres adhérens à autant de pointes d'oursins. Quatre papyracés de forme conique tronquée, lisses : & fragiles *. Et un de la côte de Coromandel * Klein Ibid. à robe seulement formée de fragmens de cotab. 1.f. 5. quilles. Plus une Scolopendre de l'Isle de Saint-Helene, avec son tuyau, conservés dans l'Esprit de vin.

73. Un gros groupe de Tuyaux Vermiculaires de l'Océan, formés de fable & de fragmens de coquilles; la surface, où aboutissent les bouches des tuyaux, offre à l'œil des compartimens à peu près semblables à ceux des III. Fam.

TUYAUX ET
gâteaux des mouches à miel *, mais dont les VERMICU-,
cellules seroient rondes & non exagones; il LAIRES.
est de la plus belle conservation, & porte 15 * Ellis, pl.
pouces 3 lignes de large sur 5 & demi de haut. C. Mém. de
74. Deux groupes de Vermiculaires; sça-l'Acad. des Sc.
an. 1711, p.
voir, un de l'espèce de ceux de l'article pré134, pl. 2, s.
cédent, mais d'un volume à pouvoir entrer
dans des tiroirs. & un d'autre espèce formé de

voir, un de l'espéce de ceux de l'article précédent, mais d'un volume à pouvoir entrer
dans des tiroirs, & un d'autre espéce formé de
gros sable blanc seulement, & venant de l'Isle
de l'Ascension: plus des boëtes où sont des sables & autres fragmens provenans de la décomposition d'une partie de chacun, qu'on a
rassemblés pour pouvoir à volonté les examiner au Microscope.



QUATRIEME FAMILLE.

NAUTILES.

IV. FAM. NAUTILES. E sont des Coquilles contournées en spirale de trois révolutions, toutes dans un même plan, & dont la derniere paroît seule extérieurement. Elles ont l'apparence d'un petit navire ou gondole à poupe élevée.

Les Coquilles de cette Famille sont ou épaisses & cloisonnées, nacrées en dedans, à carenne lisse & arrondie; ou papyracées & non cloisonnées, ni nacrées, à carenne tuberculeuse plus ou moins large, d'où résulte leur division en deux genres.

- 19. Les Nautiles épais & chambrés.
- 2°. Les Nautiles papyracés non chambrés.



GENRE PREMIER.

NAUTILES ÉPAIS ET CHAMBRÉS

N grand Nautile des Indes, fauve trèsclair, à flammes onduleuses cannelle dans la IV. Fam. moitié de sa robe la plus voisine de la tête, & NAUTILES. à grande tache noire dans l'origine de la seconde révolution *.

76. Un autre blanc qui differe du précédent lett. E. en ce que sa tache noire y est plus grande & se prolonge en une raye fine qui borde l'intérieur de la bouche *.

77. Un autre fauve foncé, à flamme can-17, fig. A. nelle, & où la tache noire ne forme qu'une zone peu large.

78. Un autre dépouillé & par-là nacré, tant en dedans qu'en dehors, & d'un bel orient.

79. Trois Nautiles chambrés & umbiliqués, dont un de moyenne grandeur à flammes blanc de lait dans toute sa robe, & deux petits dépouillés *.

80. Les mêmes Nautiles qu'à l'article pré-lett. F. Gualt, cédent, excepté que l'un des deux petits n'est point dépouillé.

81. Un grand Nautile chambré, coupé en deux suivant sa longueur pour en laisser voir l'inté-

rieur *. Un percé de divers trous du côté qui IV. FAM. répond à ses chambres, & vers la tête d'un NAUTILES. plus grand, laissant à découvert un intervalle * Gualt. pl. de trois cloisons; & la portion chambrée d'un autre, ouverte en divers autres sens.

GENRE SECOND.

NAUTILES PAPYRACÉS, NON CHAMBRÉS.

82. Un Nautile papyracé de la Méditerranée, blanc de lait, à stries onduleuses unies, à carrenne étroite, brune dans la moitié de sa longueur, de 7 pouces 4 lignes de long, avec son polype desséché & bien conservé *

lett. A. Ibid.

Zoomorp. pl. 83. Le même Nautile, mais moins long d'un:

84. Un Nautile semblable aux précédens à cela près que la couleur blanche en est moins vive, & que les bords d'une partie de la carenne en sont plus noirs.

85. Un Nautile des Indes papyracé, blanc tirant sur le sauve, à stries chargées de petits tubercules en sorme de grains de ris, à deux crochets saillans ou oreilles, à carenne large,

*Arg. pl. 5, & de 5 pouces 4 lignes de long *.

86. Un du Bresil de l'espèce du précédent, mais moins grand, & d'un beau blanc de lait.

3, tab. 84 s

87. Deux Nautiles, l'un de l'espèce du précédent, mais beaucoup plus petit; l'autre fans IV. FAM. tubercules, de couleur blanche tirant sur le NAUTILES. roux, à carenne large & très-petit *.

88. Un Nautile de moyenne grandeur, tom. 3, tab. à stries chargées de grains de ris, mais distant de reux des articles 85 & 86, en ce qu'il n'a pas d'oreilles, & par-là plus rare *. *Seba, tom.

CINQUIEME FAMILLE.

LIMAÇONS.

- E font des Coquilles contournées en spirale, depuis deux orbes jusqu'à V. FAM. dix, dont on distingue trois genres; LIMASONS! scavoir,
- 1°. Les Limaçons à bouche ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.
- 2°. Les Nerites ou Limaçons à bouche demi-ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.
- 3°. Les Sabots ou Limaçons à bouche ovale & à levre intérieure, presque parallele à la base.

GENRE PREMIER.

LIMAÇONS A BOUCHE RONDE.

V. FAM. blanc, nué de gris de lin, nommés Dauphins*.

*Arg. pl. 6, Beux autres Dauphins un peu plus lett. H. Scha, grands, l'un couleur de lilas, & l'autre sans rab. 19, n°. 15 avoir été nétoyé *.

* Seba, ibid. 91. Deux autres plus grands, à pointes & feuilles plus nombreuses, mais moins saillantes

* Séba, ibid. qu'aux précédens *.

٠.

nº., 8&11.

92. Deux très-grands Limaçons des Indes,

Gnalt. tab.68,
litt. D.

de forme renssée, & du genre des Burgaux

nommés Olearia, parce que les anciens s'en

fervoient pour mettre de l'huile. L'un est um
biliqué & d'un verd foncé; ce qui le fait aussi

nommer Proposer d' L'appen différe du pre

*Bonan. cl. nommer Pot-verd *. L'autre différe du pre-3, n°. 9. mier en ce qu'il n'a point d'umbilic; il est délitt. A. pouillé & montre en dehors comme en dedans

*Gualt. tab. une très-belle nacre *. Plus un grand Oper-68, litt. A. cule qui appartient aux Coquilles de ce genre.

93. Deux Burgaux dépouillés de l'espèce du dernier des précédens, mais moins grands.

94. Deux Burgaux, l'un plus grand, l'autre moins, à robe verte, marbrée de blanc & de marron, nommés en Hollande Princesses.

Dans le plus grand, la côte la plus élevée se rend à la bouche par un gros pli formant en v. FAM, dedans une espéce de gouttiere *. L'autre est Limaçons.

*Rumph. tab.
19, litt. A, B.

95. Deux Burgaux rares, sçavoir, un dé-séba, tab. 74, pouillé en partie, dont la robe n'offre aux yeux que du noir & de la nacre, & qu'on nomme Veuve perlée; & l'autre dépouillée jusqu'à la nacre qui est très-brillante; tous deux à tête orangée *.

* Arg. pl. 8

96. Un plus gros, de même espéce, aussi dé-lett. B. pouillé, à robe nuée de rouge & d'orangé, de l'éclat du rubis.

- 96. Le même Burgau que le précédent, dépouillé en partie seulement, noir & orangé dans le reste, nommé Burgau perlé.
- 98. Deux Burgaux rares de la Chine, verd soncé, nués de jaune, à cannelures & stries circulaires & inégales, croisées d'autres trans-versales, fines & onduleuses, à cinq pas de spirale, & à très-petite queue: l'un à cinq rangs de tuiles saillantes, diminuant de grandeur de la bouche à la tête, & l'autre à deux rangs seulement.
- 99. Deux beaux Burgaux en pendant, blancs marbrés principalement par zônes d'un beau verd, dépouillés en quelques endroits jusqu'à la nacre, à tête un peu élevée, à six orbes, & nommés Perroquets perlés.

V. FAM. traits blancs interrompus, nommé Veuve, & LIMAÇONS. cinq autres flambés plus ou moins régulière-

² Gualt. tab. ment de blanc & de noir, nommés Petit deuil ² 88, litt. B.

Bonanni, cl. ou la Pie.

30. Arg. pl. 8, 101. Trois beaux Limaçons, sçavoir, un à lett. G. stries circulaires & tuberculeuses, nommé Bou-

² Arg. pl. 6, che d'or ²; un à stries circulaires, sans tuberculett. D. Séba, pl. 74, n°. 9, les, nommé Bouche d'Argent ³, & un à stries ⁴ Séba, ibid. longitudinales, serrées & peu prononcées, tab. 19, n°. 3. nommé Ruban 4.

4 Séba, ibid. 102. Trois Coquilles des espéces précédenpl. 6, lett. K. tes, mais un peu différentes par la grandeur & les couleurs.

103. Trois autres de marbrure différente, 156ba, pl. 74, sçavoir, une Bouche d'or 5, fermée par son 108. 11. opercule, une Bouche d'argent 6 & un Ruban. 104. Trois Limacons semblables aux précé-

104. Trois Limaçons semblables aux précédens, à cela près que les couleurs en sont un peu dissérentes, & que la clavicule de la Bouche d'argent est d'un rouge de corail.

105. Deux Rubans un peu différens des précédens, & l'un de l'autre, & une Bouche d'argent qui différe de celle de l'article 101, en ce que les pas en sont applatis & bordés extérieurement d'une strie plus sorte que les autres.

106. Deux grosses Bouches d'argent d'Amérique, & d'espèce rare, marbrées par bandes longitudinales, obliques & irrégulieres, l'une

de blanc & de fauve de diverses nuances, l'autre de blanc & de verdâtre, à grosses stransversales, un peu applaties, croisées d'autres longirudinales & obliques, très-sines & servées, à tête élevée, à six orbes arrondis, & à pas creusés en dedans.

107. Six Limaçons de moyenne grandeur; sçavoir, deux Rubans, deux Bouches d'argent qui sont à stries & à tubercules, comme les Bouches d'or.

ches, olives, & brunes, nommé Peau de serpene *; deux Bouches d'argent, l'une marbrée * Arg. pl. 67 de fauve & de brun, l'autre de verd & de noir; lett. C. un Perroquet perlé, un Pesit-deuil & un Ruban.

109. Dix Limaçons un peu moins grands que les précédens, & par pendans deux à deux; sçavoir, deux blancs tachetés par compartimens de noir, sans umbilic, & qui peuvent sormer une seconde espéce de Peties-deuils; deux Petus-deuils de la premiere espéce, deux Peaux de serpent, deux Perroquess perlés & deux Rubans.

deux noirs, nués de fauve dans le bout, nommés Marrous rôils *; deux de forme à peu près *Ibid. lett. I. semblable, & rayés par zônes de fauve, de jaune & de noir *; deux de forme bombée & *Gualt. tab. à bouche argentée, dont la robe est chargée 41, lit. A, C,

Tome I. H

d'une suite de petites taches oblongues, pourpre-clair, rangées par lignes circulaires :; deux LIMAÇONS. blancs tachetés de noir, par bandes longitudi-Lister, tab. nales en zig-zag, & du reste, semblables aux *Ibid. 6g. 33. précédens 2; deux petits Burgaux à tête élevée, marbrés de blanc sale & de noir, dont un dépouillé en partie & par bandes obliques jusqu'à la nacre : deux autres umbiliqués de l'espéce des Petits-deuils; deux Bouches d'or, deux Bouches d'argent, deux Rubans, un Limaçon dépouillé, d'une belle nacre, très-singulier en ce que la tête en est rouge de corail très-vif; un couleur de noise Re, à tête dépouillée, jouant l'opale; six autres dépouillés & nacrés partout. Plus deux bracelets faks, l'un de petits Burgautins dépouillés, enfilés ensemble, & l'autre de gros fragmens de Petits-deuils, avec un lambeau de ceinture de Sauvage, tissu de petits morceaux

111. Deux Burgaux des Indes, très-rares, verds, marbrés, l'un de blanc, l'autre de rouge & de blanc, à tête orangée, à quatre pas un peu applatis & obliques, bordés de tubercules peu élevés, à umbilic & à un pli dans l'angle des deux lévres, du côté de la bouche le plus près de la spirale.

de coquilles, violets & blancs, cylindriques &

creux.

112. Dix Limaçons des Indes; fçavoir, deux fauves qui différent des précédens par leurs stries pranuleuses, & en ce que l'un des deux n'est point umbiliqué; un de l'espèce de ce dernier, V. Fam. dépouillé & d'une belle nacre; un petit, d'est Limasons. pèce à peu près semblable, verd foncé, marbré state, de blanc; deux petits Burgaux de la forme des précédens, fauves, nués de verd, umbiliqués & légérement striés; un à robe marron clair, chargée de grandes taches blanches, & de huic lignes circulaires, ponctuées de blanc, nommé en Hollande le Turban Turc 2; le même dé-2 séba, table pouillé & d'une belle nacre, & deux blancs, à 74, n° 14. quatre orbes poin illés de pourpre, à stries granuleuses & à gros tubercules 3.

che d'argent d'une grandeur extraordinaire & de rouleurs très-vives; une Veuve, un Limacon dépouillé 4; deux percés à jour en différ, 4 séba, saba rens sens, pour donner la facilité d'en observer 74, n° 7.7. le dedans, & un opercule d'Olearia.

bouche ronde, dont douze variétés; sçavoir, un grand d'Olearia, blanc & lisse en dessus, à spirale fauve en dessous; un moins grand, de saumph, en forme plus bombée, à stries sines & onduleuses and litt. A. en dessus 6; deux aurore, nués de brun vers le litt. A. sommet 7; deux autres couleur de chair dans 20, litt. G. le bas, noirs aux sommets, qui ont appartenu à 7 Ibid. litt. B. des Bouches d'or; un blanc légérement strié, litt. L. little & verd d'Eméraude au sommet 8; deux litt. M.

granuleux, l'un blanc en dessus, & l'autre blanc LINAÇONS. nué de fauve dans le bas, verds au sommet; un grand, blanc, hérissé de tubercules dans sa * Gualt. tab. partie convexe *; fix Nombrils de Venus, lisses,

20 . Hith h convexes vers les bords, mais creux au milieu,

* Ibid-litt. de couleur rouge, un peu nuée de blanc *; E, F. Rumph. deux autres petits Nombrils de Vénus, blancs & granuleux en dessus; un très-petit, blanc, nué de couleur de chair. & six autres entiérement blancs.

GENRE SECOND.

LES NÉRITES.

115. ROIS Nérites des Indes, rares; sçavoir, une blanc-sale, à stries longitudinales. très-fines & serrées, un peu onduleuses; elle ne différe de la petite oreille blanche sans trous. de l'article 49, que par sa clavicule plus élevée & sa forme plus bombée *; une de même es-LIR ub péce, fauve-clair nué de blanc, polie, & dont les stries ont presque disparu, & une blanche à coque très-épaisse, à stries fines transversales. à lévre intérieure garnie de dents, & s'extravalant en forme d'excrescence sur toute la base.

k70, fg. 11.

116. Trois grandes Nérites umbiliquées, la premiere des Indes, fauve foncé, à quatre fascies blanches, tacherées de flamines brunes en zig-zag 1; les deux aurres nommées Cordonbleu par Dargenville 2. Celles-ci sont terrestres, V. FAM. & appartiennent à la troisséme Section.

117. Quatre Nérites umbiliquées, par pen- 1 Arg. pl. 75 dans; sçavoir, deux des Indes, nommées Testi- 2 Ibid. pl. 176 cules 3, & deux de l'espèce de la premiere de lett. B. 1 l'article précédent, mais un peu moins grandes. Lett. V.

118. Deux Nérites rares des Indes, fauves en dessus, blanches en dessous, nommées & Jaune d'œuf applati 4.

119. Quatre Nérices umbiliquées, dont deux tab. 21, lit. blanches, mouchetées de souci 5, & deux Tef- 5 Gualt. tab. 67. litt. S. List. tab. 564.

120. Six Nérites des Indes par pendans; sça- ag. 1.
voir, deux Grives 6, deux Mammelons blancs 7, & Arg. 21. 7, & deux umbiliquées, nommées en Hollande Jau-lett. B.
7 Ibid. lett.
nes d'œufs 8.

122. Deux Nérites des Indes, rares, blanc de lait, lisses, à quelques plis près qui regnent autour de leur spirale, umbiliquées, à appen-

H iij

COQUILLES UNIVALVES 8 T T

dice naissant du milieu de la lévre intérieure. & .V. FAM. se plongeant dans l'umbilic, & à angles des lé-Limaçons. vies, très-faillans.

123. Six Nérites des Indes, par pendans; sçavoir, deux rares de la Chine, fauve roux, à trois bandes longitudinales blanches, & umbili-*Arg. pl. 7. quées *; deux Mammelons blancs, & deux Mammelons souci, à tête & base blanche, ce qui

les rend rares. 124. Douze Nérites des Indes, par pendans, sçavoir, deux blanches, à trois bandes longitudinales, bariolées de canelle, dont les intervalles * Gual. tab. sont ponctués de même, & umbiliquées *; deux blanches, picotées de marron clair, à tête éle-· Ibid. litt. vée, & umbiliquées *; deux à grosses stries lon-N. Arg. pl. 7, gitudinales noirâtres, & cannelures profondes jaunâtres, à lévres intérieure & extérieure gar-

nies de dents *; deux marbrées par grandes ta-

ches de blanc & de verd noirâtre, à stries fines lett. I. * Ibid. lett. E. & égales *; deux Mammelons blancs nués de couleur de chair, & deux Quenottes saignantes des plus vives couleurs.

67. litt. Q.

125. Quatorze Nérites des Indes, par pendans; sçavoir, deux gris de lin, à trois bandes * Rumph. dongitudinales blanches *, & dont une conserve tab, 22. no. 2. fon opercule; deux blanches à stries longitudinales raboteuses, à lévres garnies de dents, confervant toutes deux leurs opercules; deux blanches, tachetées de noir, & à cannelures larges

Exprofondes *; deux semblables aux deux premieres de l'article précédent; deux comme les V. Fam.
septieme & huitieme du même article; deux
Limaçons.
* List. tab.
Mammelons, l'un blanc, l'autre souci, & 599. fig. 15.
deux très-belles Quenottes saignantes.

voir, deux des Indes, à stries longitudinales noires, & cannelures grises plus ou moins profondes, dont une avec son opercule; deux d'Amérique, noires, ponctuées de jaune pâle *; *Arg. pl. 7. quatre petites de la Méditerranée, jonquille, de noires de fauve clair *; quatre autres, marron fascié * List. tab. de fauve clair *; deux de l'espéce de la troisseme * Ibid. fig. & de la quatrieme de l'article précédent; deux 40. grandes Quenottes saignantes d'Amérique; deux grands Mammelons blancs; deux Jaunes d'œufs; & deux Grives.

127. Quatorze Nérites, par pendans; sçavoir, deux de la Méditerranée, blanc de lait, à six orbes renssés, à tête un peu élevée, & umbiliquées *; deux des mêmes parages, & de sorme semblable aux précédentes, mais d'un brun 67. litt. E. verdâtre; deux de l'espèce de la premiere de l'article 116; deux à peu près semblables aux septieme & huitieme de l'article 124; deux grandes Quenottes saignantes; deux Jaunes L'aus, & deux Grives.

128. Dix-huit Nérites, par pendans; sçavoir, deux des Indes, à fond blanc picoté de

V. Fam. tites des Indes, blanches, tachetées & ponc-Limaçons. tuées par zônes de roux, & umbiliquées; deux ** Arg. pl. 7. blanches, ondées en zig-zag de fauve roux: ** Adanf. Hift. du sénég. pf. c'est le Goches de M. Adanson *; deux à robe 13. fig. 4. ** List. tab. noire; deux petites, jonquilles, semblables aux 567. fig. 17. quarre de l'article 126; deux Quenottes saignances; deux grandes Grives; deux Jaunes d'œus, & deux Mammelons blancs.

129. Huit belles Nérites des Indes; sçavoir, une blanche, marbrée de sauve clair, à trois larges bandes longitudinales cramoisses; deux à trois bandes pourpre, & bariolées de blanc & de verdâtre; une de même espéce, mais à bandes plus prononcées, & taches verdâtres isolées; une gris de lin, tachetée par zône de brun & de verd céladon, à quatre orbes de sorme bombée, à bouche nacrée & doublée en dessus de blanc mat; ce qui a fait nommer cette Coquille Bouche double; une de même espéce, dépouillée, d'une belle nacre, à tête verd d'éméraude & à stries circulaires bien prononcées; deux blanches, umbiliquées, à lignes roussatres,

* Lift. tab. transversales & onduleuses *, & deux Quenot119-10. 1. tes faignantes.

1 30. Sept Nérites des Indes peu communes 3 sçavoir, deux à bandes longitudinales, alternatives blanches & noires, & à tête aurore; une àbandes alternatives noires & blanches nuées de lilas; deux de même espéce, dont les bandes

noires & blanches sont marbrées de jonquille
dans l'une, & de jaune dans l'autre :; deux

Bouches doubles; plus six petites Nérites, à lé-lett. M.

vre extérieure non garnie de dents, de Lister;
qui sont, la blanche à lignes noires fines, onduleuses, ombrées 2; celle à lignes larges, blanches & noires alternatives 3; celle à taches jau
sold-fig. 24;
nâtres 4; l'ondulée 5; la réticulée 6; & la blan
sold-fig. 24;
libid. figs
che à taches noires triangulaires 7.

132. Vingt-une jolies Nérites, d'especes, formes, couleurs & marbrures déja décrites, & ttès-variées.

133: Idem.

134. Trente-quatre Nérites, d'espèces, formes & couleurs non moins variées que les précédentes, dont deux d'une beauté finguliere, à trois zones orangées, & tachetées de verd & de noir sur un fond blanc.

135. Deux cartons contenant soixante-

V. FAM. LIMAÇONS.

seize petites Nérites des Indes & d'Amérique, d'un très-beau choix, & d'une très-grande variété.

136. Deux cartons contenant cent trente Nérites, plus petites encore que les précédentes, des mêmes parages, & non moins variées.

137. Quatre Nérites des Parages de Hollande, recouvertes d'une incrustation grise granuleuse & épineuse, qui paroît être un ouvrage de Polype; l'une est occupée par un Bernard l'Hermite. Six petites Nérites de Lister *. Un carton contenant soixante - quinze

* List. tab. Nérites choisses & très-variées. Une petite et fig. 31. & tab. 606. fig. boëte de semences de Nérites de la Barbade, 54. 35. 36. 37. d'un verd clair. * Une autre de petites Nérites * List. tab. du Brésil, bariolées de diverses couleurs, & nommées Pois de Mer. Une grosse Nérite fauve découpée en spirale pour en faire voir le dedans, & six opercules de Nérites de différentes gran-

* Gualt. tab. deurs , dont trois variétés *. ?o. litt. P. Q. Rumph. tab. 20. n°. 5 & 6. Lift. tab. 560. 6g. 4.



GENRE TROISIEME.

LES SABOTS.

138. Un grand Sabot des Indes, à base applatie, nommé l'Escalier ou le Cadran *.

V. FAM. LIMAÇONS. * Séba , tab.

139. Un Cadran semblable au précédent.

40. nº. 1 & 2. 140. Un grand Cadran de la Côte Coromandel, à stries transversales, plus profondes, à taches moins régulières & plus grandes que celles des précédents, dont il est une variété *.

* 1bid. no.

141. Deux Cadrans d'une troisiéme variété,

& moins grands que les précédens *.

142. Quatre Sabots de forme peu élevée: 13 & 14 Arg. sçavoir, deux d'Amérique umbiliqués, l'un blanc nacré, & l'autre verd nacré, appellés l'Eperon, tous deux grands dans cette espéce *; & deux Cadrans de moyenne grandeur, de l'espéce de ceux des articles 140 & 141.

143. Neuf Sabots; sçavoir, deux des Indes à stries granuleuses, à bouche nacrée, & à umbilic, connus sous le nom de Bouton de camiscle *; deux de la Méditerrannée, aussi um- lett 1.Q. List. biliqués, & de l'espèce nommée Sorciere *. Un pl.637. fig.25. Eperon semblable à ceux de l'article précédent, lett. S. à sa couleur près, qui est nuée de citron, de verd & de blanc. Deux autres petits Eperons fauve-clair, de forme fort élevée, & sans

umbilic *, & deux Cadrans semblables à ceux V. FAM. de l'article 141. LIMAÇONS.

144. Dix Sabots par pendans deux à deux: * Séba. tab. 59. nº. 5 & 6. sçavoir, deux Eperens de moyenne grandeur Kumph. tab. & de la premiere variété; deux de la seconde Ao. litt. I. variété, mais à pointes moins saillantes, dont un dépouillé. Deux Boucons de Camisole, deux Sorcieres & deux Cadrans.

pendant : l'un blanc - sale, mêlé de verdâtre, de forme conique un peu élevée, à stries longitudinales larges & un peu onduleuses, à trois tours de spire, à bords dentelés & à base List. tab. concave *; l'autre nué de verd & de grisde-lin, de forme conique plus élevée, à stries longitudinales moins larges & moins prononcées, à sept tours de spire, à base très-con-

cave, & umbiliqué.

\$17. fig. 13.

145. Deux Sabots des Indes, rares & en

146. Deux Sabots d'Amérique, de forme conique, à robe recouverte de diverses sortes de coquilles, ou fragmens de Coquilles, de Madrépores, de Cailloux, &c. à orbes renflés, raboteux, comme hachés à coups de marteau, & se recouvrant l'un l'autre de haut en bas, à base très-concave, & striée en spirale, & de l'espèce nommée en France Fripiere, & en Amérique Conchiliologie. Ceuxci sont très-grands dans leur espéce.

147. Trois Fripieres moins grandes que les précédentes, dont une chargée d'un grand V. FAM. nombre de très - jolies Coquilles, & les Limaçons. deux autres en pendant, moins chargées de Coquilles, mais sur chacune desquelles on voit un Fongipore de l'espèce nommée Œilles de Mer.

148. Deux Sabots des Indes & très-rares. noirs, à sept orbes bombés, à stries longitudinales, obliques, onduleuses, croisées irréguguliérement par d'autres transversales, à base fauve dans l'un, fauve nué de noir & de verd d'éméraude dans l'autre, & à bouche d'une très-belle nacre.

140. Douze Sabots par pendans deux à deux, sçavoir, deux des Indes à tête élevée, & à plufieurs étages chargés de tubercules finissant en pointe, qui les ont fait nommer la Pagode ou le Tou Chinois *; deux de la Méditerranée de sorme * Arz. pl. 6. moins élevée, à cinq orbes renslés, & cou-lett. A. Rumph. tab. romés de tubercules longitudinaux en forme 11. litt. A. de plis, à bouche nacrée, & à lèvre inférieure bordée d'aurore *; deux de même espéce dé- * Bonan. cla pouillés & nacrés : deux Sorcieres, deux Boutons 3. nº. 11. de Camifole, & deux Cadrans.

150. Huit Sabots; scavoir, deux grands umbiliqués, à tête élevée, de l'espèce nommée Cul-de-lampe, & qu'on appelle plus particu-Berement Bouton de la Chine *, l'un desquels *Arg. pl. &

V. FAM. cre. Deux verds & blancs, dont toutes les spires Limaçons. sont chargées de petites tuiles couchées de haut *Gualt. tab. en bas, un peu saillantes, & à bouche nacrée *.

Deux de l'espèce des troisième & quatrième de l'article précédent, dont un conserve son opercule. & deux des Indes, verd nué de blanc.

* Arg. pl. 8. duleuses *.

lett. L

151. Deux Culs-de-lampe de l'espèce des deux premiers de l'article précédent, mais plus grands.

à robe réticulée, & à grosses côtes obliques on-

152. Deux autres de même espéce, mais à base plus large, l'un desquels est taché par slammes plus grandes & moins consus ; l'autre est en partie dépouillé jusqu'à la nacre.

les précédens : sçavoir, un blanc, fauve & verd, à stries circulaires granuleuses *: un àpeu-près de même forme, & dépouillé en signe spirale, & trois umbiliqués, dont un à
*Rumph. spirale bordée d'un cordon de tubercules *, &
ab. 21. 10. 3. les deux autres de l'espèce de ceux de l'article
151.

154. Seize Culs-de-lampe de moyenne grandeur: sçavoir, deux Toûs Chinois de nos mers, verdâtres, nués de blanc-sale, à étages moins saillans, & à moins vive arrête que ceux des *Gualt. tab. Joshitt. M. Indes *; deux Culs-de-lampe verds nués de blanc, à base dentelée, & à tours de spire, chargés de tubercules *. Deux des mêmes V. FAM. conleurs, à base plus large, granuleuse & dentelée, à stries tuberculeuses, & umbiliqués*; deux 60. litt. N. * 1bid. litt. O. à flammes longitudinales, alternatives blanches & rouges, à stries granuleuses, & umbiliqués *: * 16id. tab. deux marbrés de blanc & de verd, de forme 61. litt. E. un peu rensiée, à stries granuleuses & tuberculeuses, aussi umbiliqués *; deux à flammes lon- * Ibid. line gitudinales alternatives blanches & vertes. à DD. stries granuleuses, & à base un peu concave *: * List. tabi deux de l'espèce du premier & des deux der- 631. fig. 17. niers de l'article précédent, & deux dépouillés.

155. Dix-neuf Culs-de-lampe de moyenne grandeur, & au-dessous; sçavoir, deux lisses marbrés de rouge & de violet, à orbes séparés par un cordon *; deux à stries fines circulaires, * Gualt. dibmarbrés de blanc & de jaunâtre *; deux couleur de souci, lisses & à bouche moins com-G. primée *; deux rose-seche, à stries circulaires fines & granuleuses, à base un peu con-L vexe a tachetés cà & là de petits points rougeâtres *. Un rare à stries circulaires blanches & ficelées, & à cannelures noires, chargées elles-M. mêmes de stries obliques très - fines, à base platte, & umbiliqué. Deux petits à robe-grise tachetée de violet-foncé, à cinq étages de spire bombés & détachés, à côtes longitudinales un peu tuberculeuses, & umbiliqués. Un cou-

V. FAM, Limaçons.

leur de rose, à larmes blanches disposées régutiliérement & à distances égales autour de sa spirale, à stries circulaires, sines & granuleuses, & umbiliqué. Un marbré de blanc & de rouge, à stries circulaires granuleuses & tuberculeuses. Deux tachetés de verd, de noir & de violet-clair, à stries cordelées, à base rensiée, & à bouche nacrée, doublée de blanc mat, ce qui les sait nommer Bouches doubles, & quatre dépouillés, dont deux umbiliqués.

156. Neuf gros Sabots, sçavoir, deux d'Amérique blancs nués de couleur de rose pâle
& de verd, à cinq orbes renssés, bordés chacun dans le bas de trois cordons, tuilés de distance en distance, & chargés de stries & de
plis tuberculeux, à base striée & nuiée circuséta, tab- lairement, & à bouche dentelée *; deux

€0. n°. 1 & 3.

Culs-de-lampe de l'Isle de France, blancs nués de verdâtre, de forme conique très-élevée, à côtes tuberculeuses saillantes le long de la spirale & à base dentelée *; un du même endroit,

Bonan. c.

rale & à bale dentelée *; un du même endroit, gris verdâtre, à grosses côtes longitudinales obliques, disposées de façon que celles d'un pas répondent aux cannelures de l'autre pas, à base striée circulairement & dentelée; deux comme les troisième & quatrième de l'article 149, & deux comme les derniers de l'article 150.

157. Trente-deux jolis Sabots de couleur & de

de formes très-variées, & des espéces déja décrites: sçavoir, dix Cul-de-lampes gran leux, V. FAM. dont deux dépouillés; huit lisses, dont quatre dépouillés; quatre striés, dont un dépou llé & un découpé en spirale pour faire voir le dedans; deux Toîts Chinois de nos mers, deux Cadrans, deux Boutons de Camisole, deux Bouches doubles, & deux petits Sabots de l'espéce des troisième & quatrième de l'article 149.

158. Neuf Limaçons rares; sçavoir, deux des parages de Mississipi, violet trèsfoncé, lisses, à cinq orbes renslés, & à tête orangée, l'un desquels est dépouillé en partie jusqu'à la nacre, qui est striée circulairement. & d'un bel orient; six Magellaniques papyracés, perlés & à stries circulaires très - fines, dont deux à petites zones couleur de rose; deux à raies noires circulaires, & deux blancs; un gris-noiratre des Indes, à grandes taches blanches quarrées, placées à distances égales dans le bord supérieur de chaque orbe, & à mouchetures blanches dans le reste, à stries circulaires très-fines, de forme un peu applatie, à six orbes, dont le premier est très-large & umbiliqué.

159. Deux cartons contenant 120 petits Sabots des Indes, tous de même forme, un peu applatie, de couleurs, marbrures & deffeins extrémement variés.

Tome I.

160. Idem.

V. FAM.

161. Quatre très-grands Cul-de-lampes; LIMAÇONS. sçavoir, un blanc flambé réguliérement de rougeâtre, à orbes renslés dans le bas, un peu concaves dans le haut, & à base un peu convexe; un à flammes plus irrégulières de l'espèce du premier de l'article 150, auquel adhere un Madrépore, & deux dépouillés & découpés en spirale pour en faire voir l'intérieur.



SIXIEME FAMILLE.

Buccins.

CE sont des Coquilles contournées en volute, à plusieurs spirales, dont la plus VI. FAM. BUCCINE. basse est beaucoup plus grande que les autres; ce qui les rend grosses par le milieu. Elles sont ordinairement dépourvues de pointes & de tubercules, & ont toutes une grande bouche oblongue qui est ou entiere, ou échancrée, ou terminée par une queue plus ou moins longue, d'où nous les diviserons en quatre genres; sçavoir,

- 1°. Les Buccins à bouche entiere, dépourvue de queue.
- 2°. Les Buccins à bouche échancrée, dépourvue de queue.
- 3°. Les Buccins à bouche garnie d'une queue peu longue.
- 4°. Les Buccins à bouche garnie d'une longue queue.

VI. FAM. BUCCINS. Les Naturalistes ont été fort peu d'accord jusqu'à présent sur la distribution de cette famille, qu'ils ont aggrandie ou ressertée, suivant l'idée plus ou moins étendue qu'ils attachoient au mot Buccin, qui, de lui-même, est assez vague. Nous aurions bien destré

moins étendue qu'ils attachoient au mot Buccin, qui, de lui même, est assez vague. Nous aurions bien destré suivre une autre route, en partageant cette nombreuse samille en plusieurs autres petites, dont les caractères auroient été plus précis; mais, comme nous n'avons dessein que de jetter un peu d'ordre dans se catalogue, & non de faire un traité de Conchiliologie, nous avons cru qu'il suffiroit de suivre les divisions déja reçues, en y faisant les changemens qui nous ont paru in-dispensables.

GENRE PREMIER.

BUCCINS A BOUCHE ENTIERE, DÉPOUR-VUE DE QUEUE.

162. Un Buccin des Indes, revêtu de son = épiderme marron à huit orbes, à bouche cou- VI. FAM. leur de chair garnie de deux dents. & de for-Buccinis. me approchante de celle d'une oreille, ce qui l'a fait nommer Oreille de Midas, il est très-grand dans son espéce *.

163. Une Oreille de Midas de l'espèce de la 10. lett. G. précédente, & de même grandeur, mais dé-fig. 21 & 21. pouillée. & d'une belle couleur de chair.

164. Deux petites Oreilles de Midas, dont une grise à stries longitudinales onduleuses & granuleuses, à bouche blanche garnie de deux dents, & à quatre orbes seulement *; l'autre est * List tab. 120 semblable, mais dépouillée. fig. 30.

165. Cinq petites Oreilles de Midas; sçavoir, deux flambées de blanc & de marron-clair dans le corps, à levres retroussées en dehors, l'extérieure sinueuse & l'intérieure armée d'une seule dent : deux fasciées de blanc & de marron-clair à tête peu élevée, à bouche garnie de deux dents, & imitant encore mieux que les précédentes la forme d'une oreille *, & une légére- * Ibid. 1260 I iii /

WI. FAM. garnie d'une seule dent, & nommée Aveline *.

* List. tab.

f. 32.

166. Quatre Buccins de forme à-peu-près semblable aux préce ents, & nommés pour cela fausse Oreille de Midas; sçavoir, deux de Cayenne, dont un fauve-clair, & l'autre fauve-nué de gris-de-lin, à stries fines longitudinales, à cinq orbes un peu bombés, à bouche

* Ibid. tab. plus large que l'Oreille de Midas & sans dents *;
21. fig. 11.
Séba, pl. 71. un de Rio de la Plata, qui ne differe de ceux17-20.

Ci que par ses orbes moins renflés. & sa cou-

ci que par ses orbes moins renssés, & sa couleur orangée, & un de Rio-Janeiro, à orbes plus renssés que tous les précédents, revêtu de son épiderme, fascié par bandes longitudinales de fauve clair & de fauve roux. Ces Coquilles, ainsi que celles des articles 162, 163 & 164 sont terrestres, & nous ne les avons mises ici, que pour faire voir sous un seul point de vue, toutes les variérés de cette espéce de Buccins.

167. Deux Buccins à orbes rensiés, & nommés Perdrix rouges, l'un flambé de blanc & de *stba pl. 71. rouge-brun & dépouillé *, l'autre avec son épi-

fig. 2 & 3. Lift. tab. 579. derme marron-foncé.

168. Deux autres Buccins, dont un revêtu de son épiderme, à raies longitudinales onduleu-ses, alternativement blanches & rouge-brun,

* Séba, ibid. & grand dans son espèce, nommée le Zebre ou fig. 4 & 3. Arg. Append. l'Ane rayé*; & une Perdrix rouge, semblable pl. 2. lett. L.

à celles de l'article précédent, mais dont on a coupé une portion du premier orbe & la co-VI. FAME. BUCCINS.

169. Une Perdrix rouge & un Ane rayé, moins grands que les précédens.

170. Deux Buccins de la forme des précédens; sçavoir, un à bandes longitudinales, nuées de violet & de bleu, à tête slambée de rouge & de jaune, & à bouche violette *, & * List. 30 une Perdrix rouge.

171. Deux Buccins en pendant, de l'espéce du premier de l'article précédent, mais dépouillés de leur épiderme, polis, & devenus par-là d'un couleur de rose très-vis.

172. Vingt petits Buccins; sçavoir, deux peu communs blancs, slambé par bandes longitudinales onduleuses de brun & d'incarnat, à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents: deux fauves tigrés de blanc, à levre extérieure en bourtelet, dente-lée en-dedans, & du reste semblables aux précédens. C'est la Porcelaine de M. Adanson*; * Ibid. tab quatre blancs mouchetés par zônes de petites \$18. fig 29. Adanson, pl. taches ou traits longitudinaux marron, de for-4. f. 1. me semblable aux précédens *; deux blanc- * List. tab jaunâtre, l'un stambé, l'autre pointillé de mar-Gual. tab. 22 ron, à stries circulaires très-sines, & à orbes bin. Q. renssés *; deux très-petits de même forme à * Ibid. robe stambée de blanc & de violet; deux petits 44. litt. Z.

VI. FAM. berculeuse, où l'on ne remarque aucunes spires, & à très-petite bouche ovale, nommés Mures de haies; deux verd-bleu tre à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents, & à tête se consondant avec le corps; deux plus petits, qui ne dissérent des précédents qu'en ce que la levre extérieure est * List. ub, garnie de cinq dents *, & deux gris légerement fasciés, privés totalement de tête, & à levre garnie de trois dents.

GENRE SECOND.

BUCCINS A BOUCHE ÉCHANCRÉE, DÉ-POURVUE DE QUEUE,

173. Un Buccin très-rare rayé par zônes alternatives de blanc & d'orangé-vif, à tête asser élevée, à clavicule blanche, finissant en bou*Rumph. ton, & nommé Pavillon d'Orange *; il est de la plus parsaite conservation, & porte deux pouces cinq lignes de long, sur un pouce trois lignes de large,

174. Deux Buccins des parages Magellaniques, rares & en pendant, à robe marronfoncé, à stries transversales tuilées, alternativement plus ou moins élevées, à levre extérieure dentelée & armée en-dedans vers l'extrémité inférieure d'une dent faillante, ce qui leur a fait VI. FAM.
BUCCINS. donner le nom de Licorne.

175. Deux Buccins en pendant peu communs, blancs, à grandes taches marron, disposées par zônes, & paralleles les unes aux autres, umbiliqués, & des plus grands dans leur espéce *.

* Séba pl. 73.

176. Deux Buccins semblables aux précé-n°. 23 & 26. dents, mais moins grands.

P. 70.

177. Deux Buccins blancs, flambés & tachetés de fauve. & de même forme que les précédens, à cela près, que les pas en sont plus creulés en-dedans en forme de fillons *.

* Séba . ibid. n°. 21 & 22.

178. Dix Buccins; scavoir, un rare blanc Bonan. cl. 3. à stries circulaires, les unes élevées, les autres pl. 17. lett. M. non, à côtes longitudinales rabotteuses, à six orbes terminés par des pas applatis, sur lesquels les côtes se prolongent, à levre extérieure dentelée & à umbilic; deux gris à stries fines circulaires, à côtes longitu dinales obliques, qui s'étendent depuis la clavicule jusqu'à la moitié du corps, & à pas des orbes arrondis *; deux de forme à-peu-près semblable aux premiers 37. n°. 76,77. de cet article, mais à stries plus fines & plus serrées en vive arrête, & un peu tuilées *; un blanc nué de fauve-roux, à robe réticulée, & 896. f. 16. à levre intérieure garnie de deux dents *; un ventre de biche à stries circulaires, dont les in-830. f.

BUCCINS.

tervalles sont remplis d'autres plus fines, à pas VI. FAM. des orbes arrondis. & du reste semblable aux précédens, aux dents près, dont il est dépourvu; deux blancs à stries circulaires peu prononcces, & à cinq orbes, dont les pas sont un peu concaves en se relevant. & un de l'espéce de ceux de l'article 177, mais différem-

* séba, pl. ment tacheté *.

73 - Д°. 24 & 25.

179. Vingt - deux petits Buccins; sçavoir, deux rares, blancs nués de fauve, à stries circulaires fines & serrées, à levre extérieure, si-

* List. tab. nissant en un bourrelet, & dentelée en-dedans *: \$31. f. 55. deux de même couleur à stries eirculaires ficelées & ondées, séparées par de larges canne-

* Séba, tab. lures, à cinq pas applatis, & umbiliqués *; un 12. B°. 31. fauve nué de gris à grosses stries longitudinales

granuleuses, fort distantes les unes des autres. à fix orbes, dont les pas sont un peu applatis; un fauve blond, à robe en réseau granuleux, ventru & à huit orbes; quatre, dont deux blancs & deux gris, à côtes longitudinales, & à levre intérieure, retroussée jusqu'au haut du premier

* List. tab. orbe *; un très-petit à une bosse sur le dos. 970. f. 24. & à rebrouffement de la levre jusqu'au haut du

* Ibid. tab. troisiéme orbe *; quatre blancs, dont deux 971. f. 16. fasciés de souci, & deux partie de souci & partie de marron; quatre, dont deux blancs & deux marron à stries fines circulaires, tuilées; deux fauves ventrus à pas des orbes bordés d'un rang de taches marron 2, & deux fauves roux, dont un lisse à trois côtes longitudinales VI. Fam. blanches, & un à stries circulaires bien pro-Buccins. noncées: plus, un collier dont les Indiennes se 975. s. 30. parent, fait de petits Buccins, dont le rebroussement des levres s'étend jusqu'à la clavicule.

180. Vingt-cinq autres petits Buccins intéressans; sçavoir, deux blancs marbrés par grandes taches de fauve roux, granuleux par bandes longitudinales 2; deux des mêmes fond 6 Gualt. tab. & forme que ceux-ci, à lignes circulaires ca- Argen. pl. 9. nelle & lisses, aux derniers orbes près, qui lett. I. sont striés en longueur 3; deux fauve-roux & marron, à côtes longitudinales chargées de tab. 29. litt. P. stries onduleuses 4; deux blancs & fauves, nués 4 Ibid. litt. de marron, à robe réticulée, & à levre garnie de dents; deux blancs fasciés de marron, àstries circulaires noueuses 6; deux petits noirs 965. f. 21. 6 Ibid. tab. de la Barbade 7; deux fasciés par zônes alterna- 969. f. 23. 7 Ibid. tab. tives de blanc & de noir 8; un blanc strié, & 976. f. 32.

8 1bid. tab. fascié de zônes noueuses marron 9; deux mar-8;4.f. 61. ron, fasciés de lignes blanches, à côtes longitudinales & stries fines transversales *; deux de * Gualt. tab. même forme, mais entierement marron; un 44 litt. C. blanc à côtes longitudinales chargées de stries transversales onduleuses & bien prononcées; un gris-de-lin à stries circulaires fines & granuleuses; un fascié de taches alternatives blanches & marron, à stries circulaires très-fines

VI. FAM. Buccins.

entre quelques autres plus grosses; un marbré de blanc & de marron à stries circulaires peu prononcées, & deux lisses, verdâtres, à pas des orbes granuleux.

181. Un grand Buccin Magellanique rare, blanc, nué de fauve & de jaune, avec quelques zig-zags marron, de forme allongée, à fept orbes terminés par un mammelon, à levre intérieure garnie de trois dents & à robe lisse chargée de quelques plis ou rides.

182. Un semblable, à cela près que les rides en sont nuées de verd-clair, & que les zigzags n'y paroissent point.

183. Deux Buccins blancs tachetés par zônes, l'un de rouge sanguin & de l'espèce nome lett. E. Séba, mée Thiare ou Couronne Papale?; l'autre d'ontet. E. Séba, lett. e. séba, deux de la grandeur de ceux que nous citons sibid. n°. 13 & dans Séba.

184. Une Thiare un peu moins grande que 1866, ibid. la précédente 3, & une Mitre de même grandeur.

185. Cinq Buccins moins grands que les précédens; sçavoir, un lisse ventre de biche 4 List. tab. nué de blanc, nommé l'Ivoire ou Mitre jaune 4; trois autres Mitres, dont une semblable à celle de l'article précédent; une à stries circulaires séba, pl. 50. stable de taches rougeâtres, nommée en n°. 49. List. Hollande Thiare bâtarde 5; une légeremene tab. 822. f. 40.

Ariée & mouchetée par zônes circulaires, de taches rouge-brun, nommée la Cardinale *, & VI. FAM. une Thiare semblable à celle de l'article précé-Buccins. dent.

187. Sept autres, dont cinq Mitres des espéces de l'article 185, & deux Thiares de celles de l'article précédent.

188. Dix jolies Mitres par pendans; sçavoir, deux marron à zones jonquilles, à stries longitudinales vers le sommet, & transversales vers le bas *; deux blanches, à lignes & ban- *Gualt. tais des vertes, noires & jaunes, à côtes longitu- 53. litt. E. dinales & stries transversales *; deux blanches * 1bid. 54. pointillées l'une d'orangé, l'autre d'orangé & litt. B. de brun, à stries qui se croisent en treillis*; deux * 1bid. litt. blanches nuées de verdâtre, sasciées & poin-H. tillées par zônes de rouge, à côtes longitudinales croisées par des stries circulaires *, & *Arg. pl. 9. deux de l'espèce de celle de l'article 183, dont lett. V. les taches sont d'un beau rouge de corail.

189. Vingt-huit petits Buccins par pendans; sçavoir, deux blancs fasciés de verd & de zônes noires interrompues, à côtes élevées,

= & nommés Minarets 1; deux Minarets à zônes VI. FAM. noires & vertes de diverses nuances non inter-BUCCINS. rompues 2; deux Buccins lisses à bandes longi-¹ Arg. pl. 9. tudinales alternatives & onduleuses, blanches Pl. 54. litt. F. & rouges dans l'un, fauves & rouges dans l'autre 3; deux petits lisses marron, pointillés 3 Ibid. litt. L. List. tab. 819. de gris 4; deux blancs nués de gris, légére-List, tab, ment striés, à pas des orbes granuleux 5; deux 4. f. 44. 5 Ibid. tab. fauve-clair, à côtes longitudinales chargées de stries circulaires saillantes en vive arrête 6; deux 977. f. 34. Arg. pl. 9. lett. O. Gualt. marron très-foncé, à zônes étroites blanches. & tab. 51. lit. G. 7 Séba, pl. à côtes longitudinales striées transversalement 7; 49. nº. 42. deux blancs à côtes moins saillantes, pointillés * List. 12b. de rouge-sanguin 8; deux légérement striés à £12. f. 38. bandes longitudinales alternatives blanches & rouge-foncé, avec une zône blanche transversale; deux à robe marron-foncé avec une zône blanche; quatre comme les huitième & treiziéme de l'article 179, & quatre comme les septiéme & dix-neuvième de l'article 180.

190. Vingt-quatre autres petits de forme effilée; sçavoir, un verdâtre imitant la corne, à robe réticulée & granuleuse, & extrémités des orbes bordés d'un petit rang de tubercules oblongs; un blanc réticulé, à taches marron de distance en distance sur une bande circulaire de même couleur 9; deux blancs à côtes

20. 20. 19 de longitudinales granuleuses, mouchetées par zônes de rouge; un à robe blanche très-fine.

ment réticulée. & à stries circulaires rouges plus saillantes, écartées les unes des autres; VI. FAM. deux blancs marbrés, l'un de jaune-obscur, l'autre de gris-de-lin, à robe réticulée & granuleuse; un lisse blanc, marbré de lignes onduleuses marron-foncé; un Minaret sascié de blanc, de brun, de verd & de bleu-pâle; deux autres de l'espèce des troisième & quatriéme de l'article précédent; huit Mitres des variétés détaillées dans l'article 188, & cinq autres Buccins des variétés déja décrites.

GENRE TROISIEME.

BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNÉ QUEUE PEU LONGUE.

191. Un Buccin très - rare, fauve-clair, à fascies élevées & tuberculeuses marron, à stries des intervalles peu élevées, à six orbes, à trèspetite queue, & à levre extérieure en bourrelet, nommé en Hollande l'Argus fascié *; il porte un pouce dix lignes de long.

192. Deux Buccins très-rares & en pendant, blanc-sale, à grosses stries applaties, & néanmoins très - saillantes, à larges & profondes canelures, à quatre orbes, le premier desquels est chargé de trois stries & de deux cannelures,

tandis que les autres n'ont que deux stries & une VI. FAM. cannelure, non compris les pas creusés en-de-Buccins. dans & plats qui les séparent : ces Buccins sont grands dans leur espèce, nommée le Cabestan.

924. f. 16.

193. Quatre petits Buccins; sçavoir deux lisses à pas des orbes applatis & saillants endehors presque en vive arrête, nommés en * List. tab. Hollande Perrons *, & deux petits Cabestans.

> 194. Un rare & très-beau Buccin Magella nique, blanc nué de gris-de-lin, à sept orbes renslés, chargé de côtes longitudinales en vive arrête & papyracées, représentant de longues feuilles inclinées toutes vers la levre extérieure. à bouche presque ovale, à petite queue recourbée, creusée en goutiere, & umbiliqué. On le nomme Buccin feuilleté. Celui - ci porte trois pouces cinq lignes de long sur deux pouces deux lignes de large.

> 195. Deux Buccins de même espéce, mais moins grands.

> 196. Deux autres moins grands encore que les précédens.

> 197. Deux Buccins Magellaniques rares, fauve-clair, à grosses stries longitudinales & transversales formant un réz au qui imite les étoffes gaufrées, à cinq orbes bombés, à clavicule rentrant en-dedans, à queue courte un

peu recourbée & à coque mince; espèce nom-

VI. FAM.

198. Cinq petits Buccins rares; sçavoir, un Buccins. des Indes blanc & seuilleté, mais différent de ceux de l'article 194 par sa forme effilée, & ses seuilles plus éparses & moins inclinées; un blanc ventru, seuilleté aussi, mais à seuilles moins saillantes, moins fines & plus serrées; deux Magellaniques blancs nués de sauve, de la forme du précédent, à côtes longitudinales arrondies, & à striés transversales; & un blanc de la Méditerranée, granuleux par compartimens, à queue & partie des levres recouvertes de Corail rouge.

199. Quatorze Buccins, dont dix par pendans; sçavoir, deux rayés par sines zônes de blanc & de brun, à sept orbes un peu bombés & à bouche blanche, nommés Bouches de laie *; *Gualt. tab. deux blancs, à trois zônes marron-clair, dont 43. litt. X. deux sur le premier orbe & une sur les autres, à s. 55. côtes longitudinales & à stries sines transversales, s'élevant sur les côtes; un à-peu-près de même forme, blanc nué de sauve, à côtes longitudinales moins nombreuses & moins prononcées *; un ventru à stries circulaires marron, *Bonan. cl. & cannelures sauves, à levre extérieure dentée 3. f. 343. & en bourrelet, & à clavicule rentrante *; un à * List. tab. tubercules blancs & cannelures marron *; deux * Jbid. tab. blancs réticulés, à bouche garnie de dents, \$22. f. 504

Tome I.

VI. FAM. BUCCINS.

& de forme bombée : deux blancs nués de fauve à groffes côtes longitudinales, à stries transversales, & à bouche violeite dentelée; deux fouci & de même forme, mais à côtes moins élevées & stries circulaires plus grosses, & un très-finement strié, marbré de blanc, de noir & de couleur de rose.

200. Quatorze Buccins; scavoir, huit à stries circulaires granuleuses, interrompues par quelques gros tubercules longitudinaux, à bouche dentelée. & à levre extérieure garnie d'un large bourrelet, mais différens entr'eux par leurs cou-

* Arg. pl. 9. leurs, qui sont très-vives, & très-variées *; deux 49. 19. list. I. Bouches de lait polies; deux comme les troisiéme & quatriéme, & deux comme les douziéme & treiziéme de l'article précédent.

201. Deux Buccins peu communs, blancs, marbrés de quelques taches brunes, à robe réticulée granuleuse, à tubereules disposés comme dans les huit premieres de l'article précé-*Rumph.cab. dent, & à petite queue retroussée *.

49. litt G. Litt. tab.1022.

202. Un très-rare Buccin du Golfe du Mexique, à robe brune, fasciée dans le premier orbe, de deux zônes jaunes, dont la plus haute blanchissant peu-à-peu, suit la spirale jusqu'à la clavicule, à six pas larges & plats garnis de petites lames onduleuses, presque perpendiculaires à leur plan, & bordés chacun d'une suite d'ongles ou de serres en forme de crénelures, dont les premieres sont creusées en bec de perroquet; espèce qu'on peut nommer le Buccin VI. Faite, génélé.

203. Deux grands & beaux Buccins de l'Isle de France, fauves marbrés de marron-clair & de blanc, à stries circulaires, in 'gales, granuleuses, & quelques fois tuberculcuses, à bourrelets, disposés comme dans les deux de l'article 201, & à petite queue recourbée, creusée en gouttiere *.

· Goalf. tal 204. Six Buccins; sçavoir, un rate fauve 49. litt. G. taché de brun & de blanc, à groffes stries cir-lett. M Séba culaires; rangées par paires assez distantes les & 24 unes des autres, à stries longitudinales obliques, peu apparentes, & assez distantes aussi les unes des autres, formant par leurs rencontres muruelles de petits tubercules, à huit orbessensés, & autant de pas obliques, à bouche der telée, & à deux bourrelets longitudinaux *; un fauve teint de jaune, à quatre orbes applatis, ceints de grosses stries doubles 17. no. 100 peu prononcées sur le corps, à bourrelet situé en afriere de la levre extérieure, qui est en tranchant & non dentelée, & quatre de l'efpéce de ceux de l'article précédent, mais plus petits, dont deux blancs nués de jaune.

205. Vingt-deux petits Buccins par pendans; squoir, deux peu communs, dont un blanc un fauve dans le corps, & marron à la cla-

vicule, tous deux à côtes longitudinales un pets VI. Fam. finueuses, formant au haut des orbes des couronnes de tubercules, à stries sines transversales, & à huit orbes; quafre blancs, dont deux fascié de fauve-roux & deux de brun, à stries longitudinales & transversales, formant un régulat. Lab. seau granuleux *; deux lisses, dont un grisale, litt. E. tre tacheté par zônes de pourpre, à zône blan-

* List. tab. che tachetée des mêmes couleurs *, & un qui * List. tab. ne differe du précédent que par son fond & ses

taches canelle; deux lisses à robe blanche tachetée par zônes de marron; deux bleu-pâle,

* Gualt, tab. " 46. litt. F. ti

marbrés de roux *; deux blancs à côtes longitudinales & stries fines transversales, de forme bombée, à huit orbes, & à petite queue retroussée; deux blancs marbrés par zônes de taches jonquilles dans l'un, rousses dans l'autre, granuleux par compartimens, à bourrelet uni couvrant la levre extérieure, & se prolongeant dans une direction oblique sur tous les autres orbes, de forme oblongue, & un peu arquée; deux à-peu-près semblables, mais dont la spirale des bourrelets est composée de plus de révolutions, & quatre de l'espéce des douzième & treizième de l'article 199.

206. Deux grands Buccins des Indes, ventrus, imitant le plumage de la perdrix, à trois rangs de bourrelets, & à levre extérieure * Séba, pl. dentelée, de l'espèce nommée Trompe Marine *,

200

ou Conque de Triton; ils ont un pied cinq pouces de long, & sont posés sur des pieds de bois VI. FAM. en pendant.

207. Quatre Trompes Marines moins grandes que les précédentes, dont deux de l'Aménque *, & deux de la Méditerranée. * séb

* Séba , ولمَ

de grandeur propre à entrer dans des tiroirs*; * Rumph. sçavoir, deux des Indes, & deux d'Amérique, tab. 28. litte des plus vives couleurs, les deux autres sont de nos Mers.

209. Deux Buccins; sçavoir, un des Indes
peu commun, fauve-roux & recouvert d'un
fucus, ventru, à grosses stries noueuses, à lévre
intérieure ridée, & extérieure garnie de grosses
dents qui laissent de profondes cannelures *, * Bonan. cl.
& une petite Trompe Marine de la Méditerralist tab. 9362
née, conservant l'animal desséché sortant de la n°. 1892.
pl. 57. n°. 362
coquille avec son opercule.

210. Un très-grand Buccin de l'espèce des Trompes Marines, mais différent des précédens en ce qu'il est d'un blanc-grisatre, à côtes longitudinales & grosses stries transversales, avec un rang de tubercules sur chaque orbe *; il a * List. tales plus d'un pied, sept pouces de long.

211. Deux Buccins de la Méditerranée, blancs nués de fauve, à stries longitudinales & transversales, dont les plus grosses forment un treillis chargé de petits tubercules dans tous les

points où elles se croisent, à deux rangs de bourrelets sur chaque orbe, & à lévre exté-VI. FAM. Bucc.ns. rieure frangée & dentelée.*.

* Gualt. tah.

212. Trois Buccins, dont deux blancs margo. litt. A. fist tab. 335, brés de roux & rayés de brun, à orbes cein:s ž. 39,

d'un petit cordon granuleux, nommés en France Tulipes, & en Hollande Agathines, tous deux grands dans leur espéce, l'un desquels conserve

* Arg. pl. son opercule * : le troisseme est de l'espèce de séba, pl. 71, ceux de l'article précédent.

₽°. 23-33•

- 213, Quatre Tulipes à fonds & rayes semblables aux précédentes, mais dont deux sont marbrées de jaune, & deux d'olivâtre.
- \$14. Quatre autres Tulipes par pendans. dont deux marbrées d'orangé & de souci clair, & deux de brun obscur.
- 215. Quatre Buccins; sçavoir, deux blancs nués de fauve clair, à stries circulaires fines & un peu ondées, de forme approchante de celle
- * 66ba, pl. de la Tulipe, & à clavicule en mammelon *, 13, A*, 7, & deux Tulipes de moyenne grandeur, blanc nué de l'leu, marbré de verdâtre, & rayé de même.

216, Cinq Buccins; scavoir, deux à stries circulaires serrées, & à orbes bordés d'une couronne de petits tubercules, à robe brune, bordés au dessous de chaque pas de deux zônes , pl, blanches, se qui détermine l'espèce nommée

Lift. igh. en Hollande l'Ethicpienne *, & en France la #48· f, #2,

Minime ou la Cordeliere, l'un desquels a la tête = enriérement recouvert: de l'espèce de duvet VI. FAH. qu'on nomme Drap marin ; un de même ef- Buccins. péce, mais rare, en ce que la couleur en est fauve-pâle, & qu'il est destitué de zônes; & deux Buccins flambés de blanc & de roux, à stries circulaires inégales, & à tubercules plus petits encore que les précédens *.

217. Deux Buccins rares de l'espéce de la Cordeliere, mais fauve-gri. & à plus gros tubercules.

218. Trois Buccins, dont un très-rare qui ne differe de la Cordeliere qu'en ce que le fond en est cassé au lait, que les tubercules s'y remarquent à peine, & que la forme en est plus allongée, & deux Cordelieres de l'espéce des deux premieres de l'article 216, mais plus grandes.

219. Trois Buccins rares, dont deux marron, à stries circulaires, & à sept pas applatis; couronnés de tubercules *; l'autre est blanca Ares et ... veiné en longueur de rouge-brun, strié circu- htt. A. Séba. lairement, à sept pas applatis bordés de perits & 184 tubercules, & à tête peu élevée : on le nomme l'Unique, parce que la bouche en est posée à comre-lens des autres *.

120, Trois Buccins rares; scavoir, deux 207, 6.23 blancs nués de fauve clair, à stries circulaires très-fines, à six pas applaris, dont les bords gra-

K iv

nuleux rentrent en dedans du côté de la colu-VI. FAM. melle, où ils forment un assez large sillon *; & Buccins. un de l'espéce des deux premiers de l'article * Gualt, tab. précédent. 47. litt. A.

> 221. Ouatre petits Buccins, dont deux Uniaues, & deux de l'espèce des deux premiers de

l'article précédent.

222. Deux Buccins rares, ventre de biche. striés circulairement, à sept pas, dont les bords

* List. tab. sont chargés de petits tubercules *; & un de 47. fig. 12. l'espéce des deux premiers de l'article 220, mais blanc de lait.

> 223. Dix-neuf petits Buccins; sçavoir, deux blancs, l'un à stries fines circulaires, l'autre lisse,

* 1bid. tab. de forme élevée, à sept orbes bombés *; un à 913. f. 5. stries circulaires très-fines, de forme encore

* Ibid. 12b. plus ventrue & moins élevée * : deux blancs 878. f. 3. nués de fauve, granuleux en treillis, à lévre extérieure dentelée, & deux rangs de bourrelets

* Gualt, tab. qui se prolongent sur tous les orbes *; deux qui 49. litt. M. Lift. 1ab. 939. différent des précédens par une forme plus al-*Gualt. ibid. longée, & un troisseme rang de bourrelets *; deux de l'espèce de ceux de l'article 203; deux lice. I,

marron-foncé, à une petite zône blanche dans le bas, ventrus, pesants, à six orbes, & nommés Plombs; un revêtu d'une incrustation épineuse brune, & où loge un Bernard l'Hermite: deux Bouches de laie : deux Cordelieres : trois Tulipes, dont une découpée en spirale, pour en faire voir l'intérieur; & cinq opercules de nature cornée, qui ont appartenu à différens VI. FAM. Buccins, dont un très-grand nommé vulgaire-Buccins. ment Feuille de laurier *; & cinq autres moins *Rump. grands, plus ou moins épais, nommés Ongle Gualt. tab.701 litt. B. odorant ou Blatta Bizantia des Apothicaires *. * Rumph. ibid. n°. 3.

224. Quatre Buccins blancs, épais & pesants, Gualt ibid. nommés Marbres (ou Raves,) dont deux à tête litt. C. D. élevée, à lévre intérieure armée de trois grosses dents, & à cinq orbes légérement tuberculeux, se recouvrant l'un l'autre *; & deux à tête moins élevée & orbes applatis, à queue moins 815.f. 26. longue, & de forme plus ventrue que les pré-litt. C. cédens. Plus, deux petits Buccins peu communs, de forme approchante des précédens, à stries fines circulaires peu prononcées, à clavicule fort saillante, en forme de spirale cylindrique ou de tire-bourre, l'un à robe blanche piquetée par zônes de points jonquilles, & couronné de petits tubercules *, & l'autre piqueté * Rumph. tab. moins réguliérement de points bruns & oran- 36 n°. 70 gés *.

225. Trois grands Buccins, dont un blanc- 816. f. 26. sale, à tête peu élevée, à six orbes, dont les pas sont un peu applatis & couronnés de tubercules *; & deux beaux Marbres, blanc de lait, évidés en dedans, & gravés en dessus d'une 47. litt. B. espéce de mosaïque : cet ouvrage est des Indiens, à qui ces Buccins servent de tasse.

BUCCINS.

226. Deux grands Buccins des Indes, rares: de forme un peu renflée, & à coque épaisse blanc de lait, à grosses côtes longitudinales forman dans leur rencontre, avec les plus grands cercles de chaque orbe, de gros tubercules oblongs, à neuf orbes, dont les pas sont légérement réticulés, à lévre intérieure garnie de trois plis ou dents, & à clavicule rentrante & creusée en maniere de tire-bourre.

227. Cinq Buccins, dont un fauve revêtu de son épiderme marron, à lignes circulaires rousses, distribuées deux à deux, & à huit orbes chargés dans leur milieu de tubercules.

Gualt. tab. nommé le Tapis ou la Robe de Perse * : deux 46. litt. B. blancs nués de fauve, légérement striés à sept List. tab. 931. orbes bordés de tubercules *; & deux Marbres

Lift tab.

£7 & 58.

884. Valen- des deux espéces de l'article 224. 228. Quatre Buccins, dont deux dépouillés, de l'espèce du premier de l'article précédent, & deux gris qui n'en différent que par leurs tu: bercules moins prononcés.



GENRE QUATRIEME.

BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNE LONGUE QUEUE,

des premiers orbes s'éclaircit peu à peu dans VI. FAM. les autres, jusqu'à devenir blanche dans les derniers, à stries transversales dans le bas, & longitudinales sinement réticulées dans le haut, à bouche garnie d'une queue très menue, creusée en gouttiere, & de l'espèce nommée Fuseu *. *5éba pl. 504.

230. Un Fuseau très - rare blanc, nué de Arg. pl. 10-3 fauve vers la queue, qu'il a plus longue que le lett. A. précédent, à lévre extérieure garnie de quatre dents, & nommé le grand Fuseau à dents: il porte cinq pouces huit lignes de long, & est de la plus belle conservation *.

231. Un suseau blanc à stries sines circulai- 56. nº. 2. Arg. pl. 100 tes, de sorme moins essilée que les précédens, lett. D. à neus orbes chargés dans leur milieu de tubercules, à levre intérieure saillante en-dehors en vive arrête, à très-longue queue, & nomme mé Quenouille; il a neus pouces de long *.

232. Une autre Quenouille, qui peut faire Coquile infeciquie le precedente, qui peut faire Coquile infelieu de la précedente, lieu de la pla 781

233. Une semblable, mais plus estilée, & VI. FAM, de huit pouces & demi de long.

BUCCINS.

234. Deux jolis Buccins en pendant, dont une Quenouille blanche de cinq pouces neuf lignes de long, nuée de fauve-roux vers la columelle. sur les lêvres, & le long de la queue, qui est re-

* Arg. pl. 9. courbée à l'extrémité * : & un Fuleau de même fonds & de même longueur, mais différent en ce que les quatre derniers orbes sont destitués de tubercules. & que la queue est un

Liff. tab. peu contournée.

235. Deux Fuseaux, l'un blanc, différent de la Quenouille, en ce que les stries en sont moins prononcées, & les tubercules plus gros

* Séba, la & plus arrondis *; l'autre blanc, à stries transrieure du mi- versales, & à grosses côtes longitudinales, dont lieu de la pl. les cannelures sont nuées de fauve roux *.

* Rumph. tab. 19. litt.G.

- 236. Deux Fuseaux, l'un comme le premier de l'article précédent; l'autre en differe en ce qu'il est fauve-roux, nué de blanc, que les tubercules en sont plus petits, plus minces & plus nombreux. & les stries circulaires plus renflées.
- 237. Quatre Fuseaux par pendans; sçavoir, deux blancs tachetés par zônes de brun presque noir, à levre extérieure échancrée dans le * Lift. tah. haut, & nommés Tours de Babel *; deux qui 917. f. 11. ne différent des précédens qu'en ce qu'ils sont

On peut nommer cette variété Tour de Babel VI. Fait. blanche *.

238. Douze petits Fuseaux, dont dix par morp. pl. 42 pendans; sçavoir, un blanc lisse, à pas des orbes, rentrans en-dedans, & à queue peu longue*; * List. tab.; deux semblables au grand de l'article 229; deux petites Quenouilles; deux Tours de Babel blanches à taches rouges *; deux mar- *Arg. pl. 92 ron noirâtre; deux entierement blanches, & lett. M. une comme les deux premieres de l'article précédent.

239. Quatorze Buccins par pendans; sçavoir, deux à stries circulaires & à grosses côtes longitudinales, dont les rencontres avec le haut des orbes forment autant de couronnes de tubercules, fauves sur les côtes, blancs dans les cannelures; deux nués d'aurore & de jaunepâle, qui ne différent des précédens que par 922. f. 15. leurs stries saillantes sur les tubercules en vive arrête *; deux bruns-marbrés de blanc à stries * Arg. pl. 104 circulaires & à côtes longitudinales, un peu con-lett. L. tournées *; deux blancs, qui ne différent de ceux- * List tab. ci que par leur forme moins allongée, & par 921. f. 14leurs stries circulaires jaune-pâle dans l'un. orangé dans l'autre; deux petits fauves de même forme, mais à côtes longitudinales plus nombreuses; deux blancs à huit côtes longitudinales aurore, un peu contournées, & du

reste semblables aux précédents 1, & deux. jaune-pâle à tubercules blanchâtres, fasciés de Lift. tab. rouge-brun 2.

SEPTIEME FAMILLE

MURKY OU ROCHERS.

E sont des Coquilles en vosute qui VII. FAM. approchent beaucoup des Buccins, mais qui en différent à plusieurs égards. Leur caractere le plus invariable est d'être presque toujours renslées du milieu. plus ou moins allongées vers les deux extrémités, & garnies ou de pointes, ou de tubercules, ou de clouds; ce qui leur a fait donner le nom assez impropre de Rochers. Leur bouche oblongue est ou dentée ou non, & sans queue, ou dentée avec une petite queue, ou aîlée sans pattes, ou aîlée avec des pattes; & c'est ce qui nous fournit la division de cette famille en quatre genres; sçavoir,

16. Les Rochers à bouche dentée ou = non dentée sans queue.

VII. FAM.

- 2°. Les Rochers à bouche dentée & à petite queue.
- 3°. Les Rochers à bouche aîlée sans pattes.
- 4°. Les Rochers à bouche aîlée & à pattes.

GENRE PREMIER.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE OU NON DENTÉE SANS QUEUE.

240. Un grand Rocher de la Jamaique rare, marbré de blanc & de souci très-vis dans le corps, à tôte & clavicule couleur de chair, à bouche non dentée, à neus orbes se recouvrant l'un l'autre, & entourés de tubercules peu saillans, nommé en Hollande Pyramide *.

241. Trois grands & beaux Rochers des Indes, 83. 10. 14dont un blanc-sale, & l'autre couleur de chair, marbrés par grandes taches & par traits en zig-zag de fauve-roux & de marron, à bouche dentée & échancrée, à sept orbes couronnés de tubercules pointus, & de l'espèce nomnée en

VII. FAM. dres *; & le troisième à fond orangé, veiné Rochers. & taché par zônes de marron-foncé, à levre dernier rang de la pl. 67. dont les gros se prolongent en forme de côtes sur le dernier orbe, nommé en Hollande l'Hé.

ala yeiné *.

* Seba, pl.
'57. n°. 1 & 2.
Arg. pl. 14.
Lett. D.

242. Trois autres un peu moins grands; sçavoir, deux Foudres de forme plus raccourcie, à tubercules recourbés en dedans, & creusés en forme de bec de perroquet *, & un Bois-veiné, comme le précédent, mais à fond

braique ou Mufique bâtarde, & en France Bois-

Séba, avantdernier rang de la pl. 67.

* séba, pl. blanc *.

57. a°. 3.

243. Trois Rochers; sçavoir, un Bois-veint & deux Foudres, à-peu-près semblables à ceux de l'article 241.

244. Trois Rochers, dont deux en pendant, & grands dans leur espéce, marbrés de verd, de blanc, de marron & de brun, à deux zônes formées de six lignes paralleles dans l'un, & de cinq dans l'autre, à intervalle des zônes pointillé de rouge, & connus sous le nom de

*16. nº. 7 & 8. Musique * , & un Bois-veiné *.

Arg. pl. 14.

lett. F.

* Séba, pl. deux en pendant marbrés de blanc, de bleu & de brun, qui ne différent des deux premiers de l'article précédent que par leur forme moins allongée, & par des taches oblongues, noires,

& plus marquées, qui leur ont fait donner le nom de Plein-chant, & un Bois-veiné, à taches VII. FAM. moins foncées que le précédent. ROCHARS.

246. Deux Musiques rares verd-céladon, pointillées régulierement de brun, à cinq petites zônes blanches, pointillées de même, espéce qu'on distingue par le nom de Musique verte.

247. Deux Musiques rares, couleur de rose, & nommées Musiques couleur de rose.

248. Trois variétés de Foudre; içavoir, deux rares en ce que l'une a deux rangs de tubercules de plus sur le premier orbe *, & que l'autre *séla, coq.
a les orbes couronnés d'un simple cordon gralu pl. 67.
nuleux *; la troisième est de l'espèce des deux *séba, ibid.
premiers de l'article 241.

249. Six Rochers; sçavoir, trois Foudres, dont un à tubercules en bec de perroquet, & deux de l'espéce ordinaire; deux Plein-chants en pendant, & une Musique à robe réticulée, dissérente de toutes celles ci-dessus décrites.

250. Sept Rochers; sçavoir, quatre Foudres & trois Musiques, dont une de l'espéce de celle de l'article précédent.

251. Un Rocher de la Chine très tare, de forme fort renslée, rayé par patites zônes de fauve, & de quelques points bruns, à trois tangs circulaires de tubercules tuilés, à six pas applattis, recouverts d'une suite de seuilles

Tome I. L

ROCHERS.

couchées, retroussées vers le bord, & comme VII. FAM. frisées, à levre extérieure dentelée, & umbiliqué.

- . 252. Un de même espece, mais un peu moins grand.
- 253. Deux gros Rochers fort renflés, fasciés de bleu fur un fond jaune, à spirale de six pas se recouvrant l'un l'autre, & séparés par un fillon: le premier a deux rangs de pointes seulement, dont un vers le bas, & l'autre
- Séba, pl. vers la tête *; le second, qui est très-rare, outre le rang de pointes du bas, en a encore trois autres vers la tête, dont le plus haut paroît s'être replié en forme de seuilles sur les sillons que laissent entr'elles les deux premieres spires; ils sont de l'espèce connue en France fous le nom de Lard, & en Hollande sous ce-

lui de Toile à Matelas.

- 254. Quatre variétés de Lards fasciés & rayés de fauve & de bleu; scavoir, deux à un rang de clouds vers le bas, & trois vers le haut; un à un simple rang de clouds dans le haut, de même que dans le bas, & un totalement dépourvu de clouds.
- 255. Trois Rochers, dont un très-rare, blanc de lait, & imitant à cet égard la porcelaine, à stries longitudinales très-fines. & à côtes peu prononcées en même sens, finissens vers le haut en une couronne de tuberçules,

qui se prolongent dans les six orbes dont est composée la spirale, & deux Lards bleuâtres VII. Fam. rayés de blanc, l'un à deux rangs*, l'autre Rochams.

* Séba, pl.
à trois de pointes dans le baut, & tous deux à 72. n°. 5.
Arg. pl. 15.
iett. H.

256. Trois Rochers; sçavoir, deux d'Amérique blancs, à stries circulaires inégales, à huic
orbes tous couronnés de tubercules, à quatre
grosses stries tuberculeuses ou tuilées dans le
bas & umbiliqués, nommés Aigrettes *, & un
List. mass
Lard à un rang seulement de tubercules dans
le haur.

257. Cinq Rochers; sçavoir, un rare blancgrilâtre, à stries fines circulaires, à six orbes & à deux rangs de tubercules mousses dans le corps, dont les plus élevés se prolongent d'orbe en orbe jusqu'à la clavicule; deux Aigrettes dissérentes des précédentes, en ce qu'elles sont toutes les deux recouvertes en partie d'un Astroite, & deux Lards de moyenne grandeur, l'un à deux rangs de pointes dans le haut, & un dans le bas, & l'autre à un seul rang de pointes, tant en haut qu'en bas.

258. Quarre Rochers; sçavoir, deux noisette-soncé, à stries sines circulaires, dont les
canelures sont nuces de blanc, à trois rangs
en même sens d'épines tuilées sur le corps, dont
le plus haut se prolonge dans tous les orbes *, *Séba, pl.
& deux Aignettes des deux variétés ci - dessus son non les

décrites, dont une chargée en partie d'un Af-

ROCHERS.

259. Deux très-belles Aigrettes en pendant, de l'espèce de celles de l'article 256.

260. Deux Rochers des Indes en pendant, noirs marbrés de blanc, à plusieurs rangs de pointes régnans dans toute leur longueur, grands dans leur espèce, & nommés Chausse. Arg. pl. trapes *, ou Murex à dents de Chien.

Arg. pl. 4 25. lett. E. Lift. tab. 819.

f. 51. Gualt tab. 55. Litt. D.

261. Trois Chausse - trapes de moyenne grandeur, dont une blanche marbrée sur les côtes & les pointes de rouge-brun, nué d'orangé, & deux autres en pendant, dont la couleur est plus semblable à celle des précédentes.

262. Trois Rochers des Indes peu communs, dont un marron-clair marbré de blanc, à stries fines circulaires, & deux rangs de clouds, à tête peu élevée & presque entiérement enveloppée dans un retour blanc de la levre intérieure, qui est aussi évasée vers l'extrémité séba, pl. inférieure de la clavicule *, & deux Chausse-

 # Séba , pl.

 ≤0. n°. 11.

trapes des mêmes couleurs que celles de l'art. 260, mais qui en différent en ce que la tête n'en est pas élevée, & qu'elles sont destituées de

* Ibid. no. 8. Aries transversales *.

voir, deux blancs à grosses côtes longitudinales bien prononcées & fort écartées, formant fur les côtes des tubercules plus ou moins gros,
à huit orbes applatis, & umbiliqués; deux gris VII. FAM.
de forme approchante de celle du premier de l'article précédent, mais à quatre rangs de tubercules moins faillans; deux Chausse - trapes de l'espèce de celles du même article, & deux Lards, dont un marron, l'autre souci, tous deux à zônes blanches, & à deux rangs de clouds situés l'un en haut, l'autre en bas.

264. Dix-huit petits Rochers, dont douze par pendans; sçavoir, un très-rare blanc, ventru, umbiliqué, à stries transversales, & ging rangs de tubercules marqués principalement vers le haut, à tête sai lante couleur de noisene, & à bouche couleur de chair; un blancsale, à gros boutons noirs, rangés dans sept bandes obliques & cinq cercles, à bouche du plus beau lilas, étroite & dentelée des deux côtés, & de l'espèce nommée Mura *; une Mura peu différente, à tubercules marron, & à bou- 804. f. 13. che blanche; deux petites à boutons & grains. plus nombreux & plus serrés, de forme moins rensiée, à tête plus élevée, & à bouche violette*; une blanche ventrue, à bouche fort ouverte, & 254. f. 5. à deux petires taches noires fur la levre intérieure *; un petit Rocher à stries fines circu-. * Bonen, cl. laires, grapuleuses, à robe grise hérissée de ru- 3. f. 174. bercules pointus, à bouche couleur de fafran, litt. BB. & umbiliqué, nommé en Hollande Hérif-f. sa.

L iii

🚍 son 2; un autre Hérisson, à-peu-près de même VII. FAM. forme, mais fauve en-dessus, pourpre en-dedans Rochers. & sans umbilic 2; deux autres b'ancs, hérissés de Gualt. tab. pointes fines, marron, fort faillantes, à levres AA. litt. S. ². lbib. tab. dentelées & bordées de jonquille³; deux blancs-28. litt. R. *tbid.litt.N. marbrés de brun-noirâtre, à pointes plus grof-Arg. pl. 10. ses, moins nombreuses, & à tête plus élevée 4 Gualt. tab. que les précédens 4; deux noirs marbrés de 43 - litt. V. blanc, à trois rangs de clouds & à tête éles séba, pl. vée s; un jaune-pâle en-dehors, jonquille en-60. nº. 38. dedans, de forme applatie, ceint de cinq rangs peu marqués de cordons un peu tuberculeux, qui finissent à la levre extérieure en un double rang de pointes, dont les deux plus hauts s'é-61bid. nº.48. tendent en forme de pattes 6; un petit Rocher marron à trois stries fines circulaires, à pas des deux premiers orbes applatis, & couronnés de 7 Ibid. 10.32 tubercules 7, & deux ventrus blancs fasciés .* Lift. 1ab. de brun, à un seul rang de gros tubercules 8. 292-6 53. 265. Vingt-deux petits Rochers, dont deux de l'espéce des deux premiers de l'article 258, mais différens en ce qu'ils sont dépourvus des trois rangs d'épines sur le corps. & ne conservent qu'un rang de perits tubercules, qui se pro-, seba, pl. longe sur tous les orbes?, & vingt autres

266. Deux Rochers rares, citton, lisses, à tête fort élevée, à dix orbes ruberculeux, bordés chacun vers le haut d'une raye blanche

presque tous des variétés déja décrites.

.و.•a

ponctuée de canelle, & à clavicule blanche.

ROCHERS.

267. Dix Rochers de moyenne grandeur, dont huit marbrés & bariolés de diverses couleurs, de forme approchante de celle des deux de l'article précédent *, & deux de même espéce, mais remarquables par divers accidens \$888. f. 9. qui les rendent monstrueux.

268. Quatre grands Rochers; sçavoir, un lett. L revétu de son épiderme, marbré de blanc & de fauve-roux, & trois dépouillés, dont un couleur de chair, & deux ventre de biche, tous à fascies transversales onduleuses, & peuprononcées, à tête élevée, & à onze orbes couronnés de clouds fort saillans *: plus, trois * Guate. tab. petits à stries fines circulaires, à clavicule éle- 54 litt. M. vée, & à une couronne de clouds dans le premier orbe-quise changent en petits tubercules dans les fuivans *

269. Quatre autres qui ne différent des pré-lett. K. cédens qu'en ce qu'ils sont couleur de chair, teints de fauve & nués de brun, & que les clouds qui couronnent le corps y sont beaucoup plus saillans, & trois petits comme les derniers. du même article.

270. Trois Rochers, dont un ventre-de-biche, de forme effilée vers le bas, rensiée dans le corps, à fix pas un peu concaves séparés par un petit fillon, & couronnés de tubercules un

L iv

peu applatis *; un fauve-roux, qui en differe VII. FAM. en ce que les pas n'en sont point séparés par des vuides, & que la tête est un peu plus élevée. & un plus petit, rare, blanc nué de verdâtre, imitant le jade, de forme effilée vers le bas, mais du reste à-peu-près semblable au précédent.

GENRE SECOND.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE ET A PETITE QUEUE.

271. DEUX grands Rochers triangulaires fauve-roux, à fascies transversa'es nombreuses, élevées & tuberculeuses, à stries fines en même sens dans les intervales des fascies, à trois rangs de bourrelets un peu applatis, mais trèsfaillans, furtout celui de la levre extérieure,

stha. pl. à queue retroussée, & nommés Dragons *.

272. Deux autres ventre-de-biche, nué d'orangé, à grosses côtes tuberculeuses transversales, & à plusieurs rangs de bossages fasciés de blanc & de marron, de forme très-irréguliers, à queue un peu contournée & retroussée; espéce que quelques Amateurs nomment Rhino-

* Arg. pl. 10. ceros *.

273. Quatre Rochers; scavoir, deux jaune-

pale nué de blanc dans l'un, & d'aurore dans l'autre, à plusieurs rangs circulaires de tuber- VII. FAM. cules granuleux, à quelques portions de cô-ROCHERS. tes longitudinales tuberculeuses, à levre extérieure dentelée, & à très-petite queue, connus sous le nom de Culotte de Suisse *, & deux fauves, nués d'aurore, à côtes & fascies peu lett. D. Rumph. tab. différentes de celles du Rhinoceros, mais moins 28. litt. C. faillantes & plus arrondies, à orbes bombés & à queue un peu longue, contournée & retrousſée *. Gualr, tabé

274. Dix petits Rochers; scavoir, deux 37. litt. F. fauves nués de blanc, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, granuleuses aux points où elles se croisent à trois côtes tuberculeuses. & à queue un peu longue recourbée; un plus petit des mêmes forme & couleur, mais à deux bourrelets seulement; deux blancs nués de fauve, à côtes & stries plus prononcées, & à longue queue recourbée *; deux en treill's granuleux, à queue courte retroussée; une Culotte de Suisse, & lett. O. deux petus Dragons, dans l'un desquels la côte formant la levre extérieure est moins large & creusée en dedans, ce qui, suivant quelques Naturalistes, désigne le premier âge de la Coquille *. * Séba , pl.

275. Deux Rochers des Indes fauves nucs 6 de blanc, de forme applatie, à deux rangs la-

téraux de grandes épines, & à quelques rangs VII. FAM. longitudinaux de petites pointes, à levre ex-ROCHERS. térieure dentelée, & à petite queue, nommés

* Séba, pl. en Hoilande Crapauds *.

60. nº. 19. 276. Sept Rochers des Indes: scavoir, deux List. tab. 949. B*• 44-

blancs nués de fauve & de marron à stries transversales granuleuses, dont trois plus fortes chargées dépines sur le corps, la plus élevée desquelles se prolonge dans tous les orbes, à deux côtes longitudinales & latérales. tuberculeuses, & à très-petite queue, connus

* Gualt. tab. sous le nom de Raccrocheuses *; quatre de mê-49. litt. L. Séba, pl. 60. Me espéce, dont deux fauves-gris, & deux n°. 18. fauves nués de blane, à pointes moins saillan-

tes, & répandues dans moins de zônes, l'un * Ibid. no. desquels n'a que deux petites bosses seulement*. & une petite Culotte de Suisse, à bouche du

plus beau lilas.

277. Deux Rochers des Indes rares, marbrés de blanc & de marron, chargés de gros tubercules granuleux, à deux grosses côtes latéra'es. d'où sortent en - dehors des pointes creusées en gouttiere, à bouche à-peu-près semblable à celle de la Culotte de Suiffe, & à

* Arg. pl. 9. petite queue retroussée *.

25, 16, 17.

lett. R. 278. Quatre Ro chers par pendans, dont deux Séba , pl. 60. nº. 14. blancs marbrés de fauve, à stries longitudinales & transversales granuleuses dans leurs rencontres mutuelles, de forme bombée, & comme bossuée

en-dessus, mais applatie en-dessous, à levres se rabattant en-dehors en une fraise platte, mince VII. FAM. & dentelée des deux côtés, espéce que la forme de sa bouche a fait nommer Grimace *, & *Arg. pl. > deux blanches, qui ne different des précédentes, qu'en ce que la robe en est formée d'un réseau plus régulier & à plus petits grains, & que la seule levre extérieure y est bordée d'une fraise; on nomme cette variété Grimace blanche.

279. Cinq Rochers, dont un blanc nué de fauve, à tête élevée, à zônes granuleuses, à deux rangs de tubercules dans le corps, qui se prolongent en diminuant de grosseur sur les autres orbes, & à deux rangs latéraux de côtes longitudinales; deux Culottes de Suisses, & deux Grimaces des variétés de l'article précédent.

280. Deux Rochers des Indes, rares, couleur de chair, flambés par zônes de rougeobscur, à tête applatie, à clavicule aigue, à petite queue fort retroussée du côté de la levre intérieure & sinueuse à son extrémité, à levre extérieure coupée en vive arrête, ce qui les distingue de tous les autres Casques, dont le caractere spécifique est d'avoir cette levre retroussée en bourrelet: ceux-ci nommés Casques-Plumes, sont très-grands dans leur espéce *.

281. Deux Casques - Plumes de couleurs tab. 22. lit. B.

VII FAM. dens.

ROCHERS.

282. Un Casque des Indes rare, blanc nué de sauve, à plis longitudinaux, laissant entr'eux de larges cannelures, à côte latérale tachetée de brun, de même que la cavité du bourrelet de la levre extérieure, à pas des orbes granuleux,

*séba, pl. & à tête élevée *.

283. Un Casque des Indes peu commun, ventre de biche, marbré par taches rondes de blanc, à levre extérieure tachée de brun, & repliée en-dehors en gros bourrelet, à levre intérieure blanche, à un double rang de tubercules dans le premier orbe, & un seulement dans les autres, de sorme bombée & à tête peu

* Ibid. pl. élevée *.

'Arg. ibid. let.

184. Trois Casques des Indes lisses; sçavoir, deux blancs nués de bleu, à grandes taches quarrées fauves, rangées par zônes, à grande côte longitudinale, située en arriere de la lévre intérieure, & à trois petites sur les orbes suivans, à clavicule aiguë, nommés Casques pavés ou eruités, & grands dans leur espèce *; & constant de la companyation de la c

*Rumph. vés ou eruités, & grands dans leur espèce *; & 22h. 25. 10. 1. un verd de terrasse, à slammes longitudinales. Arg. pl. 15. étroites & onduleuses fauves, & du reste sem-

* Rumph. blable aux précédens *.

185. Quatre Casques pavés, dont deux de l'espèce des deux premiers de l'arti le précédent; & deux verd de pavot qui n'en différent

ment rériculés, à taches plus petites, & de forme un peu moins bombée *.

VII. FAM.
ROCHERS.
**Gualt. sub

286. Quatre Casques; sçavoir, deux Pavés 40. litt. B. du Golse de Venise, blancs nués de sauve, à taches quarré-long, striés circulairement dans les premiers orbes sinement réticulés dans les derniers, à tête un peu élevée, à coque mince & lévre intérieure granuleuse *; & deux des londes, gris teint de verd d'eau, lisses dans le premier orbe, sinement réticulés dans les autres, à pas applatis bordés de petits tubercules, à lévre extérieure sinissant par trois dents saillantes en dehors, & à côte longitudinale située derriere le repli de la lévre intérieure, espéce qu'on nomme Casque Bézoard, ou simplement B. zoatd *.

287. Trois Casques; sçavoir, deux de la Gualt, tab.40. Méditerranée, qui ne dissérent des premiers de litt. A. l'article précédent, qu'en ce que les taches s'y joignent en sorme de bandes long tudinales, que les cannelures transversales y sont beaucoup plus grandes, & la coque plus épaisse *; *Gualt. tab. & un gros B'zoard dépouillé, devenu par-là Séba, pl. 68. nossette, bordé de bleu pâle.

288. Treize petits Casques; sçavoir, deux blancs à robe plissée en longueur, à pas des deux premiers orbes un peu tuberculeux, & *Gual rabe à lévre extérieure fort épaisse, tachetée de Arg. pl. 14. brun *; deux rares qui dissérent des précédens lett. G.

ROCHERS.

apar le rebord de la lévre extérieure, qui est tres-VII. FAM. mince, & par une large bande longitudinale oblique, tachetée de brun : ce qui les peut faire

Ė

ኔ

* Arg. pl. nommer Casque en baudrier * ; deux blancs nués 14. lett. ri. séba, pl. 53. de fauve, à flammes étroites longitudinales roun°. 18-23. gearres, à lévre extérieure comme les précé-* Gualt. tab. dens *; deux blancs réticulés, à pas du premier

39. 11 L. Séba, pl. 530 orbe applati & bordé d'une couronne de petits x*. 4. tubercules, à lévre extérieure dentelée en de-

dans sur toute sa longueur, & en dehors dans le bas seulement, l'un desquels est garni de plus sur le premier orbe d'une côte longitudinale qui

* Séba, la reparoît encore dans l'orbe suivant *; quatre Coq. du mi-lieu du haut réticulés, dont deux Pavés de l'espèce des deux derniers de l'article 285; deux qui en différent de la pl. 69. en ce qu'ils sont à bandes longitudinales ondées, variété qu'on distingue par le nom de Casques rayés; & un très-petit à stries circulaires, & à côte longitudinale située à l'opposite de la lévre

extérieure.

289. Cinq Casques des Indes; sçavoir, trois de l'Isle de France, dont deux blancs veinés de gris, marbrés comme les Casques plumes, mais d'un rouge plus obscur, à stries longitudinales & cannelures transversales peu prosondes, appellés en Hollande Bonnets de Pologne *; un

tab. 13. nº 3. qui ne différe des précédens que parce qu'il est Séba, pl. 72. entiérement blanc, excepté le repli de sa lévre Mº. 10-21. extérieure, qui est tacheté de brun, ce qui le dinales, & à lévres tachetées de rouge-brun, VII. Fam., dont un à pas des orbes un peu applatis & *Gualt. tab. couronnés de perits tubercules *, & l'autre à 40. litt. C. pas des orbes fans tubercules, mais arrondis en forme de gros bourrelets, & féparés les uns des autres par un profond fillon; ce qui le rend auffi très-rare.

290. Seize Casques de dissérentes grandeurs; sçavoir, deux blanc - jaunâtre de la Méditerranée, de forme très-bombée, & à stries circulaires peu prononcées *: deux des Indes blancs, striés aussi circulairement, mais à pas des orbes 299. fig. 64. creusés en dedans en forme de sillon assez profond; deux fauves nués de blanc, à cinq fascies tuberculeuses sur le premier orbe, dont la plus élevée se prolonge sur le haut du second & du troiseme orbe *; deux blancs, lisses, tachetés * Rumph.tab. de marron autour de la spirale, & de brun sur 27. nº. 10.
List. 1003. le bourrelet de la lévre extérieure *; un Casque fig. 68. pavé lisse à petites taches *; un Casque rayé de 53. n°. 9.
*Rumph.tabe l'espèce de ceux de l'article 288; deux comme 25, litt. B. les deux premiers, & un comme les septieme & huitieme du même article; un qui différe du précédent, en ce que les pas des orbes en sont moins applatis & simplement granuleux; & deux Bonnets de Pologne.

291. Dix Casques de moyenne grandeur; sçavoir, deux blancs de la Méditerranée, à grosses stries granuleuses dans le haut, à lévres

VII. FAM. rieure granuleuse *; un de Saint-Domingue,
ROCHERS. de forme à peu près semblable, mais à stries

in Bonan. cl. de forme à peu près semblable, mais à stries
circulaires moins prononcées & de couleur fauve; un des Indes, rose-séche, lisse, couronné
dans le haur du corps de petits tubercules, &
umbiliqué; deux Casques Bézoards, dont un
dépouillé; deux Bonnets de Pologne, & deux
de l'espèce des cinquieme & sixieme de l'article
précédent.

292. Deux Casques peu communs, blancs nués de sauve, à stries circulaires nombreuses, à lévre extérieure relevée & saillante en dehors en vive arrête, & intérieure tapissant une portion de la base, & saillante aussi vers le bis, à petite queue peu retroussée, l'un à bouche dens

* Gualt. tab. telée des deux côtés, l'autre non *.

43. n°. 2. Ronan. cl. 3. f. 160.

293. Un grand Casque de la mer du Sud, rare, blanc nué de sauve, à stries longitudinales peu élevées en sorme de rides, à quatre zônes chargées de taches rousses, & dont la plus haute est un peu tuberculeuse, à huit orbes renssés, ornés chacun d'une couronne de petits tubercules, & au-dessus de cercles granuleux, à lévres extérieure & intérieure saillantes en dehors

* 56ba, pl. & applaties, & à côte mince longitudinale *.

71. n°. 12 &

394. Deux grands casques des Indes, nués
& marbrés de blanc, d'aurore & de brun de
différentes nuances, à stries fines longitudinales,

ceints

Gual. tabi

ceints d'un grand nombre de cordons circulaires tuberculeux, à bouche dentée des deux côtés, VII. FAM. & à lévres retroussées, l'extérieure fort épaisse, l'intérieure ridée, noire en dedans, tapissant une partie de la base, & nommés Turbans*.

295. Deux Turbans de couleurs très-vives, 73. n°. 3, 48 moins grands que les précédens, & par-là pro-

pres à être placés dans des tiroirs.

296. Deux semblables, mais moins grands, & à lévre extérieure fort mince, ce qui est rare dans cette espéce de Casques.

297. Deux gros Casques d'Amérique, grisblanc, slambés par bandes longitudinales en zig-zag de fauve, de brun & de violet, de forme un peu triangulaire, à trois fascies transversales tuberculeuses, dont les deux premieres sont peu prononcées, à tête applatie, à lévres teintes par grandes taches de brun-foncé, & nommés Casques triangulaires *.

298. Deux Casques triangulaires de moyenne 41. litt. A. grandeur, dont un à un seul rang de tubercules, & imitant par son dessein le point de Hongrie*; l'autre en dissére en ce qu'il n'a point de * 5662, pl;
stries dans le corps, & que son milieu est 73. n°. 10 &c

chargé de gros tubercules *. * Ibid. nº4

299. Trois Casques; sçavoir, deux blancs 14 & 15. marbrés de sauve & de brun, à stries circulaites & cannelures piquées réguliérement de petits traits longitudinaux, par où ils imitent le

Tome I. M

dessous d'un ouvrage tricotté, à trois fascies

VII. FAM. tuberculeuses, & une couronne de clouds qui s'étend dans tous les orbes, dont les pas sont applatis & se recouvrent l'un l'autre, nommés

Casques tricottés, petits dans leur espèce, & séba, pl. par-là propres à entrer dans des tiroirs *; & un 73. n°. 7 & 8. de la variété du premier de l'article précédent, Gualt. tab. 40. mais dont le rang de tubercules est à peine sen-

* Séba, ibid. fible *. nº. 19 & 20.

200. Trois Casques plus grands que les précédens, dont un Tricotté, & deux Turbans.

301. Deux grands Casques, dont un Tricoul, & un Turban.

302. Deux gros Casques triangulaires, àtrois rangs de tubercules fort saillants, de la base de l'un desquels on a enlevé des portions pour mettre à découvert la structure intérieure.

303. Trois très-grands Casques, dont deux gris-jaunâtre, à deux rangs de tubercules sur le milieu du corps, & un de clouds très-saillans à l'extrémité, à lévres applaties & extrêmement saillantes, sur-tout du côté de la tête qui est peu élevée, à coque très-épaisse & bouche dentée

Lift. 14h. des deux côtés *; & le troisseme gris, à stries circulaires encore plus distances que dans le

précédent, à trois fascies chargées de mammelons peu élevés, à tête platte, & à lévres applaties, plus saillantes vers les côtés que vers la tête, à côte platte longitudinale, couchés fous la lévre intérieure, & se prolongeant sur les orbes suivans, & à bouche tachée de rouge-VII. FAM. brun, garnie de très-grosses dents.

GENRE TROISIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE SANS PATTES.

304. Un grand Rocher blanc un peu taché de jaune, à grande aîle cannelée transversalement, se repliant en dedans, s'étendant sur la tête, la dépassant, & échancrée vers le bas, à dix orbes couronnés de petits tubercules, & nommé l'Aîle large*.

Rumph.
305. Trois Rochers aîlés, dont deux blancs, tab. 36. lit. L. & un fauve nué de blanc en dessus, & blanc n. 26ba, pl. 63. en dessous, à aîles moins grandes que celles du précédent, ne s'étendant que jusqu'au second orbe, & sinissant par deux échancrures, à dix orbes couronnés de pents tubercules, & de l'espèce nommée Tourierelle*.

quatre petites zônes blanches, tachetées du Rumph. rab. fond, à aîle recourbée & striée en dedans *;
deux blanches marbrées, par bandes longitudi-61. nº. 15.
nales en zig-zag, de canelle, ventrues, à grande 37. litt. X.
aîle recourbée en dedans, épaisse dans son bord

M ij

180 COQUILLES UNIVALVES

& finissant par deux petites sinuosités *; & deux Tourterelles fauves.

VII. FAM. ROCHERS. * Séba, pl.

lett. Q.

307. Idem, à quelque perite différence près.

308. Deux Aîlées blanches nuées de jaune, 22. no. 18 & a stries transversales dans le bas, & cannelures longitudinales dans le haut, traversées de stries fines circulaires, à tête fort élevée, composée de neuf orbes réunis les uns aux autres par une moulure, à aîle recourbée, commençant & finissant par une échancrure, & à lévre intérieure retroussée en dehors:on les nomme en Hollande

List. tab. l'Artimon entortillé *. \$12. fig. 8.

309. Deux Artimons entortillés peu communs, dont un blanc qui ne différe de ceux de l'article précédent, qu'en ce qu'il est de forme plus effilée, & à onze orbes, dont les cannelures sont plus marquées & se prolongent même

* SEba, pl. sur le corps *; & un blanc nué de jaune, abso-List. 19. 855. lument de même forme, mais sans aîle, & par fig. inferior. conséquent du premier âge de cette espéce.

> 310. Cinq Artimons entortillés ; sçavoir, deux de l'espèce de ceux de l'article 308, à petites mailles orangé sur un fond blanc, & à trois zônes blanches, chargées de chevrons aussi

• séba, pl. orangés *; & trois papyracés du premier âge, dont deux marbrés de blanc & d'orangé, & Rumph tab un blanc avec une légere teinte de jaune. 16. lit. 0.

311. Quatre Aîlées peu communes, dont deux blanches à rayes circulaires & onduleuses fanves très-serrées, un peu bossues dans leurs contours, à une échancrure dans le haut de VIII. FAM. l'aîle, & deux dans le bas, & à bouche lilas *; *ROCHERS, & deux perites de même forme, marbrées de 3-f-150-brun-jaunâtre, & à cinq zônes blanches ondu-leuses *.

- 312. Deux Aîlées très-rares, blanches, à 847. fig. 1.
 Arg. pl. 142.
 rayes circulaires pourpre, formées de traits in-lett N.
 terrompus & onduleux, à huit orbes, dont le 372 leu. V.
 premier est couronné d'un rang de tubercules, à
 triple échancrure dans l'aîle comme les précédentes, & à bouche citron; on les nomme en
 Hollande Buccins de la mer rouge.
- 313. Deux Aîlées rares, marbrées par grandes taches de marron clair & de blanc, à tête élevée, composée de neus orbes traversés de cannelures longitudinales peu prononcées, à aîle bordée dans le haut d'un petit bourrelet, & de trois dents saillantes dans le bas, & à lévre intérieure repliée en dehors*.

314. Neuf Aîlées; sçavoir, trois rares, dont 61. 10. 41-474 deux blanches tirant sur le couleur de chair, à zônes formées de hachures jaunes qui représentent, sur-tout vers l'aîle, des caracteres Chinois, à tête applatie, & composée de sept orbes se recouvrant l'un l'autre, & un peu tubercu-leux, à aîle échancrée en haut & en bas: la troisieme dissére des deux premieres, en ce que la tête est un peu plus élevée, & que l'aîle n'em

182 COQUIELES UNIVALVES

vII. FAM. turalistes jugent désigner le premier âge de la ROCHERS.

* Scha, pl. Coquille *; deux blanches à larges zônes formées de chevrons souci, à tête un peu élevée, à aîle échancrée comme celle des précédentes, & à bouche safran, à la lévre intérieure près, qui est

Lift. tab. d'un beau noir *; quatre de même espéce, mais \$51. fig. 6.
Rumph. tab. du premier âge, dont deux dépouillées, & de57. litr. 5.
Séba, pl. 61. venues par-là blanc de lait.

B°. 11 & 12.

315. Treize Aîlées; sçavoir, une rare blanc de lait, à stries circulaires inégales, peu prononcées, à huit orbes, dont les pas des premiers sont un peu applatis & bordés d'une espéce de petit bourrelet, à clavicule aiguë, & aîle un peu recourbée, s'élevant jusqu'au troisseme orbe; deux non moins rares, dont une blanche, & l'autre grise bariolée de jaune, toutes deux à stries sines transversales, à cinq rangs de petits tubercules d'inégale grosseur sur le corps, à huit orbes couronnés aussi de tubercules très-gros dans le premier, à bouche brune tirant sur le noir, & à aîle épaisse, échancrée en haut & en bas *; deux blanches nuées de

*Séba, pl. en haut & en bas *; deux blanches nuées de 52. 10°. 17. & gris & de verd de pavor, à l'exception du bord de l'aile, qui est brun-noirâtre, ainsi que la bou-

de l'aile, qui est brun-noirâtre, ainsi que la bouche, à tête élevée, composée de huit orbes tu-List. tab. berculeux, & à petite queue, espéce qu'on

List. tab.

2c7 fig. 13.

nomme Gueule noire *; une autre Gueule noire 56ba, pl. 61.

n°. 30 & 31.

fasciée de marron clair & de blanc; & sept au-

tres Aîlées de diverses couleurs & marbrures, & d'espéce approchante de celle des Gueules VII. Faiss. noires .

316. Dix-huit Aîlées par pendans; sçavoir, 61. 10. 35-40. quatre marbrées & fasciées de blanc & de rougebrun *; quatre petites Tourterelles, dont deux cannelle, à petites zônes blanches, & deux blan- 50 & 54ches nuées de fauve *; deux Gueules noires; deux comme les troisseme & quatrieme de l'ar- tab. 36. lit. 2ticle 306; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article 314; & quatre comme celles de l'article 311, à la couleur près des deux premieres, qui est b'anche.

- 317. Deux grandes Aîlées de la Jamaique. rares, blanches, marbrées par traits longitudinaux de roux, à trois grosses côtes longitudinales dans le corps, qui forment, dans la couronne du premier orbe, autant de gros tubercules oblongs, à dix orbes un peu creusés en doucine, & à aîle mince, sinueuse vers le bas, & très-saillante.
- 318. Trois Aîlées de la Jamaique, peu communes; sçavoir, une grande blanche, nuée de roux, à deux rangs de petits tubercules inégaux dans le milieu du corps, & un troisseme de gros, couronnant le premier orbe, & se prolongeant sur les suivans, à aîle épaisse vers le haut, & sinueuse vers le bas *; une de moyenne grandeur, blanche nuée de couleur de rose, 62, 118, 62

VII. FAM. cies ne sont marquées que du côté de la lévre ROCHERS. intérieure, & à tubercules des orbes moins sail* séba, pl. lants *; & une de l'espéce de celles de l'article précédent, mais moins grande.

319. Deux Aîlées en pendant, de l'espèce de la premiere de l'article précédent, un peu moins grandes, mais riches en couleur : leur robe est canelle, nuée de verd de terrasse, & marbrée de blanc & de ponceau.

320. Quatre Aîlées en pendant; sçavoir, deux blanches tachetées de brun de diverses nuances, à huit zônes chargées de petits tubercules inégaux, à un cercle de bossages qui couronnent le premier orbe, & se prolongent en forme de tubercules sur les suivans, à aîle terminée en bourrelet épais, s'étendant vers le haut sur les quatre premiers orbes, à deux échancrures vers le haut, & autant vers le bas, tbid. n° de l'espéce nommée Tête de serpent*, & grandes

Gualt. tab.32.

de l'espéce nommée Tête de serpent*, & grandes dans cette espéce; & deux aurore très-vis dans le corps, à tête blanche, à douze orbes, dont les premiers sont couronnés de clouds, & les autres de tubercules, à aîle échancrée dans le bas, & sinueuse dans le haut: on les nomme

*Arg. pl. 15. Oreilles de cochon *.

lett. A. Gualt tab.32. 321. Cinq Aîlées; sçavoir, trois Oreilles de cochon, dont deux semblables aux précédentes, mais de couleur plus soncée, & ornées chacune

d'une large zone plus claire que le fond; la troisieme a une zone semblable, mais le premier VII. FAM: orbe est dépourvu de clouds, & les autres n'ont ROCHERS. que de petits tubercules peu prononcés; & deux Têtes de serpent.

322. Sept autres Aîlées; sçavoir, quatre Oreilles de cochon, dont une rare & singuliere, en ce que les clouds, au lieu d'être pointus, sont coupés quarrément comme les dents de certaines roues, une peu commune, en ce qu'elle est blanche en dessus, & pourpre en dedans; deux comme les premieres de l'article précédent, & trois Tête de serpent, dont une à aile épaisse, une à aîle papyracée *, & l'autre sans aile ou du premier âge *.

323. Quatre très-grandes Aîlées d'Amérique, revêtues de leur épiderme fauve-roux, à grosses. stries transversales, à orbes couronnés de tubercules très-saillants, & à bouche couleur de rose, nommées Lambis, dont une à aîle fort épaisse, deux à aîles plus minces, & la derniere du premier âge, c'est-à-dire, sans aîle *.

Gualt, rab.

324. Trois gros Lambis du premier âge, dépouillés de leur épiderme, dont deux couleur de chair, & un couleur de rose.

325. Quatre Aîlées à peu près des couleurs & nuances des Lambis, mais moins grandes; elles en différent d'ailleurs en ce que la bouche n'en est point couleur de rose, que les tuber-

136 COQUILLES UNIVALVES.

cules du premier orbe en sont plus gros à pro-VII. Fam. portion, & que ceux des autres orbes sont presque entiérement cachés sous les extrémités des orbes précédens: l'aîle est fort épaisse dans l'une, & papyracée dans l'autre: les deux dernieres sont du premier âge ou sans aîle, à robe rosepâle dans l'une, ce qui l'a fait nommer Pomme d'Acajou, & violette dans l'autre, que l'on nomme l'Episcopale.

3 26. Deux Pommes d'Acajou en pendant, & de couleurs très-vives.

327. Deux Episcopales aussi en pendant.

328. Six Aîlées de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux marron soncé, marbrées & tachetées par zônes de blanc & de brun, à grosses stries circulaires un peu onduleuses, à un rang de tubercules au haut du corps, dont les plus près de l'aîle sont les plus gros, à tête assezélevée, & à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée dans le bas, & s'élevant un peu vers le haut * deux couleur de

* Séba, pl. vant un peu vers le haut *; deux couleur de 62. n°. 1 & 9. tuile, semblables de forme aux précédentes, & qui en conservent la marbrure dans un petit cordon qui régne autour des spires; & deux du premier âge de cette espéce, des mêmes couleurs & dessein des deux premieres, mais sans

* Ibid. n°. aîles *.

329. Six autres Aîlées par pendans, de fond & marbrure semblables aux premieres de l'article précédent; sçavoir, deux du dernier âge, à vII. Fam. l'une, & papyracée dans l'autre; deux qui ne dissérent de celles-ci qu'en ce que la lévre extérieure, qui y est aussi papyracée, s'y éleve à peine en forme d'aîle, ce qui les fait regarder comme l'âge moyen de la Coquille *; & deux * séba, pli comme les dernieres de l'article précédent, à lévre extérieure papyracée aussi, & ne tenant point du tout de la forme d'aîle; ce qui constitue le premier âge de cette Coquille. Ces trois variétés sont fort intéressants.

330. Sept Aîlées; sçavoir, deux du dernier âge de l'espèce des deux premieres de l'article 328, mais un peu dissérentes pour le sond; une de l'âge moyen, & quatre du premier âge, dont deux de la premiere variété du même article, & deux de la seconde.

331. Neuf Aîlées; sçavoir, deux bariolées de matron, de sauve & de blanc, à stries circulaires un peu onduleuses & granuleuses, à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée en haut & en bas, & armée, au-dessus de l'échancrure d'en haut, d'une avance en sorme dedoigt, à petite queue échancrée & retroussée, nommées Oreilles d'âne *; deux Oreilles d'âne, * Arg. ph. dissérentes des précédentes, en ce que l'aîle en séba, pl. 61. est papyracée, & n'a ni échancrure, ni avance; n°. 1 & 2. Lill. tab. 872. deux comme les premiere & troisieme de l'ar sig. 28.

COQUILLES UNIVALVES

ticle 328, & trois variétés du premier âge de VII. FAM. cette espéce *.

ROCHERS.

332. Les mêmes Coquilles que dans l'article * Séba, pl précédent, à cette différence près que l'une des Oreilles d'ane de la premiere espèce est blanche, nuée de couleur de rose.

333. Quatre grandes Aîlées marbrées de blanc, de fauve & de roux, dont deux ne différent des précédentes qu'en ce qu'elles sont 4 Ibid. pl. couronnées de plus gros tubercules * ; les aîles

des deux autres s'élevent au niveau de la columelle, & jettent en avant une espéce de doigt qui se prolonge encore beaucoup plus loin, ce

Ibid. pl. qui les fait nommer Aile d'Ange *.

62. n°, 1 & 2. Lift. tab. 874 6g. 30.

12. nº. 4.

GENRE QUATRIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE ET A PATTES.

274. A ROIS grands Rochers des Indes, marbrés de blanc & de marron clair, à quatre fascies tuberculeuses, & de différens âges; sçavoir, un du dernier âge, à aîle armée de six grandes pattes crochues, creufées par dessous en canal presque fermé, à lévres chargées de petites stries aurore, nommé en France Araignée mâle, &

Gualt. tab.35. en Hollande Griffe du Diable. *; un de l'âge litt. B.

Lift. tab.

vertes, nommé l'Araignée femelle ; & un du VII. FAM., premier âge, à lévre papyracée, dépourvue Rochers.

d'aîle & de pattes 2.

Rochers.

1 Gualt. tab.
35. litt. A.
Rumph, tab.

335. Idem, à quelques petites différences 35. litte B. près dans les pattes de l'Araignée mâle, qui sont 23. nº. 1. plus ouvertes que dans celle de l'article précé-Rumph. tab. dent.

336. Deux Araignées mâtes d'une autre variété, & peu communes : elles sont à six pattes comme les précédentes, mais à fascies plus élevées, & ont non-seulement les lévres, mais encore tout l'intérieur de l'aîle chargés de stries onduleuses blanches & de cannelures brunes 3.

des mêmes couleurs que les précédentes, & blanches seulement en dedans, à sept pattes, y compris la queue, nommées en Hollande Crabes communs, dont deux mâles ou du second âge, à pattes longues, étroites & fermées 4, & deux 4 Arg. femelles ou du premier âge, à pattes courtes, 14 lett. E. Gualt. tab. larges & ouvertes?

338. Deux Araignées mâles à sept pattes, 866. £ 21.

plus grandes que les précédentes, l'une blat Rumph. tab.
che marbrée de marron, remarquable par une
grande queue recourbée, & l'autre blanche
nuée de fauve, à petite queue. Plus une du premier âge de cette espèce.

339. Deux Araignées mâles de cette espéce,

190 COQUILLES UNIVALVES

ROCHERS.

VII. FAM. une monstrueuse, en co que trois de ses pattes partant d'un même pli, faillent fort en avant, & se replient même sur les autres; & une troisieme sans aîle, comme la derniere de l'article précédent.

marbrées de fauve au lieu de marron, dont

340. Deux grandes Araignées mâles à sept pattes, d'une espèce rare : elles différent de toutes les précédentes, en ce que la clavicule comprenant les quatre derniers orbes, en est applatie, & que les tubercules en sont moins gros; l'une revêtue de son épidernie, & à grandes pattes fermées en dessous, l'autre dépouillée, à pattes un peu moins grandes & ouvertes, toutes deux du de nier âge de cette espéce.

341. Deux autres de même espéce, mais moins avancées en âge; sçavoir, une du moyen âge ou femelle, à aîle très-saillante, peu épaisse, bordée de grandes dentelures formées par le prolongement des fascies circulaires, & s'élevant jusqu'à la clavicule sur laquelle elle se replie; l'autre du premier âge, parfaitement semblable à la précédente, à l'aîle près dont elle en dépourvue, & nommée dans cet état, par List. tab. Klein, Racine de Brione *.

342. Deux petites en pendant, de même espéce, à lévre extérieure papyracée, & qui paroissent être d'un âge encore antérieur à la derniere de l'article précédent. Ces trois articles réunissent sous un seul point de vue tous les changemens d'état de cette Coquille.

343. Trois Rochers des Indes; sçavoir, deux Rochers.
blancs marbrés de sauve - roux, dissérens des
Araignées de l'article 337, en ce que les sept
pattes en sont noueuses, la forme moins bombée, & la bouche striée, blanche & brune: on
les nomme en Hollande Crabes à nœuds ou
goutteux, & en France Scorpions *; l'un mâle
à longues pattes sermées, l'autre femelle à pattes
courtes & ouvertes, & un dissérent des précédens, en ce que les pattes en sont à peine noueuses, que le dedans de la bouche en est orangé,
& sans stries, nommé le Scorpion orangé.

344. Six Rochers; sçavoir, quatre petits fauves nués de gris, à orbes tuberculeux & à tête élevée, deux desquels ont l'aîle partagée en quatre longs doigts, & se nomment en Hollande Aîle de chauve-souris mâle *; les deux * Gualt. tab. autres à aîle armée d'un seul doigt peu long, & séba, pl. 62. nommées Aîle de chauve-souris semelle *: ces * Gualt. tab. Coqu'lles sont encore connues sous les noms de 53. litt. A. List. tab. 865. Hallebarde ou de Patte d'oie; & deux Scorpions sig. 20. mâles des variétés de l'article précédent.

345. Trois Rochers marbrés de blanc & de roux, à dix pattes, y compris la queue, à bouche couleur de chair, striée des deux côtés, nommés Mille-pieds, dont deux mâles à pattes

192 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. racée, garnie de pattes courtes & ouvertes.

ROCHERS.

1 List. tab.

346. Trois Rochers; sçavoir, deux Griffes

868 869. s. du Diable, dont une très-grande, & l'autre dé25. litt. s.

1 List. tab.

346. Trois Rochers; sçavoir, deux Griffes

868 8 869. s. du Diable, dont une très-grande, & l'autre dé26. litt. s.

1 Sign pl. 15. la Coquille, & une Araignée femelle de la

même espéce.



HUITIEME FAMILLE.

POURPRES.

Ce sont des Coquilles en volute, ordinairement moins grosses & moins pourpres.
rensées du milieu que les Murex. Elles
sont encore caractérisées par une petite
bouche à peu près ronde & unie, par
des côtes longitudinales plus ou moins
nombreuses, placées à égale distance
les unes des autres, & chargées ou de
tubercules, ou de petits clouds aigus,
ou de seuillages à bords découpés &
frisés, ou ensin d'épines longues & sines. Elles ont toutes une queue creusée
en gouttiere plus ou moins longue, d'où
pous tirerons leur division en deux genres; sçavoir,

- 1°. Les Pourpres à queue un peu large, courte & recourbée.
- 2°. Les Pourpres à queue plus étroite, longue & droite.

Tome I.

GENRE PREMIER.

POURPRES A QUEUE UN PEU LARGE, COURTE ET RECOURBÉE.

347. LUX très-grandes Pourpres rameu-VIII. FAM. ses des Indes, blanches veinées de fauve, ren-Pourpres, flées, à stries fines circulaires, à trois côtes longitudinales, d'où naissent de grosses seuilles frifées, plus grandes dans l'une, & moins dans l'autre, sur le milieu des intervalles desquelles on voit un rang longitudinal d'assez gros tubercules, & à lévre intérieure teinte de couleur

de rose, variété qu'on peut nommer Rameuse triangulaire *. C'est la Chausse-trape ou le Cheval de frise de M. d'Argenville.

348. Deux semblables, mais moins grandes.

349. Idem, à cela près que le fond des deux Coquilles est rayé ici de brun & de marron.

250. Idem, à quelque différence près dans la grandeur & les nuances.

351. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, blanches, fasciées dans les cannelures de brun, à stries fines circulaires, & autres plus grosses, dont le prolongement se termine, le long des grosses côtes longitudinales, en seuilles frisées très-saillantes dans l'une *, & fort peu dans l'autre.

VIII. FAM

352. Deux Pourpres ramenses triangulaires Pourres *Séba des Indes, sauve nué de noisette & de marron, 77. n°. 2 à tête plus élevée que les précédentes, & à seuilles frisées très-longues, recourbées en arrière dans leur extrémité *.

Ibid. P. si

353. Quatre Pourpres rameules triangulaires en pendans; sçavoir, deux d'Amérique, couleur de suye, à seuilles très-serrées les unes contre les autres dans chaque rang longitudinal, & qu'on pourroit nommer Ensumées; & deux de l'espèce de celles de l'article précédent, mais plus petites, & à seuilles plus minces, plus allongées à proportion, & plus recourbées *.

Ang. pli

- 354. Quatre Pourpres rameuses triangulaires d'Amérique; sçavoir, deux blanches à claviçule marron clair, à stries circulaires très-fines; & deux Enfumées.
- 355. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, noires, à quelques endroits près, qui sont marqués de blanc dans le corps, à grandes seuilles frisées & recourbées, à trois grosses bosses situées entre les trois rangs longitudinaux de ces seuilles, & à lévre intérieure couleur de rose, espèce qu'on nomme Brulés*.

356. Trois Pourpres rameuses triangulaires; séba, pl. 77. scavoir, une de l'espéce de celles de l'article no. 36. 10.

* Ibid. lett.

196 COQUILLES UNIVALVES

352; & deux Brulées, où il paroît plus de VIII: Fam: blanc que dans celles de l'article précédent.

POURPRES.

357. Quatre Pourpres rameuses en pendant, des d'eux espéces de l'article précédent.

358. Six Pourpres rameules en pendant; sçavoir, deux blanches, semblables à celles de même couleur de l'article 354; deux Bralies, & deux comme les dernieres de l'article 353.

359. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, rares & en pendant, ventre de biche, à stries circulaires brunes, à seuille ges peu saillans, mais bien dessinés, & d'un beau cou-leur de rose, à lévres bordées de même, de sorme oblongue, & à tête fort élevée.

360. Deux autres, dont une de la variété des précédentes, mais plus grande, plus foncée en couleurs, & dont les feuilles montrent moins de couleur de rôse; & une qui ne dissére de la précédente qu'en ce que le fond & les cannelures en sont de couleur blanche, & que les

* séba, pl. feuilles & les stries sont marron soncé *.

77. 20. 11 & 361. Trois Pourpres rameuses triangulaires;
List. 12b. 946. sçavoir, une semblable à la premiere de l'article
précédent, mais plus soncée en couleurs, & 2
feuilles dont l'intérieur est lilas vis; & deux
blanches à stries circulaires brunes, de la sorme

des précédentes, à cala près qu'on y remarque trois rangs de bosses longitudinales entre chaque paire de côtes feuillites.

362. Trois autres de la variété des articles précédens; sçavoir, une blanche nuée de fauve VIII. Fame. à feuillages couleur de role; une fauve à str'es Pourmes. brunes, & à dessous des seuillages couleur de thair, & la derniere marron à stries noires & à feuiltages lilas vif.

363. Quatre Pourpres triangulaires d'Amérique, à stries circulaires granuleuses, alternativement groffes & menues, à trois groffes côtes longitudinales, & deux petites intermédiaires, sur lesquelles s'élevent les grosses striesdu corps, formant sur celles-ci de petits tubercules, & sur les autres des seuillages très-courts & peu nombreux, toutes de souleur grise, mais dont deux à côtes blanches & bouche jonquille, & deux à côtes blanches & brunes, & à bouche conleur de rose.

364. Six Pourpres triangulaires en pendant; sçavoir, deux des Indes, rares, à stries fines circulaires, à trois grosses longitudinales, & àtubercules qui se continuent trois par trois dans chaque orbe, à petite queue armée de deux épines, à lévres teintes en dedans de cérise, à coque très-épaisse & de forme renssée : deux. de la Méditerranée, blanches, nuées de sauve, à groffes stries circulaires en forme de cordons gramleux, à profondes cannelures, à trois côtes longitudinales, chargées de plis assez faillans *, l'une desquellee conserve son opercule; morph pl. 4-

& deux de l'espèce des dernieres de l'article

POURPRES. 353.

9. fig. 21.

365. Huit Pourpres triangulaires rares; scavoir, quatre des Indes, dont une blanche. & trois blanches à taches peu nombreuses rousses plus ou moins foncées, à stries circulaires, & à trois groffes côtes longitudinales qui s'étendent sur tous les orbes, & dans l'intervalle defquelles on en remarque trois plus petites, de même extension, de some oblongue, à tête très-élevée, à lévre extérieure en bourrelet applati & dentelé, avec une petite avance platte en forme de commencement d'aîle; & quatre petites du Sénégal, dont deux blanches, & deux blanches marbrées de brun brûlé dans les intervalles des côtes, qui sont aîlées & tranchantes dans lemremier orbe, arrondies dans les autres, & à queue fermée comme un tuyau,

* Adans. Hist. nommées par M. Adanson le Jatou *.

366. Une Pourpre triangulaire aîlée des Indes, très-rare, blanche, à stries circulaires trèsfines, & à trois côtes longitudinales, de chacune desquelles, & principalement de celle qui borde la lévre, s'élevent de longues avances papyracées en sorme d'aîle, à tête très-élevée, composée de sept orbes un peu renssés, & à lévres en vive arrête; elle porte trois pouces trois lignes de long.

367. Une Pourpre ailée différence de la pré-

cédence, en ce que les stries en sont plus prononcées, que les aîles s'y prolongent jusqu'à VIII. FAME. le clavicule, que la tête en est moins élevée, POURPRESS. quoique composée de neus orbes, que les intervalles des côtes aîlées y sont chacun chargés d'une bosse, que la queue en est recourbée en dessus, & divisée en une espèce de sourche, & qu'elle n'a que deux pouces de long.

368. Une Pourpre aîlée semblable à la précédente, à cela près que les aîles en sont sort contournées, que celle du côté extérieur de la bouche en est sort large, & que la queue en est à peine sourchus.

369. Une Pourpre rameuse des Indes, à coque mince, blanche, chargée de six rangs de seuilles noires très-déchiquetées, & connue sous le nom de Râtie *; elle est grande dans son est-

370. Deux Róises en pendant, moins grandes que la précédente.

371. Deux Pourpres rameuses des Indes, à zônes alternatives blanches & jaune-soncé, à six rangs longitudinaux de petites seuilles baunes très-srisées, ce qui leur a fait donnar le nom de Chicorée.*.

372. Cinq Pourpres, dont trois rameuses, K. & deux épineuses; sçavoir, une rameuse brune, à six côtes longitudinales, dont cinq chargées de très-petites seuilles, & la derniere, qui borde Niv

*Bid Ru

200 COQUILLES UNIVALVES

VII. FAM. ges & applaties à l'extrémité; ce qui a fait POURPRES. donner en France, à cette espèce, le nom de

* Arg. pl. Patte de crapaud *, & en Hollande celui de 16. lett. D. Bois de cerf; deux petites Pattes de crapaud, 13-16. dont une canelle à côtes peu prononcées, & à Valent. unideux rangs de longues féuilles, l'autre blan-

* Valent. ib. che *, semblable du reste à la première; & deux petites épineuses blanches nuées de fauve, à stries circulaires, & à fix côtes longitudinales un peu obliques, chargées d'épines peu longues, mais très-aigues, & à tête très-êlevée,

composée de neuf orbes. •

373. Onze Pourpres de diverses grandeurs; scavoir, la plus grande, rameuse d'Amérique, à coque mince sauve, à stries circulaires inégales, à six côtes longitudinales chargées de seuilles grandes & petites marron, à sept orbes bombés, & à lévre intérieure teinte de couleur de rose; six de la Méditerranée par pendans, saciées de blanc & de marron, à stries sines circulaires, à côtes longitudinales tuberculeu-see, garnies d'un appendice couché dans le même sens en sorme d'écorce, & à couronne de tubercules, se prolongeant dans les second de tubercules prolongeant de tubercules p

*Bonan. cl. & troisieme orbes *; une qui ne dissére des 3. f. 272. troisieme & quatrieme de l'article 364, qu'en ce qu'elle a fix côtes longitudinales; elle loge Bernard l'Hermise; deux Chicorées, & une Rôsie.

rès-rare, fond blanc, à stries circulaires de VIII. FAMA même, à huit côtes longitudinales obliques, noires, hérissées de longues pointes aigues de même couleur, qui régnent de la tête à la queue, à tête bombée, composée de cinq orbes, à clavicule blanche, espèce qu'on doit regarder comme une variéré de celle que M. d'Argenville appelle Radix à feuillages noirs *, & qu'on *Arg.append. peut nommer le Radix à pointes noires.

375. Une grande Pourpre rameuse des Indes, rare, blanche, veinée & fasciée de couleur de rose, à bouche & grand umbilic aussi couleur de rose, de sorme ventrue, à tête assez élévée, & à neuf rangs longitudinaux de seuilles plus ou moins grandes, repliées en pointe dans les deux premiers orbes.



GENRE SECOND.

Pourpres A Queue plus étroite,

376. NE Pourpre des Indes, couleur de VIII. FAM., chair, marbrée de noirâtre, de brun & de blanc, Pourpres. à stries sines circulaires, à trois grosses côtes longitudinales, & à trois rangs intermédiaires de petits tubercuses, à bouche couleur de rose, & à très-longue queue, nommée Tête de bé
* Arg. pl. casse *, très-grande dans son espèce, & de la sellett. B. plus belle conservation.

, pl. 78.

377. Une grande Tête de bécasse, à queue moins longue que la précédente, & deux petites en pendant, blanches, nuées & tachées de sauve, à stries sines circulaires, à tête applatie, bordée d'une strie plus saillante, à clavicule en mammelon couleur de chair, & qui n'ont ni côtes, ni tubercules, comme l'espèce précédente.

378. Idem.

379. Une Pourpre des Indes, blanche, veinée de fauve, à trois côtes longitudinales chargées, dans toute leur longueur, d'épines fines ou arrêtes, longues, pointues & recourbées, à queue longue, creusée intérieurement en canal, espèce nommée en France la grande Bécasse épineuse * . & en Hollande l'Araignée ; elle est VIII, FAM. grande & très-bien conservée.

380. Une Bécasse épineuse, de même espèce, 16. lett A. Séba, pl. 78. fauve-clair, moins grande que la précédente.

381. Une autre, gris-cendré, un peu moins grande encore.

382. Cinq Pourpres; sçavoir, quatre Bécasses épineuses, d'espèce moins rare que les précédentes, dont deux des Indes, grises, nuées de fauve, à épines moins nombreuses & moins longues, mais du reste semblables à celles de l'article 379 *; & deux d'Amérique, blanches, veinées de fauve, à épines plus courtes & plus séba, pl. 72. grosses, à queue sourchue & recourbée dans no. 4. son milieu. La cinquieme est une grosse Tête de Bécasse de l'espéce déja décrite.

383. Six Pourpres; sçavoir, deux Têtes de Bécasse d'Amérique, l'une de moyenne grandeur, & fauve nué de verdâtre, l'autre petice & marron clair, toutes deux à robe rétrculée, & à côtes un peu épineuses *; & quatre Bécasses épineuses comme celles de l'article pré- tab. 26. litt. P. cédent, à cela près que celles des Indes sont blanches.

384. Une grande Pourpre des Indes, rare, blanche, à stries circulaires légérement granuleuses, à fix côtes longitudinales un peu applaties, chargées de deux rangs circulaires de

204 COQUILLES UNIVALVES.

grandes épines, celles d'en-haut plus fortes. & VIII. FAM. les autres moins, à deux rangs obliques de pe-Pourpres. tites épines sur la queue, à tête applatie, & à lévre intérieure saillante en dehors, espèce qu'on

* Seba, pl. nomme la grande Massue d'Hercule *.

385. Une Massue d'Hercule un peu plus grande que la précédente, mais à queue & épi-

#Ibid.nº. 8, nes moins longues à proportion *-

386. Sept Massus d'Hereule, dont six par pendans; sçavoir, quatre de la Méditerranée, fauves de diverses nuances, dissérentes des précédentes, en ce que la tête en est plus élevée, qu'elles n'ont chacune qu'un rang d'épines sur la queue, & qu'outre les deux rangs du premier orbet, elles en ont un troisieme sur les deux or-

*Guat. tab. bés suivans *; l'une d'elles conserve son operso. litt. F. Rumph. tab. cule; deux d'Amérique, peu communes, sau-26. n°.). ves, nuées de gris & de blanc, qui dissérent de celles-ci, en ce qu'au lieu d'épines, elles

*Ibid. n°.4. n'ont que des tubercules terminés en pointes *; & une petite de la Méditerranée, fauve & rare, en ce qu'elle a sur le corps trois rangs d'épines, mais semblable du reste aux premieres de cet article.



NEUVIEME FAMILLE.

Tonnes ou Conques sphériques.

E sont des Coquilles à peu de volutes, rarement tuberculeuses, de sorme IX. FAM. TONMIS.

très-renssée, à bouche large & évasée,
ordinairement dépourvue de dents, à
tête petite ou peu élevée, dont elles
sont même quelquesois entiérement
privées. Leur bouche est entière ou
échancrée, ou garnie d'une petite queue,
ce qui nous sournit leur division en
trois genres, qui sont,

- 1º. Les Tonnes à bouche entiere.
- 2°. Les Tonnes à bouche échancrée.
- 3°. Les Tonnes à bouche garnie d'une petite queuc.



GENRE PREMIER.

TONNES A BOUCHE ENTIERE.

387. LIUIT Tonnes par pendans; sçavoir, fix différentes par leurs marbrures, mouchetures TONNES. & nuances, à coque mince, de forme ovale, à bouche évalée vers le bas, & à tête creusée en dedans en spirale en sorme d'umbilic, espéce * Gualt. tab. qu'on nomme la Muscade ou la Noix *; & deux blanches nuées de fauve, de forme encore plus Séba , pl. 38. oblongue, à stries fines circulaires, & à bouche m*. 34·38. fort évalée vers le bas, nommées Oublies ou Papier roulé, toutes deux grandes dans leur * Bonan. cl. espèce *. 3. f. 3. Lift. tab. 714. 288. Dix Noix de mer de moyenne grandeur; scavoir, deux blanches, de sorme approchante de la sphérique, à stries circulaires très-fines, à coque papyracée, & à bouche débordant les deux extrémités du corps, variété Arg. pl. nommée la Bulle d'eau *; deux Muscades mou-17. lett. Q. chetées l'une fauve & gris, l'autre fauve & Séba, pl. 38. rouge - brun, & à deux petites zônes bleu-* Ibid. nº. foncé *; deux autres Muscades nuées & mouchetées de fauve, d'amaranthe & de couleur 41 & 43.

* 161d. a. de chair *; deux autres nuées d'olive. mar-

89 K 42.

brées par bandes longitudinales de bleuâtre, de forme plus oblongue, & à bouche plus IX. FAM.

Étroite que les précédentes *; & deux Oublies * Gualt. tab.

couleur de paille. Plus, deux petites Tonnes 12. litt. F.

Bouan. cl. 3.

papyracées, à larges zônes gris de lin, féparées fg. 3. alura, les unes des autres par de petits cercles noirs.

389. Vingt-deux petites Tonnes, scavoir, une rare, blanche, fasciée par zônes de taches rouges quarré-long, à stries circulaires bien prononcées, à tête un peu élevée, à petite bouche, & à lévre intérieure armée d'une dent; une peu différente de la précédente, non moins rare, à cordons circulaires fort serrés, semés de petites taches quarrées alternativement blanches & noires, & à deux petites zônes blanches, espéce qui vient de l'Isle de France, où on la nomme Pistache *; Quatre Pistaches un peu plus petites, à taches blanches & grises 392. f. 54moins marquées; deux Muscades rares, papyracées, à robe blanche, rayée de petits cercles ondés-bruns *; deux rares encore, aussi papyracées, à larges zônes alternatives blan- 38. nº. 49. ches & couleur de rose, séparées les unes des autres par de petits cercles bruns; quatre Bulles d'eau blanches papyracées *; fix Oublies blan- * Gualt. table ches papyracées *, & deux Muscades de la va-13. litt. D. riété des cinquieme & sixieme de l'article précédent.

GENRE SECOND.

TONNES A BOUCHE ÉCHANCRÉE.

TONNES.

290. LEUX très-grandes Tonnes couleur de noisette, umbiliquées, à tête peu élevée, à lévre extérieure unie & mince, & à pas des orbes creusés en forme de fillon, dont une à grosses & petites fascies circulaires, celles-ci placées dans les cannelures de celles-là; & l'autre à grandes cannelures sans petites fascies intermédiaires *.

Gualt. tab. 42. litt. A.

391. Deux autres moins grandes, dont une rare, fauve, à petites cannelures, & à larges fascies, tachées par chevrons quelquesois en zig-zag de blanc, de gris & de marron de diverses nuances *; & une comme la premiere deux grandes de l'article précédent, à la lévre extérieure Coq. de l'ancoq. de l'an-gauche près, qui est bordée d'une espèce d'excrescence

du baut de la milée. pl. 69.

392. Trois autres un peu moins grandes; scavoir, deux en pendant de l'espèce de celles de l'article 390; & une blanche *, à larges can-

deux

* Thid. les nelures, & à fascies ornées de taches fauves deux grandes Coq. au def. quarrées, également distantes les unes des aufous de celles tres.

citées dans la 393. Quatre autres par pendans; sçavoir, pl. 69.

deux à fasoies peu larges, sauves, & à larges
cannelures blanches; & deux fauves à fascies IX. FAM.
larges & applaties, à cannelures étroites, umbiliquées, & de l'espéce nommée Perdrix *, * Arg. pla
dont une à taches blanches uniformes sur touGualt. pl. 524
tes les sascies, & une autre plus rare à cinq lett. E.
zônes intermédiaires, où ces taches sont disposées par intervalles beaucoup plus larges.

394, Quatre Tonnes; sçavoir, une blanche tachée de sauve de l'espéce de la premiere de l'article 391; une comme la derniere de l'article 392, mais à cannelures plus larges, chargées chacune de trois shies; & deux Perdrix de la variété de la preniere de l'article precédent.

395. Trois jolies Tonnès; sçavoir, une toute blanche, à fascies disposées comme dans la premiere de l'article 390, mais dissérente en ce qu'elle est à tête plus élevée, à clavicule marton, à lévre extérieure retroussée en bourrelet, & chargée en-dessous de plusieurs paires de dents; une qui ne dissére de la précédente que par ses cannelures simples & par cinq larges zônes sauves qui se perdent à quelque distance de la lévre extérieure; & une qui dissére de la dernière de l'article 392, en ce que sa lévre extérieure est un peu retroussée & dentelée.

396. Huit petites Tonnes par pendans; sçavoir, deux blanches marbrées de jaune-pâle & Tome I.

de fauve, à fascies circulaires un peu arron? IX. FAM. dies. à cannelures peu profondes. à lévre ex-TONNES. térieure saillante & convexe en dehors, & ar-

* Arg. pl. mée, ainsi que l'intérieure, de grosses dents *: 27. lett. L. Gual, 14b, 11. deux Perdrix, dont une fauve foncé, à petites Séba, la taches grifes *, & l'autre entiérement blanche; Coquille du deux comme les premieres de l'article 393, de la pl. 69. mais de couleurs moins vives, & deux comme

* Arg. pl. la derniere de l'article précédent *. 17. lett. C.

397. Deux très-grandes Tonnes en pendant, à robe lisse, canelle, à tête applatie, dont les trois premiers orbes, à pas concaves, sont couronnés de clouds tuilés, & les trois derniers faillent de la couronne intérieure en forme de mammelon, à bouche fort évasée, espèce nommée en Hollande Gondole mammillaire . & en

* seba, pl. France Couronne d'Ethiopie *.

61. n°. 1 & 2. 308. Deux Couronnes d'Ethiopie, moins Gualt. tab.29. grandes & de couleur un peu plus foncée que litt. H. les précédentes. & à deux rangs seulement de

* séba, pl. spires couronnées *.

lice. I.

399. Deux Couronnes d'Echiopie en pen-Gualt tab. 29. dant, & peu communes; elles différent de l'esp'ce précédente, en ce qu'elles sont marbrées par grandes taches blanc de lait & canelle foncé, flottantes dans deux larges zônes; elles ont deux rangs de spires couronnées comme

* Seba, pl. celles de l'article précédent *. 65. 2°. 12.

400. Deux antres petites & non moins rares,

fauves, à taches brunes disposées en deux 2ônes, & à une seule spire couronnée *. IX. Fait.

401. Cinq petites Tonnes; sçavoir, trois Tonnes.

Couronnes d'Ethiopie, dont une canelle à large 65. a. 10.

zône du milieu moins foncée, & à une seule s. 4.

spire couronnée *; une à zône blanche nuée de * Arg.

fauve, & la troisieme marbrée de blanc & de 17. lett. F.

marron; ces deux dernieres ont un gros mammelon & un commencement de couronne; une rare, paille nué de jonquille, qui ne disfére des Couronnes d'Ethiopie, qu'en ce qu'elle est plus oblongue, plus mince, sans couronne, & que le mammelon, qui en est plus gros, y est sormé d'un seul orbe, variéré qu'on nomme Prépuce, & un Prépuce qui ne disfére du précédent qu'en ce que le pas de sa spirale en est un peu concave *.

res, en pendant, à robe marron-clair, marbrée dans trois zônes, & par chevrons, de taches blanches, à fix révolutions de spire, se recouvrant l'une l'autre, & dont les cinq dernieres composent un mammelon sort élevé, peu différent de la clavicule du Prépuce*.

403. Une grande Gondole mammillaire peu 3. f. 1001 commune, couleur de tuile, à trois rangs de larges taches brunes, disposées par zônes, de forme très-rensiée, & à mammelon peu saile * 136799: n°

* Lift, tab; 799. n°. 6. Séba, pl. 64; n°. 5 66

* Bonan: kl

404. Quatre Gondoles; sçavoir, une mam= IX. FAM. millaire fauve-roux foncé, à quatre orbes, dont TONNES. les premiers sont séparés par un fillon très-* séba, pl. profond *; une sans mammelon, veince de F64.11°. 3. blanc, de fauve & de gris de lin, à extrémité de la lévre un peu sinueuse vers le haut, nom-Filidaples, mée Tasse de Neptune *; une blanche à pas du premier orbe saillant en dehors en vive arrête. concave en-dessus, & à très-petit mammelon, espèce qu'on nomme à Paris Cuiller de Nep-"Ibid, no tune *, & une Couronne d'Ethiopie de la variété de celles de l'article 398.

405. Deux très-grandes Gondoles, ventre de biche, sans mammelon & même sans tête. mais dans le sommet desquelles un prolongement de la lévre extérieure se replie sur l'intérieure, & y forme une espéce de petit umbi-Lift. rab. lic *. On a enlevé une portion du dessous d'une de ces Gondoles, pour en faire voir le dedans.

292, £, \$,

406. Une Harpe très - rare, marbrée par zônes inégales, de rouge-pâle tirant sur l'aurore, de brun & de blanc, à un grand nombre de côtes longitudinales laissant entr'elles des cannelures très-profondes; ces côtes se prolongent vers le haut dans tous les orbes, formant au bord du premier, qui est un peu concave, une espéce de couronne de petits tubercules, & se terminant vers le bas à un bourrelet qui

407. Deux grandes Harpes peu communes Tonnes.
en pendant, à quinze côtes étroites, rayées de pend. Pl. 2a traits en zig-zag blancs & bruns, placées à diftances égales, & laissant entr'elles de larges cannelures petit gris: c'est la belle Harpe, ou le Harpa nobilis de M. d'Argenville*.

* Arg. 2'.

408. Deux autres Harpes en pendant, à quatorze côres plus larges & plus inclinées que celles des précédentes, marbrées, ainsi que les cannelures, de traits ou chevrons couleur de rose, fauves, blancs & marron, à large zône intermédiaire un peu plus soncée, & à deux grandes taches brunes en-dessous *.

409. Deux autres, l'une à douze, l'autre à 70.
Bonan, cl. 3 des précédentes inégales ; elles différent d'ailleurs f. 185.
des précédentes, l'une par ses couleurs moins soncées, l'autre par des chevrons plus nombreux, placés les uns près des autres en zigzag, & par des stries longitudinales mieux pro-

410. Neuf Harpes, dont six très-variées par leurs marbrures & leurs couleurs; une de l'espéce de celles de l'article 407, & deux dont on a enlevé les cannelures & conservé les côtes, ce qui met leur columelle à découvert.

411. Six Tonnes par pendans; sçavoir, deux grises à stries circulaires, à grand nombre des

fascies étroites, sormées de petits quarrés longs
IX. FAM, alternativement blancs & violet soncé, à large
bouche & à lévre intérieure tirant sur l'aurore,
espéce qu'on nomme en Hollande le Rodolphe,
& en France Conque Persique ou Pourpre de
Arg. pl. 17. Panama*; deux grises à stries sines circulaires,
lett E.
Séba, pl. 72. cules, ressemblantes d'ailleurs à la Conque Persien. L.
Séba, pl. 72. cules, ressemblantes d'ailleurs à la Conque Persien. 10.

* Gualt. tab. fique, & à bouche aurore-vis *; & deux autres
11. liet. A.
List. tab. 988.
de même espéce, couronnées de plus gros tubercules, & dont la tête est recouverte de

glands de mer.

412. Deux très-grandes Conques Persiques à polies, de la variété des deux premieres de l'article précédent, & d'un très-grand éclat.

413. Treize Tonnes, dont douze par pendans; sçavoir, deux orangées, marbrées par zônes inégales de blanc, à stries circulaires un peu rabotteuses, de forme oblongue, & à tête

* séba, pl. presque conique *; quatre Conques Persiques †3. lett. T. d'Amérique, dont deux grandes & deux petites à fascies tuberculeuses violettes plus nombreuses, à robe un peu marbrée de blanc, & à bouche de même couleur que le fond : c'est la Mûre

Arg. pl. 17. de M. d'Argenville *; deux à fascies légérelett. H.

Aist. tab. 989. ment tuberculeuses, dont les taches sont alterf. 49.

nativement blanches & marron, & à bouche

 leuses plus prononcées *; & une petite fort IX. FAM.

jolie, dont les marbrures blanches, noires & TONNES.

* Scha, pl.

jaunes imitent le point d'Hongrie.

52. n°. 13 &

& des espéces ci-dessus décrites; sçavoir, deux grandes Oublies, deux Prépuces de la variété du dernier de l'article 401; deux d'une autre variété plus renssée*, desquelles on a enlevé une * List tabé portion de la base, pour en faire voir la colu-796. f. j. melle; une Cuiller de Neptune, deux grandes Harpes, & deux Conques Persiques qui ne différent des premieres de l'article 411, que par de petites sascies blanches moins interrompues de taches violettes *.



GENRE TROISIEME.

TONNES A BOUCHE GARNIE D'UNE PETITE QUEUE.

415. I ROIS Tonnes; sçavoir, deux blan-IX. FAM. ches nuées de couleur de chair, à robe réticu-Tonnes. lée, à tête applatie & de forme un peu allongée,

*Gualt tab. nommées Figues blanches *; & une blanche ac. litt. M.
séba, pl. 68. nuée de jaune, à stries circulaires qui ne sont bien prononcées que vers la queue, qui est étroite & un peu contournée, à coque mince, renssée de corps, umbiliquée, & à tête platte,

* Arg. pl. 17. espéce nommée le Radix *.

Séba, pl. 68,

416. Quatre Tonnes par pendans; sçavoir; deux fauve-clair nué de gris, à stries circulaires, dont trois plus grosses & tuberculeuses, à tête un peu élevée, à pas applatis couronnés de tubercules, & séparés par un petit sillon, à co-

* Lin ub. que épaisse umbiliquée *, & qu'on peut regarder comme une autre espéce de Radix; & deux Figues blanches plus grandes que les précédentes.

417. Trois Tonnes; sçavoir, deux Figues bariolées de gris, de jaune-pâle & de brun, à quatre zônes plus blanches, à rézeau très-fin & très-serré, & à bouche violette, ce qui les a fait nommer Figues violettes *; & un Radix à coque mince de l'espéce de celui de l'article IX. FAM. 415.

418. Un beau Radix plus grand que les pré- 17. lett. O cédens. à stries fines circulaires s'étendant sur no. s.

toute sa robe, & à queue couleur de rose.

419. Trois Figues; sçavoir, deux peu communes; à coque plus épaisse & à queue plus longue que les précédentes, dont une blanche nuée & flambée de jaune, à stries fines circulaires, à pas applatis, bordés d'un cordon dentelé, & séparés par un fillon; une qui ne différe de la précédente que par ses flammes plus foncées, & par ses pas un peu moins applatis, dépourvus du bord dentelé *; & une qui différe de celles de l'article 417, en ce qu'elle 19 & 20. est à bouche blanche, à rézeau mieux prononcé, à robe grise nuée de jaune, & marbrée par grandes taches de brun-roux.



DIXIEME FAMILLE.

V + S.

X. FAM. grand nombre de spirales, de forme conique très-effilée, à bouche petite, oblongue ou arrondie, & à tête fort élevée. Elles sont ou lisses, ou suberculeuses, & se divisent ainsi naturellement en trois genres, qui sont:

- 1°. Les Vis lisses.
- 2º. Les Vis striées.
- 3°. Les Vis tuberculeuses.



GENRE PREMIER.

VIS LISSES.

420. LUX grandes & belles Vis, fond = blanc, à zônes obliques suivant la spire, à rai- X. FAM. son de deux par chaque révolution, & formées de taches brunes nuées de rougeâtre, inégales entr'elles, qui représentent quelquesois des caracteres, à bouche un peu oblongue & échancrée, espèce qu'on peut nommer Vis à caracteres * : c'est le Cloud de M. d'Argenville.

421. Deux très-belles Vis à caracteres de se litt. I. grandeur moyenne, & semblables aux précé- no. 6. Arg. pl. 114 dentes, à cela près que les taches de chaque lett. A. révolution de spire y représentent des caracteres mieux formés.

422. Deux très-belles Vis de forme fort effilée; sçavoir, une trés-grande à vingt-deux révolutions de spire, blanche, à deux rangs de taches brunes sur chaque révolution *; & une moins grande & moins effilée qui en différe en- Gualt. 126.16. core en ce que chaque révolution de spire s'y litt. B. amincit dans le tiers le plus élevé de sa hauteur, & est chargée de trois zônes de taches, toutes deux de l'espéce nom-mée Vis sigrées *.

423. Deux très-belles Vis peu communes,

* Séba , pl; 56. De. 17.

X. FAM. Vis. de couleur fauve, à dix-sept révolutions de spire, dont la moitié supérieure est un peu renflée & chargée d'une zône de taches blanches, rondes dans l'une, ovales dans l'autre *.

* Rumph. tah-30.litt.D. Séba, pl. 56. 2°. 13.

- 424. Quatre Vis; sçavoir, deux rares couleur de chair, à dix-sept révolutions de spire, flambées de traits longitudinaux blancs, excepté dans la partie supérieure qui est un peu rentrante, & sorme une espéce de ruban de la couleur du sond; & deux Vis tigrées de la vaziété de la premiere de l'article 422.
- 425. Six Vis par pendans, dont deux de l'espéce des deux premieres de l'article précédent? deux à caraîteres, & deux tigrées.
- 426. Quinze Vis de moyenne grandeur & petites; sçavoir, quatre, dont deux blanches, l'une sasciée en zig-zag, & l'autre ponctuée de canelle, & deux bariolées de blanc, de sauve & de brun, toutes de forme un peu cylindrique, à bouche très-oblongue, & s'élargissant vers le bas, espéce nommée la Tarriere ou l'Ai-

*Arg. pl. 11. guille à coudre *; une blanche ponctuée de ca-List tab. 738. nelle dans le bas de chaque révolution, & de 6. 30 & 31. Arg. pl. forme effilée, nommée le Poinçon *; une en-21. lett. Q. core plus effilée, à lignes longitudinales oran-

*Ibid. let. z. gées, nommée l'Alène *; deux blanches à une large zône bleu-foncé, quelquefois interrompue,

* 566a, pl. régnant vers le haut de chaque révolution de 56. n°. 35 cc spire *; une à révolutions de spire un peu ren-

Aées vers le haut, où elles sont pointillées de marron. & à taches longitudinales de même X. FAM. couleur dans la partie rentrante des spires qui. avec les points supérieurs, imitent les caracteres Hébraïques; deux tigrées, deux à caracteres, & deux de l'espéce des premieres de l'art. 424.

GENRE SECOND.

VIS STRIÉES.

427. VINGT-QUATRE Vis strices; sçavoir, deux marbrées de gris & de lilas, à douze orbes bombés diminuant proportionnellement, & chargés chacun de petits bourrelets longitudinaux qui se raccordent & tiennent ensemble d'un orbe à l'autre, comme dans la Scalata, sans cependant laisser de jour entr'eux, comme dans celle-là *, à laquelle ces Vis ressemblent * voy. l'art. d'ailleurs, ce qui les a fait nommer fausses Sca- 55 des Con de la:a*; deux fausses Scalata blanches de nos que. mers*; deux autres petites d'Amérique, lie de 3. f. 111. vin obscur; une autre aussi d'Amérique, grise 188. £ 51. nuée de blanc, & à stries plus en vive arrête que celles des précédentes; une plus petite, blanche, à moins de révolutions, & fort ventrue; deux fausses Scalata de l'espèce des secondes de cet article, à orbes découpés, &

X. Fant. VIS.

dont il ne reste plus que les stries, ce qui permet d'en voir l'intérieur; & quatorze Vis par pendans, de l'espèce nommée Enfant au maillot, dont deux rares d'Amérique, blancs, de forme cylindrique & bombée, à stries en forme de rides sur le premier orbe seulement, à bouche garnie de deux dents, à lévre extérieure retroussée en dehors, umbiliqués, & grands dans cette espéce; deux rares de forme courte & renslée, & à bouche dépourvue de dents; deux de forme un peu plus allongée, à bouche Lift. tab. garnie de deux dents ; deux encore plus

19. nº. 21.

188. f. 47.

1 Ibid. f. 48. longs 2; deux à stries plus nombreuses & moins Ibid. f. 49. prononcées 3; deux de nos mers 4; & deux rares des Indes, lisses & blancs, à trois larges bandes bleues, à bouche dépourvue de dents, & qu'on nomme plus particuliérement Vis à tête tronquée.

428. Une Vis des Indes, marron-brun, à stries circulaires bien prononcées, à stries longitudinales fines en forme de rides, & à base presque platte, espèce nommée en Hollande la Bouée, en France le Télescope, & grande dans Arg. pl. 11. cette espéce 5.

Séba, pl. 50.

429. Une Vis des Indes, brune nuée de fauve & de verdâtre, à révolutions de spire chargées chacune de trois stries circulaires & de plis longitudinaux qui les rendent onduleuses, à lévre extérieure fort évalée & un peu retroussée en dehors, espéce nommée à Paris la Cuiller à pot: celle-ci porte cinq pouces de long, & est d'une X. FAM. belle conservation *.

- 430. Une autre Cuiller à pot un peu moins so. n°. grande que la précédente.
- 431. Un Télescope, & une Cuiller à pot de moyenne grandeur.
- 432. Une très-belle Aiguille des Indes de plus d'un demi-pied de long, marron s'eclaircissant de plus en plus depuis le bas jusqu'à la clavicule qui est blanche, à trente-quatre orbes bombés, chargés chacun de six stries séparées par de profondes cannelures, & à bouche presque ronde, nommée par Séba Aiguille faite en vis de tambour *.
- 433. Deux Aiguilles en pendant de l'espéce no. 12. de la précédente, mais de forme moit s allon-litt. A. Arg. pl 124 gée, de couleur fauve, & de vingt-trois orbes lett. D. feulement.
- 434. Une grande Vis blanche nuée de fauve. . à orbes chargés de stries circulaires très-fines, & de trois plus marquées, dont une très-saillante en vive arrête, à pas des orbes formant avec leurs voisins des angles rentrans, & à bouche semblable à celle des précédentes, espéce que l'on connoît sous le nom de Vis de presoir*.

435. Deux Vis de pressoir en pendant, moins 38. litt. B. grandes que la précédente, & qui en dissérent

X. FAM. VIS.

d'ailleurs, en ce qu'au-dessus de la grande arrête qui forme la sommité de chaque orbe, on y en remarque une seconde un peu moins forte. laissant entr'elle & l'autre une large canne-

* Arg. pl. 11. lure *.

lett. C. Gualt. tab. 58. litt. C.

436. Treize Vis, dont douze par pendans; scavoir, deux peu communes, & grandes dans l'eur espèce, nuées de blanc, de sauve & de bleu, à bouche oblongue, à révolutions de spires séparées chacune en deux par un fillon

de cannelures longitudinales très-serrées *; deux * Ibid. tab. 57. litt. N. List. tab. 837. f. 64.

marbrées de brun, de blanc & de fauve-roux, à stries circulaires grosses & fines, à révolutions de spires applaties & séparées par un léger sillon, à bouche presque ronde, & grandes dans

vers les deux tiers de leur hauteur, & chargées

4 Sualt. tab. 58. hir. E. Šćha, pl. 56.

leur espèce *; deux de forme à peu près semblable, à dix retours de spire, chargés chacun 20. 33 & 34. de trois cordelettes noires, séparces par des canne ures blanches; deux blanches de la variété de ce les de l'article 433; deux petites grifes de la même espéce; deux grifes nuées de fauve, qui n'en différent que par des stries plus

grosses au haut de chaque orbe *; & une Vis de pressoir de la variété de l'article 434, 591. tig. 56.

437. Vingt Vis de différentes grandeurs, dont seize par pendans; sçavoir, deux Aiguilles peu communes, à taches quarré-long, alternativement rouges & incarnates, à stries circu-

laires

laires traversées de hachures longitudinales qui les rendent granuleuses, & à révolutions de X. FALL spire, bordées chacune, tant en haut qu'en bas, d'une espèce de bourrelet *; quatre autres pe- *Rumph.mbi tites fond bleu ou verd de pavot, à révolutions de spire, chargées de stries longitudinales, & bordées dans le haut d'une zône blanche ponctuée de rouge-brun, espéce nommée le Perçoir ou le Foret *; deux couleur de chair, tachées *Arg. pl. 222 par zones d'aurore; elles différent des précé- lett. R. List. tab. 9794 dentes par leurs stries moins prononcées, & f. 36. par leur bordure de même fond que le reste; une de même espèce, dont les stries ne sont sensibles que vers la tête; deux à robe réticulée. aurore nuée de blanc; une couleur de chair de l'espèce des premieres de l'article précédent; deux de l'espèce des troisieme & quatrieme du même article, mais à stries circulaires plus sines: deux de même forme, blanc-sale, marbrées par traits longitudinaux de fauve-roux, à stries circulaires très-fines, & à deux grosses paralleles entr'elles sur chaque orbe *; une blanche de la variété de celles de l'article 433; deux petites 592. f. 604 de la même espèce, sauve teint de gris de lin, & une Vis de pressoir.

* Ibid. tah.



GENRE TROISIÉME.

VIS TUBERCULEUSES.

V1 s.

pendans; sçavoir, deux blanches bariolées de rouge & de bleu foncé, à stries circulaires, à douze orbes chargés de gros tubercules, à lévre extérieure épaisse & dentelée, & à petite queue*; & deux qui ne différent de celles-

* Gualt. tab. \$ 57. litt. G.
Lift.tab.1023. fig. 87.

Séba, pl. 50. nº. 15 & 16.

tite queue *; & deux qui ne différent de cellesci qu'en ce que la lévre extérieure en est mince, recourbée en dedans & sans dentelures.

439. Cinq Vis, dont quatre par pendans; fçavoir, deux blanches tachées & pointillées de brun, à orbes garnis d'un rang de tubercules, à lévre extérieure épaisse, & à petite queue retroussée, espèce que l'on nomme Chenille bariolée *; deux gris-de-fer, chargées de deux

* Arg. pl. 11. lett. H. Séba, pl. 50. P°. 37.

riolée *; deux gris-de-fer, chargées de deux rangs de tubercules, l'un sur le milieu de chaque orbe, l'autre vers le haut, à lévre extérieure moins épaisse, & petite queue moins retroussée que les précédentes, espèce nommée Chenille poire *; & une comme les premieres de l'arti-

*Gualt. pl. noire *; & une comme les premieres de l'arti-56. lett. L. Bonan. el. 3. cle précédent.

Bonan. cl. 3. Cle prece fig. 81. 440.

440. Quatorze jolies Vis de moyenne grandeur par pendans; sçavoir, deux marron-brun, à révolutions de spire, formées de cordons granuleux d'inégale groffeur, & nommées le Clocher ou l'Obélisque Chinois *; une qui différe X. FAM. des précédentes, en ce que le haut de chaque Vrs. orbe est couronné de tubercules blancs. & le lett. F. milieu ceint de deux stries granuleuses fauves, espèce qu'on nomme l'If*; un If marron-brun *Ibid.let.&c en enrier: deux Vis peu communes, marron, l'une clair, l'autre plus brun, à côtes longitudinales. & à stries circulaires quelquesois granuleuses, à bouche presque ronde, à lévre extérieure rensiée, très-saillante en dehors, & se repliant sur l'intérieure en avant de la petite queue qu'elle ferme en tuyau, ce qui la rend très-finguliere *; deux autres non moins rares, *Rumph.tab. fauve-noirâtre, réticulées, à huit orbes bom- 50. lit. T. bés. à bouche ronde échancrée, à lévre extérieure relevée en dehors en bourrelet. & à clavicule tronquée; deux blanches rériculées & granuleuses dans les angles du rézeau, à bouche ovale finissant par une petite queue retroussée, espèce qu'on peut nommer Chenille blanche réticulée *; deux fauve-grisarre, à stries circulaires granuleuses, & nommées Chenilles gra- 1020. f. 84. nuleuses *; & deux Chenilles bariolées.

441. Neuf Vis de moyenne grandeur, peu 1018. f. 80. communes; scavoir, une fauve, à douze orbes formés chacun de quatre rangs de stries granuleuses, à six côtes longitudinales granuleuses aussi, qui en rendent la forme approchante de

X. FAM.

celle d'une pyramide hexagone, à une couronne de tubercules plats sur le premier orbe, à bouche ronde & à lévre extérieure fort saillante, espèce nommée le Clocher Gothique: on en trouve l'analogue fossile à Courtagnon; un Clocher, verd-clair, à stries circulaires très-fines, à révolutions de spire, chargées chacune de huit gros bossages, à bouche ovale, & à lévre extérieure mince; deux blancs, tachés par zônes inégales de marron clair, à dix orbes bordés dans leur milieu de tubercules aigus. & séparés les uns des autres par de larges pas en doucine, de forme conique vers le bas, à bouche oblongue, & à lévre extérieure mince, échancrée vers le haut ; une Vis marbrée de marron, de blanc & de bleu clair, à côtes longitudinales. & stries fines transversales formant un rézeau, à bouche oblongue, à lévre extérieure échancrée en haut & en bas, & dentelée; trois blanches, dont une marbrée de fauve, à stries circulaires. à dix orbes tuberculeux. & à bouche semblable à celle de la premiere de cet article: & une blanche à stries circulaires granuleuses, à neuf révolutions de spire, concaves vers leur milieu. & bordées vers le haut de cercles tuberculeux plats, à un rang de petites côtes longitudinales sur le premier orbe, à lévre extérieure échancrée vers le haut, & à umbilic.

442. Neuf Vis peu communes, dont huit par pendans; sçavoir, deux blanches à quinze ré- X. FAM. volutions de spire, couronnées de plis longitudinaux peu saillans, à bouche oblongue finissant par une petite queue retroussée, grandes dans leur espèce. & nommées Chenilles blanches *; deux fond blanc, à révolutions de spire, tachées Gnalt. vers le bas de couleur de chair, entre deux cer. 17. litt. D. cles ponctués de même, & couronnés vers le F. 83. haut de petits tubercules, à bouche oblongue & échançrée dans le bas *; deux d'Amérique, blanches, à vingt retours de spire concaves, seine chargées dans leur milieu de fétulles inclinées, bordées en haut & en bas d'une cordelette, & séparées par un sillon, à bouche presque ronde, & qu'on peut nonmer Vis feuilleurs; deux Vis feuilletées blanches, tachées & fasciées de fauveroux; & une blanc de lait, très-rare, assez semblable de forme aux précédentes, dont elle differe en ce qu'on apperçoit, au lieu de feuilles, des enfoncemens irréguliers qu'on croiroit faits à coups de marteau, ce qui lui peut faire donner le nom de Martelée *.

443. Quatorze Vis, dont dix par pendans; 583. f. 53. fçavoir, deux Chenilles granuleuses blanches, nuées & tachetées de brun-roux, & à stries circulaires très-sines entre les stries granuleuses *; * séba, pl. une marron obscur, de forme essiée, à révolu-51. n°. 26. tions de spire, composées chacune de trois petits

X FAM.

cordons granuleux; deux fauves de l'espèce des Chenilles noires; une de même forme, mais à tubercules plus allongés; une Chenille bariolée; une Chenille blanche; deux Chenilles blanches récipulées; deux Ifs, & deux grandes Tigrées, des orbes desquelle les interstices ont été enlevés pour mettre à jour la columelle & la rampe un peu concave qui tourne autour.



ONZIEME FAMILLE.

VOLUTES.

Nous rangeons sous ce nom toutes = les Coquilles dont les spires compri- XI. FAM. mées & roulées les unes sur les autres. se terminent d'un côté en une tête applatie ou peu élevée, & forment de l'autre tantôt une pyramide plus ou moins conique, ce qui constitue le genre des Cornets, & tantôt une espéce de cylindre, ce qui constitue celui des Rouleaux. Toutes ont une bouche étroite & longue; mais, dans les Rouleaux, la lévre intérieure est ou cachée en dedans comme celle des Cornets. cas où nous les appellerons simplement Rouleaux, ou cette lévre se montre en dehors, & est alors garnie de dents avec une échancrure vers le bas, ce qui caractérise les Rouleaux proprement dits, appellés Olives. Nos trois genres de Volutes font donc, Piv V

- XI. FAM. 1°. Les Volutes coniques, ou Cor-
 - 2°. Les Volutes cylindriques, ou Rouleaux.
 - 3°. Les Volutes échancrées, ou Olives.

GENRE PREMIER.

Volutes coniques, ou Cornets,

444. Un Cornet des Indes, très-rare, blanc nué de couleur de rose, à deux larges zônes orangées, & à grand nombre de petites du fond, tachetées de rouge-brun, à stries fines, à tête élevée, & à pas un peu concaves, connu sous le nom d'Amiral d'Orange, & grand dans

* Arg. Ap- son espèce *.

pend. pl. 1.

445. Un autre Amiral d'Orange, de couRumph. tab. leurs plus foncées, de forme plus oblongue, &

54. litt. A.

56ba, pl. 48. 1 pas moins concaves quo le précédent.

2.7.

446. Un Cornet marbré de larmes blanches sur un sond rouge-brun, & à trois larges zônes jaunes, dont une sur le haut du corps, l'autre en bas, & la troisseme au milieu; celle-ci est divisée en deux par une bandelette de la mar-

brure du fond : on nomme cette Coquille XI. FAM

XI. FAM,

447. Un Amiral de même espèce que le précédent.

* Arg. pl. 11. lett. N. 6ćba, pl. 48.

448. Un Amiral de même fond & marbrure, no. 3. & à trois larges zônes jaunes comme le précédent; il en différe seulement en ce que celle d'en haut est suivie d'une autre petite zône de même couleur, & que celle du milieu est chargée de deux bandelettes, dont une de la marbrure du sond, & l'autre sormée de simples traits bruns, ce qui met cette Coquille dans l'espéce de celles qu'on nomme Amiraux à deux bandes *.

lbid. nº. 44

449. Un Cornet de même fond & marbrure que les précédens, qui ne différe de l'Amiral de l'article 446, qu'en ce que la zône du milieu n'y est point chargée d'une bandelette; on le nomme Vice-Amiral*.

Arg. pl. 12.

450. Un Vice-Amiral de même espéce, mais lett. H.

451. Un Cornet des Indes, rare, de même fond & marbrure que les précédens, mais différent en ce qu'on n'y remarque que la zône jaune du bas, & un léger vestige de celle du milieu, ce qui pourroi ele faire nommer Amiral masqué.

451. bis. Un très-beau Cornet des Indes, rare, peu différent des précédens pour le fond & la marbrure, mais d'un volume beaucoup plus

XI. FAM. VOLUTES.

fort, à clavicule élevée, & à une zône de trois petites bandelettes de points vers les deux tiers de sa hauteur, nommé l'Amadis, & grand dans * Ar. App ·cette espèce *.

pl. I. lett. S.

452. Quatre Cornets; scavoir, deux d'Amérique, blancs nués de couleur de rose, à flammes longitudinales aurore, interrompues dans le milieu par une zône irréguliere du fond, à stries circulaires, & à pas des orbes un peu con.

68. D°. 26.

* Séba, pl. caves, nommés Amiraux d'Angleterre *; & deux des Indes, marron, marbrés de larmes blanches, sur-tout dans une zône près du milieu, à pas un peu concaves, & nommés Vice-Amiraux de Rumphius *.

4 Rumph, tab. 34. lit. F. Arg. App. pl.

453. Quatre Cornets; scavoir, un blanc de forme effilée, à stries circulaires peu prononcées, nommé le Bout de chandelle; un Amiral & Angleterre, & deux Vice-Amiraux de Rumphius, un peu moins grands que les précédens.

454. Un Cornet à robe ornée de zônes inégales, jaune clair, blanches & couleur de chair. marquetées de taches brunes, nommé en Hollande Volute de Guinée. & en France l'Aîle de Papillon; il est des plus grands de cette es-

* Arg. pl. 12. péce *.

455. Une Aile de Papillon, un peu moins Rumph. tab. 34. litt. G. Séba, pl. 48. grande & de couleurs un peu plus foncées. nº. 1-3.

456. Une autre, dont les zônes mouchetées font un peu moins larges.

457. Idem, à cela près que les zônes en sont = plus multipliées.

VOLUTES.

458. Quatre jolis petits Cornets par pendans; sçavoir, deux blancs, à deux zônes formées d'un réseau canelle très-fin, l'une large, firuée au haut du corps, & l'autre étroite, placée un peu au-deflous du milieu *; & deux Ailes * Arg. pl. 12. de Papillon.

Lift tab. 588.

459. Deux Cornets rares, à tête élevée, dont f. 41. un marron clair, marbré vers le haut par bandes longitudinales peu régulieres de blanc, & à une zone blanche ponctuée dans son milieu de même couleur que le fond, ce qui le peut faire sanger parmi les Amiraux; & un marron marbré par flammes longitudinales étroites de blanc. à petires fascies circulaires, dont les cannelures sont piquetées de très-petits trous.

460. Quatre jolis Cornets par pendans; sçavoir, deux peu communs, à tête élevée, à robe marion clair tirant sur le roux, marbrée de taches blanches nuées de bleu, & à deux zônes de même couleur, chargées de traits en zig-zag du fond, espèce nommée par quelques - uns faux Amiral de Guinée; & deux à pas des orbes un peu concaves, à clavicule élevée & alguë, à robe fasciée de trois zônes blanches, & de deux plus larges, intermédiaires, canelle, chargées les unes & les autres de bandes longitudi-

nales ondées pourpre foncé, & nommées Flam-XI, FAM. boyantes *.

VOLUTES. * Arg. pl. 12. litt. G.

46 1. Quatre autres des mêmes espéces; sça-1ett. T. Gualt, tab. 20. voir a deux faux Amiraux de Guinée, à tête un peu moins élevée, & à taches plus blanches; & deux Flamboyanus à bandes longitudinales plus fines, & à zônes moins larges que les précédentes.

> 462. Quatre autres des mêmes espéces; sçavoir, deux faux Amiraux de Guinée, dont un comme ceux de l'article 460, & un qui en différe en ce que le bleu domine davantage dans sa robe, qui est fasciée de deux larges zônes marron clair, marbrées du fond, & d'une petite zone blanche intermédiaire, toutes ponctuée de marron dans les parties de la robe, qui ne sont point de cette couleur; & deux grandes Flamboyantes, à zones brunes plus larges à proportion que gelles des précédentes.

> 463. Six Cornets des Indes par pendans, tous à tête élevée; scavoir deux pen communs, blancs marbrés de taches souci en sorme de nuages, à cercles légérement granuleux vers

* Séba, pl. le bas, & à spirale de dix orbes tuberculeux *; 44. n°. 20 & deux de forme à peu près semblable, fasgiés & tacherés de blanc, de verd de terrasse, & de rouge foncé, avec quelques cercles rougeacres presque imperceptibles; & deux Flamboyantes

à zônes brunes comme les précédentes, mais = dont les zônes blanches, sur-tout celle du mi- XI. FAN. lieu, ont un ou deux rangs de points bruns Volutes. plus ou moins distans les uns des autres.

464. Quatre Cornets rares des Indes & à tête élevée; scavoir, un blanc à grosses stries & profondes cannelures circulaires, chargées vers le haut de stries onduleuses très-fines. & à dix orbes, dont les pas sont un peu renflés, formant une seconde variété de l'espéce nommée Bout de Chandelle; deux blancs à deux zônes jaunes interrompues, dont celle d'en haut beaucoup plus large, à un grand nombre de cercles granuleux, & à dix orbes tuberculeux, nommés la Pean de chagrin *; & un à zônes alternatives inégales en largeur, les unes blanches, bariolées de rouge foncé & de bleu pâle, les autres vertes, chargées de quelques cercles légérement granuleux.

465. Six Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, blancs nués de bleu, à trois rangs de petites taches longitudinales vertes ondées, ponctués par zônes de marron clair, & à tête peu haute, mais dont s'éleve une clavicule très-fine *; deux blancs, *Rumph: tab. 32. litt. R. à deux zônes fauve clair, à stries fines & larges Séba, pl. 43. cannelures circulaires, & à bas du corps violet; nº. 32. & deux Flamboyantes.

466. Six autres par pendans; sçavoir, deux

MI. FAM. orangés, te réunissant quelquesois, & formant Volutes. des espéces de caracteres bizarres, à fillons cir-

* Lift. tab. culaires peu prononcés, & à coque très-mince *;

783. f. 30.
Rumph. tab. deux de l'espéce des deux premiers de l'article
précédent, mais un peu différens pour les couleurs; & deux Flamboyantes, des zônes de l'une
des quelles la moitié de dessus est rouge-brun,
& celle de dessous jaune.

orangés, à deux zônes, l'une de taches blanches dans le haut, l'autre toute blanche vers le bas, à quatre stries granuleuses au-dessus de cette derniere zône, & à pas des orbes un peu

4 Stha, pl. concaves *; deux de l'espèce des premiers de 42. n°. 40-42. l'article précedent; & deux Flamboyantes comme la derniere du même article.

468. Deux Cornets des Indes, très-rares & en pendant, blancs, à deux zônes de taches rouge-brun, celles d'en haut un peu déchiquetées, & à grand nombre de petits points de même couleur, rangés circulairement sur tout le corps & sur la spirale.

469. Neuf petits Cornets; sçavoir, un blanc à deux larges zônes orangé, & à trois bandes blanches, chargées chacune de deux rangs de points de la couleur du fond, mais dont celles du haut & du bas sont presque masquées, à pas des orbes un peu concaves, & qu'on peut ranger parmi les Amiraux 1; deux verds de diverses nuances, à stries longitudinales très-fines, XI. FAM. formant avec les transversales, qui sont mieux VOLUTES. prononcées, une espèce de rézeau, à tête ap- 14 nº. 11 & platie, à clavicule aiguë, & à dix orbes tuberculeux; deux qui peuvent se rapporter aux deux premiers de l'article 458, mais différens, le premier, en ce que les mailles du rézeau des zônes y sont plus grandes, le second, en ce que le rézeau s'y étend presque sur tout le corps : deux de l'espèce de ceux de l'article précédent; une Aile de Papillon, & un Amiral d'Angleterre.

470. Douze petits Cornets par pendans; scavoir, deux à robe verd-de-terrasse & granuleuse vers le bas, violets en dedans, à spirale de dix cordons tuberculeux. & nommés en Hollande Fromages verds; deux de même espéce, mais dépouillés, dont la moirié supérieure du corps est devenue violet couronné de blanc, & la moitié inférieure est restée verd de terrasse; deux blancs, marbrés par zônes de taches quarré-long orangé vif, & nommés en Hollande Nattes d'Italie 2; deux blancs à taches 2 Ibid. pl. 556 irrégulieres souci, disposées par zônes, & ponc-nº.4-10. tués de même dans les intervalles; deux blancs à trois zônes de taches larges un peu oblongues, violet foncé, à stries granuleuses dans le bas, & à spirale chargée de taches semblables,

espèce nommée l'Hébraïque : ; & deux blancs XI. FAM. marquetés par zônes de petites taches quarrées VOLUTES. noirâtres 2.

lett. G. 471. Trois Cornets, dont deux d'Amérique Gualt. tab. 15. en pendant, blancs, à un grand nombre de cer-List. tab. 779. cles ponctués de souci, & à deux zones de bandes

List. tab. longitudinales, larges & irrégulières, de même 7,4-f. 20. couleur, à pas des orbes un peu concaves, & tachés de même que le corps : & un Fromass.

tachés de même que le corps; & un Fromage verd dépouillé, marbré par larges bandes longitudinales de fauve & de gris nué de violet, à une zône partie blanche, partie violette, fituée dans le milieu du corps, & très-grand dans l'espéce.

472. Douze petits Cornets; sçavoir, cinq variétés d'Hébraïque, dont une comme celles de l'article 470; une qui en dissére par ses taches rouge-brun; une dont les taches du premier rang sont longues & ondées, & celles du second rang ne sont au contraire que de simples points sort distans les uns des autres; une couverte presque en entier de taches longitudinales ondées, violet-noir, & à cannelures circulaires; & une qui dissére de cette derniere, en ce que les taches en sont interrompues dans le haut & vers le milieu par deux petites zônes blanches; une Cornet couleur de chair, à une

Jibid. f. 26. Dianches ; un Cornet couleur de chair, a une Gualt, tab. 15. zône blanche au-dessous du milieu, à stries cir-litt. Q.

culaires, à tête élevée & tuberculeuse; un blanc = bariolé de canelle foncé, à deux zônes de mê- M. FAM. me, & à pas des orbes un peu concaves; deux VOLUTIS. Nattes d'Italie, une très-jolie Flamboyante à zones jonquille, & deux comme les derniers de l'article 470.

473. Trois Cornets des Indes, peu communs; sçavoir, deux blancs à trois zônes fauves peu prononcées dans l'un, à flammes longitudinales brunes, étroites & ondées, striés vers le bas & dans toute la spirale *; & un blanc couvert en * Gnate rate entier de points orangés, gros & petits, dispo-25. litt. S. sés par zônes nombreuses, à stries circulaires tres-fines, à pas des orbes un peu concaves, & à clavicule élevée, espèce qu'on pourroit nommer Cornet ponctué.

474. Un très-grand & beau Cornet des Indes, souci, tacheté par zônes de points rougebrun, à tête applatie, formée d'orbes un peu bombés, & tachetés de lignes ondées de même couleur, à clavicule aiguë, & nommé Pelotte on Tine de beurre *.

475. Deux Tines de beurre, moins grandes 44. nº. 1-4. Rumph. tab. que la précédente, l'une paille à points plus 32. lin. C. distans & moins nombreux, & l'autre jonquille foncé à raches plus grandes.

476. Deux Cornets des Indes en pendant, Pun fauve clair, rayé transversalement, & fort serré de brun, à tête applatie & clavicule aiguë,

Tome L

XI. FAR. & une Tine de beurre de moyenne grandeur,

YOLUTES.

* Arg. pl. jaune pâle, & rare en ce que les cercles de

22. lett. A.

Rumph. tab. points y sont fort près les uns des autres.

477. Deux grands Cornets des Indes, peu scha, pl. 34. communs, l'un aurore, l'autre marron clair, tous deux cerclés de raies fines plus foncées, femblables à celles du Minime, ornés vers le bas d'une zône blanc-sale, affez large, & d'une

* Thid no a autre plus étroite dans le haut *.

& 1.

Valentyn univalent deux blancs à zônes formées de grandes & petites taches irrégulieres, d'espéces de caracteres, de lignes interrompues & de points rougebrun, nommés Spectres, & grands dans leur

4 Arg. pl. espèce *; & deux Minimes.

479. Quatre autres par pendans; sçavoir, n°. 14 & 25. deux rares bleuâtres, à grand nombre de zônes Gualt tab. 11. formées de lignes interrompues ou traits rouge - brun qui se répondent mutuellement en longueur, & à une zône blanche dans l'un, qui ne paroît point dans l'autre, à tête applatie, ta.

* Séba, pl. bleus *; & deux Spectres moins grands que ceux st. nº. 5. de l'article précédent, & de dessein un peu différent.

480. Quatre Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc nué de couleur de chair & de bleu pâle, à

chetée d'amaranthe, & qu'on nomme Minimes

grandes taches verd soncé, étendues sur la robe en forme de nuages, dans deux zônes interrom-XI. FAM. pues; & un verd soncé, à une zône de taches VOLUTES. blanches nuées de bleu, & quelques autres taches semblables vers le haut, tous deux â tête applatie, couronnée de tubercules, à clavicule élevée, & à quelques stries circulaires granuleuses peu prononcées *; & deux Spectres à * Séba, plu zônes de points plus nombreuses que dans les 44. n°. 16.

481. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux de l'espèce des deux premiers de l'article 471, mais dont un n'est composé presque en entier que de cercles ponctués de rouge-brun; & deux Tines de beurre de moyenne grandeur.

- 482. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux blancs nués & veinés d'orangé, en forme de filamens un peu onduleux, & à deux larges zônes brunes, dont la plus basse termine la Coquille, à tête peu élevée, & à révolutions de spire comme collées l'une contre l'autre, espéce nommée le faux Amiras ou Navet*; & deux *Arg. pl. 124. qui ne dissérent des deux premiers de l'article séta plus qu'in qu'en ce que leurs taches & leurs points no le l'article séta plus qu'in de couleur brune.
- 483. Un Cornet des Indes de cinq pouces quatre lignes de long, blanc, à deux larges zônes jonquilles, interrompues du fond, & cerclé dans les intervalles de traits, de taches &

de points plus ou moins gros de même couleur,

à tête applatie, & nommé la Spéculation*.

VOLUTES.

* Séba, pl.
45. nº. p.
Gualt tab.22.
lir. R.

484. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux Navets, différens de ceux de l'article 482, en ce que les deux premieres révolutions de spires, au lieu de se trouver dans le plan des suivantes, s'en retirent en spirale, particularité qu'on remarque rarement dans les Volutes; & deux Spéculations de moyenne grandeur.

485. Trois Cornets des Indes; sçavoir, deux en pendant, jaune-roux, marqués vers le haut, à la tête, & dans une zône du milieu, de taches blanches, à tête peu élevée, à pas des orbes un peu concaves, striés circulairement, & à pointe brune un peu recourbée, nommés Aumusses *;

* Séba , pl. 44. nº. 8-11. Gualt. tab.11. litt. E.

& une grande Spéculation, remarquable en ce que certains de ses cercles, sur-tout ceux d'en haut, paroissent formés d'une suite de caracteres, parmi lesquels on distingue des A, des X & des Y très-bien formés.

486. Deux très-beaux Cornets des Indes, blancs, cerclés de plusieurs rangs de points, de traits & de taches rouge-brun, imitant des caracteres, fasciés dans les intervalles de cordons jonquille pâle, dont quelques-uns sont aussi ponctués de rouge-brun, nommés fausses Atles de Papillon, & des plus grands de cette es-

Arg. pl. péce *,
Séba, pl. 44.
487. Cinq Cornets de moyenne grandeur;
nº. 5.

scavoir, une faussa Aile de papillon, deux Spéculations, un Navet, & une Tine de beurre.

488. Deux grands Corners des Indes en pendant, blancs, à taches violet foncé, de forme à peu près quarré-long, distribuées par zônes, à tête platte, & nommés Damiers *.

* Séba , plo

489. Quatre grands Cornets; (cavoir, deux Guale, tab.as Damiers en pendant, une Aumusse, & un Na-YEE.

490. Quatre autres par pendans; scavoir. deux Damiers ornés chacun de trois zônes jaunes, sur lesquelles les taches noires ne s'étendent pas moins que sur le fond, & nommés pour cette raison Damiers à bandes; & deux Aumusses qui différent dans leur marbrure des précédentes *.

491. Quatre Cornets des Indes par pendans; 47. sçavoir, deux noirs parsemés de grandes taches blanches, à peu près triangulaires, à tête applatie. à pas des orbes concaves & légérement tuberculeux, espèce nommée Tigre noir *; & deux Damiers à bandes jaunes, nués de cou-12. litt. D. leur de chair.

- 492. Quatre autres comme les précédens, à cela près que les bandes de l'un des Damiers font jonquille tendre.
- 493. Deux très-grands Tigres noirs en pendant, dont quelques-unes des taches blanches

246 COQUILLES UNIVALVES

XI. Fam: tre ondées & dentelées.

494. Un très-beau Tigre, dont le fond est jaune-orangé, & qu'on nomme par cette rai-

*Arg. pl. 12. son Tigre jaune *.

pendans; sçavoir, deux Damiers à bandes jaunes, deux Tigres noirs, rares en ce que les taches y sont moins sréquentes, sur-tout vers le

* Ibid. no haut *, & deux Spéculations.

496. Dix Cornets de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux Tigres d'un roux-noir, rares en ce que les taches blanches ne paroiffent que dans deux zônes, ce qui les a fait

* Ibid. n° nommer Amirales par quelques Hollandois *;

8 6.

* Arg. pl. 12. un Tigre à fond roux, appellé Tigre rouge *;

lett O.

un Tigre jaune; deux Damiers à bandes jaunes;

deux Tines de beurre. & deux Naues d'Italie.

497. Six Cornets par pendans, sçavoir, deux Damiers à bandes jaunes; un Tigre noir, remarquable par une petite bandelette jaune, située vers le haut, & interrompue par les taches; un Tigre rouge & deux Aumusses.

498. Deux Cornets d'Amboine, rares, même dans le pays, blancs, couverts dans tout le corps d'un dessein de traits recourbés jonquilles, laissant entr'eux des taches du fond en forme d'écailles, & à tête applatie, chargée de taches

*5864, pl.43. quarrées de même couleur que les traits *.

400. Deux grands & beaux Corners blancs = à pointe violette, à tête peu élevée, où les ré- XI. Fam. volutions des spires ne sont marquées que par VOLUTES. des traits, espèce nommée en Hollande la Mennonite, & en France l'Onix, le Cigne ou le Cierge blanc *.

500. Deux Cierges blancs en pendant, un 47. nº. 3. peu moins grands que les précédens.

ar. liet. E. Lift. tab. 754.

* Seba, pl.

501. Deux grands Cornets en pendant, fig. 2. blancs, cerclés dans toute leur longueur de lignes interrompues, & de points noirs, quelquefois verds ou fauves, chargés de plus de deux larges fascies vertes & fauves, à tête applatie & couronnée de crenelures qui vont en diminuant jusqu'au sommet, ce qui leur a fait donner le nom de Couronnes impériales *.

502. Deux Couronnes impériales en pendant, lett. F. Séba, pl. 47. un peu moins grandes que les précédentes, & na. 18-20. Rumph. tab. 34. litt. H.

un peu différentes en nuances de couleurs. 503. Deux autres moins grandes.

504. Deux Couronnes impériales de moyenne grandeur, rares, & qui ont cela de particulier que leurs zônes, verd de terrasse soncé, sont comme déchiquetées, cerclées de lignes rougeâtres, & que les intervalles des déchiquetures sont ponctués de rouge-brun *.

* Ibid. lit. I.

505. Six Cornets, dont quatre par pendans; scavoir, un Cierge ventre de biche clair, nommé le Cierge jaune; une Couronne impériale;

248 COQUILLES UNIVALVES

🖿 deux Damiers à bandes, & deux Tigres noirs.

XI. FAM. VOLUTES.

506. Un très-gros Cornet, rare, blanc, bariolé de petites lignes fauves, se joignant de diverses manieres en sorme de sils de toile d'araignée, à deux zônes de taches marron soncé, à tête peu élevée & chargée de petits tubercules, nommé en Hollande la Toile d'Araignée, & en

* Arg. App. France l'Esplandian *. pl. 1. lett T.

507. Un semblable qui peut servir de pendant au précédent.

508. Un autre un peu moins grand.

509. Deux autres en pendant.

5 10. Deux Esplandians différens des précédens, en ce que le rézeau en est moins serré & brun-clair, & qu'ils offrent jusqu'à trois zônes brun-foncé.

par pendans; sçavoir, deux verd-jaunâtre, à deux zônes blanches, l'une en haut, l'autre un peu au-dessous du milieu, bordées l'une & l'autre de taches no res oblongues & un peu obliques, mais qui, dans celle d'en haut, s'étendent sur tous les orbes de la tête, qui est platte, & dont le fond est blanc aussi, espèce nommée séba, pl. Queue d'hermine*; deux semblable, à ceux-ci,

* Séba, pl. Queue d'hermine *; deux semblable à ceux-ci, 42. n° / 31 & à cela près que les taches des zônes y sont plus nombreuses & moins régulieres, que le sond en est de plus chargé, dans les intervalles des zônes, de cercles ponctués bruns, & que la forme en est plus rensiée, variété nommée simplement XI. FAM. Hermine *; deux Tigres rouges, & deux Da-Vou miers à bandes.

512. Dix autres par pendans; sçavoir, deux Séba, pl. 416 orangés, à quelques taches blanches dans le Lift. tab. 780. haut, à une zône de même au-dessous du milieu, plus prononcée dans l'un, & moins dans l'autre, à stries granuleuses dans le bas, & à tête peu élevée, marbrée du fond & de blanc *; deux Hermines, deux Minimes, deux Damiers 44à bandes & deux Tigres noirs; plus un Cornet coupé en deux transversalement, pour faire voir les révolutions intérieures des spires.

. . .

513. Dix autres Cornets, dont huit par pendans; scavoir, une Couronne impériale, un Cierge jaune, deux Damiers à bandes, deux Hermines, deux Tigres noirs & deux Flamboyantes.

514. Tieize Cornets des Indes; sçavoir, un paille à stries circulaires très-fines, orangé foible, à une zône blanche peu prononcée, & à clavicule élevée, nommé la Fileuse *; deux *Gualt. tals blancs marbrés par grandes taches longitudi- 20. litt. B. nales irrégulieres marron, à tête peu élevée, & légérement striés vers le bas *; un violet à deux zônes blanches, l'une en haut, l'autre au mi-tab. 32. lit. Q. lieu, à tête applatie & clavicule peu élevée *; un jaune clair à une zône blanche dans le mi- 42. n°. 39.

250 COQUILLES UNIVALVES.

XI. FAM. Volutes.

lieu, & à tête platte; un jaune foncé, à trois zônes blanches, l'une large en haut, l'autre très-fine un peu plus bas, & la troisieme au-dessous du milieu, à tête platte & blanche, tachetée de marron; un de l'espèce des deux derniers de l'article 470; un comme les deux premiers de l'article 466; un comme ceux de l'article 468, un faux Amiral de Guinée; une Flamboyante, & deux Hermines.

515. Vingt-fix petits Cornets; sçavoir, deux

verd de terrasse, marbrés par taches longitudinales interrompues de blanc, à pas des orbes séba, pl. tuberculeux, & nommés Papiess marbrés ; deux blancs à petites cannelures circulaires & à tête peu élevée; deux citron, & deux souci, à tête platte & clavicule peu élevée; un marron teint de bleu, à deux zônes étroites blanches; un gris nué de bleu, à deux zônes blanches & à tête platte; & les seize autres des variétés déja décrites, entr'autres, un Vice-Amiral de Rumphius, un Tigre jaune, une Queue d'her-

516. Quarante petis Cornets fort jolis, des espéces déja décrites, très-variés dans le dessein, la forme & les couleurs.

pour en faire voir l'intérieur.

mine, une Hermine, deux Navets & deux Nattes d'Italie; plus un petit Cornet coupé en deux

GENRE SECOND.

VOLUTES CYLINDRIQUES, OU ROULEAUX.

517. DEUX très-grands Rouleaux des Indes, : blancs, à raies longitudinales en zig-zag, brunes XI. FAM. & rouge-sanguin, se joignant fréquemment les unes aux autres, & laissant entr'elles quantité de petits vuides du fond en forme d'écailles ou de cœurs, & chargés de plus de trois larges zones jonquille, ce qui les a fait nommer Drap d'or fascié *.

518. Un très-grand & beau Drap d'or fascie, lett. I & un de même espèce, dépouillé, devenu par- no. 14 & 15 là du plus beau blanc.

519. Deux Draps d'or fasciés, moins grands que les précédens, mais qui ne leur cédent en rien pour la beauté.

520. Deux Rouleaux qui ne différent des précédens qu'en ce que les taches jonquilles n'y sont point jettées tout-à-fait par zones, & qu'on nomme par cette raison simplement Draps d'or *.

521. Trois beaux Draps d'or, dont un rare, setta, pl. 47. différent des précédens, en ce que le fond en 20.16 & 17. est bleu, que les zig-zags y sont nombreux,

292 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM. qu'on nomme Drap d'or à fond bleu; & deux, Volutes. dont un à bandes, de forme plus renflée & plus courte, mais d'ailleurs semblables à ceux des

* Séba, pl. articles précédens *.

522. Six Draps d'or par pendans, formant trois autres variétés; sçavoir, deux à fond bleu, mais moins chargés de cette couleur que les précédens, & à trois zônes mieux prononcées; deux Draps d'or ordinaires, à rézeau moins ferré, & à taches blanches, plus grandes que dans ceux de l'article 520; & deux de forme très-allongée, dont le rézeau fort serré ne laisse paroître en certains endroits que de très-petits points blance *

тым. pl. points blancs *.

A7. a°. 13.
Rumph. tab.
523. Trois grands Draps d'or, dont deux à peu près semblables à ceux de l'article 530; & un de la derniere variété décrite dans l'article précédent, mais à rézeau moins serré.

524. Un grand & rare Rouleau fond blanc, à rézeau jaune foncé, & à grandes taches de même couleur, répandues principalement en deux zônes, de forme un peu renssée par le haut,

* Ibid. ub. & nommé Drap d'or de la Chine *.

525. Un grand Rouleau de la Chine, peu commun, fond jonquille marbré de taches blauches, à stries fines circulaires, de forme oblon-

* Arg. pl. gue & effilée, à tête un peu élevée, & nommé st. lett. D. Séba, pl. 43. Drap orangé *.

m. 4 & 5.

fond moins vif, à taches plus fréquentes, & à XI. FAM. VOLUTES. * Séba, pl

527. Six Rouleaux par pendans, peu communs; sçavoir, deux blancs à stries circulaires
chargées à distances égales de points rouge
soncé qui se répondent aussi en longueur, à taches longitudinales orangé brun, & de sorme
essilée, espèce nommée Drap d'or piquesé de la
Chine *; deux Draps orangé à taches blanches, * Mss. tal
petites & peu nombreuses, & à grand nombre 741. fig. 35de bandes longitudinales étroites orangées sur
un sond jonquille; & deux Draps d'or à sond
bleu.

528. Deux rares & jolis Rouleaux en pendant, fond blanc nué de bleu, marbrés l'un par taches longitudinales ondées, l'autre par taches disposées en deux zônes de verd foncé nué de marron, & cerclés de plus de fines zônes & de points rouges-bruns, à tête élevée, & nommés Tulipes *...

529. Deux Rouleaux; sçavoir, un rare, fond \$\frac{43.}{56ba}, pl. 48.
gris de lin, teint de blanc & de bleu, marbré \$\frac{n^2}{35} \text{ \$\frac{40.}{60.}\$}\$
par trois larges zônes & par bandes longitudinales de fauve roux nué de verd, & cerclé comme les précédens \$\frac{4}{30.}\$; & un fond blanc, par \$\frac{4}{30.}\$ lett. \$\frac{8}{30.}\$
lett. \$\frac{8}{30.}\$
lett. \$\frac{8}{30.}\$
plus serrées dans deux espèces de zônes, espèce

254 COQUILLES UNIVALVES .

nommée Pique de mouches, ou Drap d'ar-

XI. FAM. gent*.

VOLUTES.

* Arg. pl. 530. Huit jolis Rouleaux par pendans; sça
13. lett E.

Gualt. tab.25.

Bit. O.

& à deux zônes de même couleur, nommés

* Arg. pl. Omelette *; deux blancs un peu tachés de bleu, à grandes taches longitudinales verd foncé, interrompues par une zône blanche peu prononcée dans l'un, tous deux cerclés, fur-tout vers le bas, de traits & de points bruns, à tête affez élevée, terminée par une clavicule couleur de

chair, espèce nommée la Nébuleuse ou les Nua-* Séba, pl. ges *; deux Tulipes & deux Draps d'argent.

531. Six Rouleaux peu communs; sçavoir, deux rouge-sanguin, nué de rouge plus clair & de gris de lin, légérement marbrés, l'un princi-

palement dans une zone du bas, l'autre par bandes longitudinales ondées & en zig-zag de

4 Ibid. pl. blanc *; deux blancs nués de bleu & de gris de 43. n°. 34. * Ibid. n°. diverses nuances *; & deux, dont un brun nué 55. de gris de lin, & un bariolé des mêmes couleurs,

tous de l'espèce nommée Papier de la Chine.

532. Un très-grand Rouleau des Indes, marron, à fuites ou traînées longitudinales, transversales & obliques, de taches blanches, en

*Arg. pl. 13. forme d'écailles, laissant entr'elles de grands els séba, pl. 47. paces du fond, espéce nommée Brunette *. n°. 10.

Rump. tab. 533. Deux grandes Brunestes en pendant,

dont une peu commune à fond canelle & à taches plus larges, l'autre fond rouge-brun, à XI. FAM. VOLUTIE.

534. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, deux Brunettes de forme plus effilée *; & deux .* stba, pl. Draps d'or.

535. Trois Rouleaux; sçavoir, deux en pendant, blancs nués de couleur de chair, à grandes taches en sorme de nuages, sormées d'un assemblage de raies brunes ou bleu soncé, à tête peu élevée, dont les orbes sont concaves & marbrés comme le corps, nommés l'Ecorchée*, & très-grands dans leur espèce: & une Bruneute.

* Arg. pl.
13. lett. C.
Séba, pl, 47.
n°. 12 & 23.
Rumph. tab.

536. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, 31. lin. P. deux Ecorchées un peu moins grandes que les précédentes, & deux Brunettes.

537. Six Rouleaux par pendans; sçavoir, deux Ecorchées dissérentes des précédentes, en ce que l'une n'a qu'un petit nombre de taches brunes, en forme de slammes longitudinales distribuées en deux zônes, & que la seconde est bariolée de taches noirâtres, déchiquetées en forme de lambeaux, à deux zônes près, où elles sont plus larges; deux Draps d'or & deux Draps d'argent.

538. Deux grands Rouleaux de l'Isle de France, en pendant, gris de lin nué de couleur de chair, à bandes longitudinales de taches

256: COQUILLES UNIVALVES

rouge - brun, en forme de rézeau, & à deux XI. FAM. zônes de grandes taches de même couleur, à tête applatie, à pas des orbes tuberculeux, & à coque mince, espèce nommée le Brocard de Arg. pl. soie*.

13. lett. A.

Scha, pl. 42. 539. Quatre Rouleaux par pendans, dont

no. 1-3.

List. tab. 747. deux Brocards de soie & deux Ecorchies.

бg. 41.

540. Quatorze Rouleaux par pendans; sçavoir deux blancs, pointillés sur tout dans deux zônes, & par bandes longitudinales ondées de points bruns, à côtes longitudinales peu prononcées, à pas des orbes tuberculeux, & nom-

*Arg. pl. 13. més Moires *; quatre autres, dont deux marlett. S. Séba, pl. 55. brés de blanc & de souci, & deux de marn°. 1. Gualt. tab.25. ron & de violet, tous les quatre ceints du haut litt. P. jusqu'en bas de traits & de points bruns, variété

* Séba, pl. nommée le Taffetas *; deux Nuages, deux 42. n°. 16 & Ecorchées, & quatre Draps d'or, dont deux fasciés, & deux de la variété des derniers de l'article 522.

541. Seize autres, dont quatorze par pendans; sçavoir, deux petits verd soncé, ceints de traits alternativement bruns & blancs, & à une petite zône blanche vers le bas, deux petites Brunettes rares, en ce que les traînées de taches blanches y serpentent dans quatre bandes longitudinales régulieres; un Drap d'or jonquille, marbré dans trois bandes longitudinales & trois zônes de blanc teint de gris de lin, & veiné

veiné du fond; trois autres Draps d'or, dont un à fond bleu, & deux de la variété de l'arti- X. Fam. cle 520; deux Taffetas de la premiere des deux Voluties. variétés de l'article 540; deux Draps d'or piquetés de la Chine, deux Nuages & deux Moires.

GENRE TROISIEME.

VOLUTES ÉCHANCRÉES, OU OLIVES.

542. DE UX Olives des plus rares, en pendant, blanches, ponctuées de gris, semées çà & là de traits transversaux brun-soncé, la plúpart en zig-zag, à plis longitudinaux peu prononcés, à carne circulaire peu saillante vers le tiers de la hauteur, à petite tête, dont les spires sont creusées en gouttiere, à lévre extérieure applatie en dehors, & intérieure couleur de chair. Cette Coquille ne se trouve pas même dans les Cabinets de Hollande.

543. Trois Olives des Indes; sçavoir, une couleur de chair, à bandes longitudinales on-dées, & un peu en zig-zag, orangé ombré de bleu pâle, & à tête élevée *; une verd céladon, * Arg. pl., ornée dans toute sa robe de chevrons couchés 13. lett. 9. violet noir, imitant le point d'Hongrie, à petite tête, dont les premieres révolutions rentrent

Tome I.

l'une dans l'autre, & nommée en Hollande Drap X. FAM. mortuaire 1; & une verd de terrasse, semée de VOLUTES. 1 Rumph. quelques zig-zags violet-noir, & à tête ap-

Lift. tab. platie 2.

737. f. 29.
Séba, pl. 53.
lett. a.

544. Deux grandes Olives de la mer du Sud,
couleur de chair nué de bleu, couvertes d'un
grand nombre de traits orangé-brun, qui, defcendant d'abord de la tête en forme de cheve-

cendant d'abord de la tête en forme de chevelure, se prolongent ensuite dans tout le corps en divers zig-zags plus ou moins grands & serrés, laissant des intervalles triangulaires du sond à peu près comme dans les Draps d'or, à tête peu élevée & à pas des orbes creusés en sillon, espèce nommée Porphyre ou Olive de Pana-

⁹ Arg. pl. 13. ma ³.

Gual. tab. 24. litt. P.

545. Deux Olives de Panama, un peu moins grandes que les précédentes.

546. Quatre Olives par pendans; sçavoir, deux grandes jaune pâle, marbrées de traits longitudinaux en zig-zag bruns, & à trois sascies de taches de même couleur, à tête élevée, à pas des orbes creusés d'un prosond sillon, &

⁴Arg. pl. 13. légérement dentelés, & à bouche aurore vif 4; ⁵Éba, pl. 53. deux Olives de Panama de moyenne grandeur. lett. A. B.

Gua.t. tab.24. Litt. O.

547. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux comme les premieres de l'article précédent, & deux qui en différent par leur marbrure

3. Séba, pl. plus brune, & leur bouche blanche 5.
3. lett. C. D.
Rumph. tab.
548. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux

blanches, teintes par traits longitudinaux & en zig-zag de ventre de biche, à une zône blanche XI. Fam. volutes. dessous, qui se termine à l'échancrure de la bouche, de sorme renssée, ainsi que le haut de la lévre intérieure, & à tête blanche peu élevée; deux de même espéce, mais dépouillées, & dont la robe est devenue par-là marron soncé, bariolée de blanc; mais la zône, la fascie & la tête sont restées blanches *; deux ventre de biche *Arg. pl. x clair, ornées d'un dessein en rézeau violet pâle, lett. M. List. pl. 723-plus soncé dans deux espéces de zônes, & deux sig. 200- de la variété des dernieres de l'article précédent.

549. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux très-brunes, appellées Moresques ou Négresses *; * Séba, ph deux jaune-souci, dont une tirant un peu sur le verdâtre *; deux blanches, & deux dépouil-lées, de la variété des premieres de l'article précédent.

deux peu communes, teintes de gris & de verd de pavot dans les deux tiers de leur hauteur, & noisette dans le reste, de sorme essilée, & à tête très-élevée *; deux blanches tachetées de sauve * 11st. tab. & de lilas, à tête peu élevée, & à carne cir-722. séba, pl. 53. culaire peu saillante vers le tiers de leur hau-lett. P. Q. teur *; deux verd d'olive, marbrées s'une par * Gualt. tab. taches en zig-zag peu nombreuses, l'autre par * Séba, pl. 53. litt. L. Séba, pl. 53.

R ij

zônes interrompues de brun obscur, à quelques XI. FAM. côtes longitudinales peu prononcées & à tête

VOIUTIS. applatie *; deux blanches marbrées par traits *Séba, pl. obliques & en zig-zag de cannelle & à tête éle-

*Ibid.let.Y. vée *; deux nuées de verd céladon & de jonquille, marbrées de violet, & du reste sembla-

Gualt. tab. 1

bles aux précédentes *; deux de l'espèce des premieres de l'article 548, dont une dépouillée, deux Négresses & deux olivâtres.

551. Onze Olives peu communes: sçavoir, deux blanches à bandes longitudinales en zigzag cannelle; une de même couleur, mais à simples traits en zigzag cannelle soncé; une blanche presque entiérement recouverte de grands traits longitudinaux, verdâtres, nués de jaune, à tête élévée, à pas des orbes plats, & à une strie oblique en vive arrête dans le bas; une verd céladon clair, à espèce de slammes transversales lilas & noisette; une gris de lin à trois zônes vertes, dans les intervalles desquelles est un dessein en treillis de même couleur *;

* Séba, pl \$3. lett V. une gris verdâtre, & une verd de terrasse, tachées dans deux zônes de violet noir; une Négresse, & deux grandes de la variété des dermieres de l'article 547.

552. Dix Olives des Indes, d'une belle grandeur & d'un très-beau choix.

553. Trente-six petites Olives par pendans; sçavoir, deux jonquilles ponctuées par compar-

timens de brun, & à bouche violette *; deux àpeu-près semblables, mais de couleur plus fon-XI. FAM. cée, de forme plus oblongue, & 2 points distribués moins régulièrement *; deux de forme 23. litt. T. bombée, blanches, semées de petites taches peu 721 £ 7. apparentes gris de lin, à deux zônes brunes dans l'une, cannelle dans l'autre; deux de forme àpeu-près semblable, blanc-verdâtre, à traits en zig-zag, & grandes taches longitudinales brun obscur *; deux blanches ornées de traits en zigzag violet foncé, & à bouche rouge-brun; 735. £ 25. deux blanches bariolées de traits, le plus souvent en zig-zag gris de lin; deux blanches nuées de ventre de biche, terminées par une large zône orangée; deux couleur de chair pâte, bariolées de traits fauves en forme de chevrons : deux, dont une blanche & une verte, fasciées debrun obscur; deux bariolées de gris & de verd foncé, à deux larges zônes brunes, & lévre intérieure orangée *; deux blanches nuées de ci- 4séba, pl. s. tron, marbrées dans trois zônes interrompues lett. O. de verd de pavot; deux grises nuées de jaune pâle, chamarées de traits en zig-zag verds, imitant le point d'Hongrie; deux Négresses; deux gris de souris : deux blanches : deux blanches poncuées de bleuâtre, à une large zône de même couleur dans le haut ; deux comme les neuvieme & dixieme de l'article 550: & deux blanches marbrées de cannelle clair. & du reste

3 Ibid. rahi

XI. FAM. VOLUTES.

semblables aux troisieme & quatrieme de l'article 548.

554. Trente-neuf petites Volutes échancrées: scavoir, une blanc de lait, à tête élevée formée de six orbes en doucine granuleux, teints d'orangé; une blanche de forme bombée, à stries circulaires, & à six orbes reticulés & granuleux; une blanche tachée par zônes & par bandes longitudinales de fauve - roux, de forme moins bombée, mais du reste semblable à la

28. litt. O.

* Gualt, tab., précédente *; une petite de même espéce, mais de forme très-essilée; une peu commune blanche, ceinte de diverses zones de très-petits points verds se répondant exactement en longueur d'une zône à l'autre, à lévre extérieure en bourrelet, & jaune d'or, ainsi que le haut de l'intérieure, qui est armée de très-grosses dents, à tête se confondant avec le corps, & à petite * Lift. tab. clavicule jaune *; quatre autres de forme à-peu-

803. fig. 11.

Sualt tab. 28.

lict. D.

litt. I.

près semblable à la précédente, dont deux blan-* tbid. f. s. ches fasciées de petites zones orangé *, & deux

ponctuées par compartimens de même cou-* List. 126. leur *; deux blanches marbrées de brun de di-Gualt. tab.28. verses nuances, à trois grosses fascies circulai-

res, & à fix côtes longitudinales, tuberculeuses * Lift, tale dans les points où elles se croisent *; & vingt-791. f. 44. Gualt. tab. 22. huit Olives par pendans d'un joh choix.

DOUZIEME FAMILLE.

PGRCELAINES.

Ce sont des Coquisses de forme ovoide applatie en dessous, ne montrant que Porcelai, peu ou point de spirales. Leur bouche NES. oblongue est plus ou moins étroite, & nous servira à les divises en deux gentes; sçavoir,

- 1°, Les Porcelaines à bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'à l'une des deux lévres.
- 2°. Les Porcelaines à bouche plus étroite, en forme de fente, dentée des deux côtés.



GENRE PREMIER.

Porcelaines a bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'a l'une des deux lévres.

XII FAM. PORCELAI-NES.

blanche, à lévre extérieure en bourrelet, & dont les extémités se prolongent en deux longues avances c'eusées en gouttiere, nommée Navette de Tisseand, & grande dans cette es-

* Arg. pl. pece *.

Lift. tab. 711. f. 63. Séba, pl, 55. n. 14.

556. Deux Porcelaines en pendant, papyratées, blanches tant en dessus qu'en dedans, & dont les extrémités ne se prolongent que peu en dehors: dans l'une, la lévre extérieure se recourbe un peu en dedans, tandis que celle de l'autre, qui paroît être du premier âge, finit en tranchant: toutes deux rares & grandes dans leur espèce, nommée l'Œuf papyracé.

557. Deux Porcelaines en pendant, plus grosses que les précédentes, dont elles différent d'ailleurs en ce que la coque en est plus épaisse, la lévre extérieure renssée & dentée en forme

Arg. pl. 18. de rides, & le dedans orangé: variété que l'on List tab. 711. nomme simplement l'Œus.

Ginali, tab. 15. 558, Sept Porcelaines peu communes: sça-

voir, une petite papyracée blanche nuée d'incarnat, formant une seconde variété de Na- XII. FAM. vette plus effilée que la précédente *; deux blanches. à un pli en forme de bosse vers le milieu du corps, à extrémité des lévres couleur de 711. fg. 66. rose, au-dessus desquelles sont deux boutons ou verrues, & à lévre extérieure garnie de dents, espéce nommée la Boffue*; deux blanches nuées d'aurore, à un anneau très-saillant sur le 18. lett. M. milieu du corps, & à bouche dépourvue de s. 67. dents, autre variété de Bossues, nommée Bossus, nommée Bossus, autre variété de Bossus, nommée B sue sans dents, & deux Œufs papyraces des * Arg. pl. deux variétés de l'article 556. Lift. tab. 711.

559. Trois Porcelaines peu communes : sça-f. 64. voir, deux marron, marbrées principalement no. 18. dans quatre zônes & vers la tête de taches blanches, à lévre extérieure en bourrelet, & garnie de dents, à petite bosse sur le dos, à coque mince, & à petite clavicule *; & un œuf de la va- * List tab. 675. 8. 83. riété de l'article 5 57.


560. Onze Porcelaines, dont dix par pendans : sçavoir, une grise nuée de bleu, mouchetée par zônes de grandes taches brunes & rousses de diverses nuances, à lévre extérieure tranchante, à coque mince, & à clavicule applatie; deux de forme plus oblongue & moins bombée, tachetées de fauve & de roux, & du reste semblables à la précédente *; deux fauves de forme encore plus al-748. f. 41 &

266 COQUILLES UNIVALVES

longée, & fasciées, l'une d'orangé, l'autre de XII. FAM. verdâtre; deux bariolées de gris & de brun, à PORCELAI- deux fascies gris de lin, à bouche violette, & à clavicule un peu elevée: c'est le Potan de M.

* List. tab. Adanson *; deux petites brunes de même espé-741. f. 37. Adans. Hist. péce ; deux mouchetées de canelle, de la vadu sén. pl. s. riété des premieres de cet article *. Plus, un a. r. list. tab. grand nombre de petites Porcelaines blanches, 749. f. 44. enfilées en façon de collier, toutes de la variété

Adanson, que M. Adanson a nommée le Falier, connue libid. pl. 5. aussi fous le nom de Monnoie de Guinée; & deux petites de même espèce, attachées ensemble, dont une a la bouche à gauche, & l'autre à droite, & forment ainsi l'Unique & la Contre-unique de cette espèce. Toutes les Porcelaines de cet article peuvent être rangées dans le genre que M. Adanson a nommé le Manteles.



GENRE SECOND.

Porcelaines a bouche plus étroite, EN FORME DE FENTE, DENTÉE DES DEUX CÔTÉS.

. 561. 7 EU X Porcelaines fauve pâle, ornées de traits longitudinaux, fins, serrés & hachés, XII. FAM. canelle, interrompus dans le milieu par une PORCELAIbande longitudinale ondée, d'où partent de côté & d'autre de petits rameaux, à taches rondes plus ou moins grandes vers le bas, & nommées Cartes Géographiques ou Mappemondes *; toutes deux grandes dans cette espéce.

Rumph, tab.

562. Quatre Porcelaines par pendans: sça-38. litt. B. voir, deux à coque mince, blanche nuée de gris de lin, à taches nombrenses brunes & rousses, à deux espéces de fascies, & à petite tête applatie *; & deux Géographiques moins grandes que les précédentes.

672. f. 18.

563. Deux très-grandes Porcelaines couleur de chair pâle nué de bleu, à taches rondes brunes & noires, à une bande longitudinale étroite & ondée tirant sur le jaune, à coque épaisse, & nommées Peaux de Tigre *.

Ibid. tab. 38. lis. A.

564. Quatre grandes Peaux de Tigre, dont Rumph. tab.

268 COQUILLES UNIVALVES

XII. FAM. PORCELAI-

. .

deux blanches, à taches plus petites & moins nombreuses: une à fond blanc teint d'orangé, & la derniere remarquable par une large tache rouge-brun sur le dos.

565. Quatre autres par pendans, dont deux à taches petites & nombreuses, & deux de la variété de celles de l'article 563.

566. Six Porcelaines par pendans: sçavoir, deux Peaux de Tigre, à large bande longitudinale blanche sur le milieu du dos; deux des variétés déja décrites; & deux de l'espéce des deux premieres de l'article 562.

567. Dix Porcelaines: sçavoir, deux fauvebrun parsemées de taches blanches, à deux fascies peu prononcées, & nommées Neigeu-* List. tab. ses *; deux brun soncé parsemées dans le milieu du corps de taches rondes à-peu-près égales, grises, & blanc sale, interrompues par une petite bande longitudinale de même couleur, à coque épaisse, & à base plate, espèce nommée * Ibid. tab. par Rumphius Porcelaine à tête de serpent *; une pes. s. sautre variété de cette espèce, recouverte en en-

703. f. 52. Rumph. tab. 48. litt. E.

par Rumphius Porcetaine a tete de Jerpent ; une autre variété de cette espéce, recouverte en entier de taches, à coque mince, & à base plate du côté de la lévre extérieure, mais arrondie de l'autre; deux fauves, marbrées de marron, à extrémités des lévres fort saillantes & applaties, s'enfonçant vers le bas dans l'intérieur de la Coquille, nommée le Lapin; un autre Lapin

* List. tab. la Coquille, nommée le Lapin; un autre Lapin gris-bleuâtre & à coque mince; & deux Peaux de Tigre.

568. Seize Porcelaines par pendans: sçavoir, deux peu communes fauve nué d'orangé, à tête XII. FAM. applatie & ensoncée, à lévre extérieure un peu PORCELAIfaillance vers le haut, à dos élevé, & à deux fascies presque imperceptibles *; deux marron clair & foncé, à deux zônes blanchâtres bien 670. f. 16. prononcées, à lévre extérieure tranchante dans lin. I. l'une, recourbée & dentée dans l'autre *; deux * List. ub. à large base, bariolées sur les flancs de blanc & de fauve clair, ayant sur le milieu du corps une large bande longitudinale blanche, tachetée dans toute sa longueur de brun-noir, espéce nommée le Léopard*; deux à bouche, base & bords du corps noir, à dos blanc teint de bleu ab. 39. lin. S. pâle, à une bande longitudinale fauve dans le milieu, & nommées Agates*; deux blanches, * Arg. pLis, teintes en quelques endroits de bleu pâle & de fauve-roux. à taches brunes peu nombreuses sur les côtés. & à cannelures des deux lévres aurore, espéce nommée Truitle*; deux fauves nuces de noisette, à trois larges zônes plus clai- 683. L 30. res que le fond, & à petite tête applatie; deux Neigeuses, & deux Porcelaines à tête de serpent.

560. Deux grandes Porcelaines de forme oblongue, marbrées par grandes taches de blanc & de brun, & dont la robe est en plusieurs endroits comme saupoudrée de blanc : on remarque sur le dos de l'une, quelques taches blanches & relevées, semblables à des gouttes do

suif figées : toutes deux sont de l'espèce nom-XII. FAM. mée Liévre 1, mais la seconde est appellée Lié-Porcelai- vre à gouttes de suif.

· Rumphtab. ; 8. litt. C.

570. Trois grandes Porcelaines, dont deux fauves nuées dans deux zônes & sur les côrés de petit gris, chargées de cercles grands & petits, canelle vif, & à deux grandes taches brunes sur chacune des lévres, espéce qu'on nomme le

Rumph.

Arg. pl. Grand Argus *; & une olivâtre chargée dans toute l'étendue de sa robe de taches rondes & tab. 38. litt. blanches, ou de taches brunes cerclées de blanc, & dans son milieu, d'une bande longitudinale plus claire que le fond, espéce nommée faux

Lift. tab. Argus * 699. £. 46.

571. Idem.

572. Trois Porcelaines, dont deux Argus de couleurs très - vives; & un faux Argus dépouillé, devenu par-là violet obscur.

573. Quatre Porcelaines, dont une rare, blanche nuée par intervalles de fauve ou de gris-bleu, ornée dans toute sa robe de traits souci, qui laissent un grand nombre de taches rondes ou polygones du fond, serrées les unes contre les autres, & à bande longitudinale de même couleur, espéce que l'on nomme Arle-

List. tab. quine *; deux qui ne dissérent de celle-ci, qu'en 659. tig. 51. ce que les traits qui sont entre les taches, y sont rouge-brun, jettés comme par hachures, la plúpart longitudinales, que les taches y sons par des hachures de même couleur que les XII. FAM.

par des hachures de même couleur que les XII. FAM.

taches, variété nonmée fausse Arlequine, & PORCELAIE

qui est très-bien représentée dans l'appendice de

M. d'Argenville *; toutes très - grandes dans *Arg. Appendice de

Meur espèce; & une fausse Arlequine différente lett. B.

des précédentes par son dos en forme de bosse. Rumph. tab.

38. litt. M.

574. Dix Porcelaines par pendans: sçavoir,
deux gris de lin, à quatre larges zônes grisbrun, interrompues en forme de taches quarrées, & nommées la Taupe *; deux Taupes * Arg. pl.
d'une autre variété, à robe fauve-roux, fasciée
de trois zônes blanchâtres, & à base brunnoir *; deux aurore foible, à trois zônes grisblanc, & à bouche lilas, nommées Cassé au Rumph. tab.
lait, & grandes dans leur espèce *: deux faux * Gualt. tab.
lait, & grandes dans leur espèce *: deux faux
Argus, dont un de la variété de l'article 570, 13. lett. H.
l'autre en dissére en ce qu'on n'y voit point de
taches brunes cerclées de blanc, mais de simples taches blanches; & deux fausses Arlequines.

575. Idem.

576. Dix Porcelaines par pendans: sçavoir, deux grises tirant sur le fauve, à dei x zônes gris plus clair, & à deux taches rouge - brun en sorme d'yeux à chaque extrémité, espéce nommée la Souris *; deux, dont une gris de lin, * Arg. pl. & l'autre fauve, chargées de traits longitudi- 18. lett. C. List. tab. naux & hachés violet soncé, à extrémités des 671. s. 174.

lévres couleur d'or, & nommées l'Isabelle'; XII. FAM. deux jaunes tirant sur le verd parsemées de ta-PORCELAI- ches blanches, rondes & à-peu-près égales en-Lit. P.

Rûmph. tab. brées principalement par zônes & par chevrons jo. litt. G.

Arg. pl. 18.

Arg. pl. 18.

& de blanc bleuâtre, à coque mince, & à List. tab.

Clavicule un peu élevée; une Arlequine, & Arg. ibid. une fausse Arlequine.

lett. G. , List. tab. 662. f. 6.

577. Les mêmes Coquilles, avec cette différence que l'une des deux Souris est gris-brun & sans zônes.

578. Trente petites Porcelaines par pendans: sçavoir, deux rares, canelle, parsemées de petites taches rondes blanches, au centre de quelques unes desquelles se trouvent de trèspetits points noirs, & à bande longitudinale

dans les flancs de points violets, bariolées dans le dos de jaune pâle, à bande longitudinale du

Gualt. tab. fond, & à bouche orangée; deux marron nué de bleu pâle, à cinq zônes de chevrons

Arg. pl. 18. blancs couchés en forme de point d'Hongrie ; lett. N. deux souci tachetées principalement sur le dos

de petits points b'ancs, & à base jonquille;

Gualt. tab. deux qui ne différent de celles-ci qu'en ce que

le fond de la robe & les côtés en sont rouge
brun, & que les points blancs laissent des pe-

**Rumph. tites taches du fond en forme d'étoiles 8; deux petites

petites Porcelaines à tête de serpent, formant la troisieme variété de cette espèce, ; deux vetd XII. FAMde pavot bariolées de gris, sur le milieu du dos Porcelatdesquelles est une large tache irréguliere jaune NES. foncé, représentant, suivant M. d'Argenville, tab. 38. litt. F. List. tab. 701. la figure d'un animal 2; deux blanches, à trois f. 50.

Arg. pl. 18. larges zones brunes, nommées le pecit Ane 3; lett. Y. & quatorze Pucelages ou Coliques, formant 39. litt. E. sept variétés : sçavoir, deux blanc de lait par- 1 Arg. pl. 18. faitement lisses 4; deux blanches, ceintes dans Rumph. tab. le milieu du corps d'un petit cordon jonquille 5; 4 1bid. litt. deux semblables, à cela près que le cordon en est D. Gualt. tab. plus large & d'un beau violet; deux, dont le 14 n°. 2. dos est devenu entiérement violet par le dépouillement, & dont le bas de la robe est resté blanc6; deux blanches, bossues sur les slancs, nommées plus particuliérement Thorax ou 3. f. 241. Kauris des Maldives 7; deux Kauris, l'un jon- 7 Arg. pl. quille, & l'autre soufre; & deux dépouillés, 18. lett. K. Gual. tab. 14. à flancs & extrémités blanches, & dos d'un n°. 3 & 4.
List. tab. 70% beau lilas. f. 59.

579. Quinze Porcelaines: sçavoir, une qui dissére du Léopard, décrit article 568, par une bande longitudinale plus étroite, presque entiérement brune, & par une large tache de même couleur, placée entre deux petites bosses, variété que quelques-uns nomment le Crapaud; une blanche parsemée d'un grand nombre de taches & de points sauve-roux, à deux zônes

Tome I.

du fond tachées de même, & à coque mince*: XII. FAM. une comme les septieme & huitieme de l'arti-Porcelaicle 576; une peau de Tigre; deux Porcelaines

16. litt. R.

Gualt. tab. à tête de serpent, de la premiere variété de l'article 567; un Lapin; deux Taupes des deux variétés de l'article 574; un Caffé au lait : une Neigeuse; deux fausses Arlequines; deux de la même espéce, dépouillées & devenues par-là d'un très-beau violet. Plus, deux Porcelaines coupées, l'une dans sa longueur, l'autre transversalement pour mettre à découvert les spirales intérieures.

580. Huit grandes Porcelaines: scavoir, un faux Argus de la grande espèce, différent de * List. tab. tous les précédens *; deux Porcelaines à tête de 697. fig. 44. serpent ; deux Peaux de tigre, & trois Porcelaines dépouillées, dont une violette & deux blanches. Plus, un faux Argus coupé transversalement pour en faire voir la spirale.

> 581. Trente-cinq petites Porcelaines trèsintéressantes, dont trente-quatre par pendans: scavoir, deux marron nué de jaune, à deux zones plus claires que le fond, à petites taches de même peu prononcées, à base & côtés oran-

*Gualt. tab. gés *; deux rares blanches, à grandes taches 53. litt. P. jaune foncé tenant les unes aux autres, & disposées sur la robe en saçon de parterre; deux

papyracées, blanches ponctuées principale-* Ibid. tab. ment dans quatre zônes de jaune foncé *; deux 16. litt. P.

grises ponctuées de noir, & à deux zônes plus claires que le fond *; deux de forme bombée, XII. FAM. dont une roux foncé, à deux zônes blanc sale, NES. &une fauve-roux, à deux taches brunes à chaque extrémité; deux verdâtres ponctuées de gris, à lévre extérieure renflée & tuberculeuse. & à base blanche tachetée de violet *; deux de forme à-peu - près semblable, grises ponctuées de jaune, & à deux fascies plus claires, nommées Peau d'ane * : deux de sorme bombée à extrémités des lévres, un peu saillantes en dehors, dont une blanche *, & une fauve ponctuée de rouge *; deux bleues, mouchetées de marron, *!bid. litt. N. à flancs blancs tachetés de brun, à quatre petits yeux placés comme dans la Souris, & de forme semblable à celle du Petit-ane *; deux blanches, mouchetées de canelle, & à coque tab.; 9. liti. O. mince *; deux de l'espéce des treizieme & quatorzieme de l'article 578; deux Truitées; deux 684. f. 31. Petit - âne; deux très-petites grises, à trois rangs de taches brunes, à stries circulaires, & à sillon longitudinal dans le milieu du dos, nommées le Pou de mer *; deux Poux de mer blancs nués *Arg. pl. 18. de couleur de chair, à stries circulaires comme List. Lab. 706. les précédens, mais sans sillon longitudinal *; f. sé; une rare, fauve tirant sur le gris, à dos très-707.f. 57. élevé, à stries circulaires fort saillantes, noueuses la long du sillon longitudinal qui est fort large, ainsi que les intervalles des stries, & à

I . litt.

* Rumph.

276 COQUILLES UNIVALVES

base platte, dont les bords sont rensiés en es-XII. FAM. péce de bourrelet, nommée la Tortue *; deux Porcellai- blanches, à stries circulaires granuleuses obli-# List. tab. ques, & se croisant l'une l'autre, à sillon lon-706. f. 55.
Bonan, cl. 3. girudinal, vers le milieu du dos, & à extrémités des lévres saillantes, nommée par M. d'Argen-£. 250. * Arg. pl. 18. ville , Petite vérole *; & deux gris de lin de la forme des précédentes, mais plus petites, gralet. V. Gualt. tab. 14. nuleuses sans stries, & jaunes dans les deux litt. S. * Arg. pl. 12. bouts. C'est le Cloporte du même Auteur *. Gualt. tab. 14. litt. T.





COQUILLES DE MER.

CLASSE SECONDE.

BIVALVES.

On range dans cette classe toutes les Coquilles composées de deux piéces à peu près égales, nommées Valves ou Bivalves Bautans, & où l'on ne remarque aucun repli sensible qu'on puisse regarder comme des spires. Nous les diviserons en six familles, qui sont,

- 1°. Les Huitres. 4°. Les Cœurs.
- 2°. Les Peignes. 5°. Les Tellines.
- 3°. Les Cames. 6°. Les Moules.



PREMIERE FAMILLE.

HUITRES.

I. Fam. Huitres. Les Coquilles sont caractérisées par l'excès plus ou moins grand de l'une de leurs valves sur l'autre, & par la propriéré générale & constante de s'attacher entr'elles ou à d'autres corps. Toutes celles que nous connoissons peuvent se rapporter à l'un des quatre genres suivans; sçavoir,

- 1°. Celles dont les valves sont composées de plusieurs couches ou lames, formant une surface quelquesois lisse & le plus souvent rabotteuse: ce sont les Huites proprement dites.
- 2°. Celles qui sont couvertes de seuilles relevées, plissées, comme frisées & sinissant en sestons, nommées par cette raison Huitres seuilletées.
- 3°. Celles qui sont chargées de stries longitudinales, hérissées d'épines gran-

des & petites, & dont le sommet de la valve inférieure est applati, prolongé I. FAM. en dehors, & plus ou moins recourbé, HUITRES, nommées Huitres épineuses, Spondiles, ou Huitres à talon.

4°. Celles enfin dont le sommet de la valve inférieure est percé d'un petit trou, & recourbé en sorme de bec sur celui de la valve supérieure, nommées généralement Anomies ou Térébratules.



GENRE PREMIER.

HUITRES PROPREMENT DITES.

I. FAM. HUITRES.

582. UNE Huitre des Indes, rare, brune nuée de blanc & de verdâtre, nacrée tant en dedans qu'en dehors, de forme presque ronde; à larges sinuosités & plis dans son contour, à stries longitudinales très - fines, à valves se colant presque l'une sur l'autre; & à charnière composée de deux élévations étroites, qui forment un angle aigu dans le haut de la valve supérieure, & se logent dans deux cavités semblables de l'inférieure, espèce nommée Sette Polonoise, & portant plus de cinq pouces de dia-

* Séba, la metre *. grande Coq.

du milieu de la pl. 90. 104. litt. B.

583. Deux Huitres de moyenne grandeur: Gualt, tab. scavoir, une Selle Polonoise, presque entiérement platte & papyracée, & une variété de cette espéce, blanche, à angle de la charniere plus aigu, & de forme encore plus ronde que les précédentes, nommée en Hollande Trans-

* Siba, la parente, & en France Vitre Chinoise, parce qu'effectivement les Chinois & les Indiens s'en Coquille du milieu du bas servent pour cet usage. de la pl. 90. List. tab. 225

584. Trois Huitres: scavoir, une petite Selle & 226. f. 60. & 61.

Polonoise, & deux Vitres Chinoises, dont une grande. Plus, deux carreaux de ces Vitres, I. Fam. taillés par les Indiens.

valves nacrées, transparentes, un peu rabotteuses, dont la supérieure est blanche, percée
près du sommet d'un grand trou ovale, & l'insérieure blanche sur les bords, mais partie jaune clair, partie rougeâtre vers le sommet, à
charniere formée d'une petite patte ovale située au-dessus du trou de la valve supérieure,
& correspondant à une cavité de même forme
de la valve inférieure, nommées Pelures d'oignon *, & très-grandes dans cette espéce. Plus, * Arg. pl. 19.
un très-joli groupe de quatorze Pelures d'oignon, jaunes nuées de lilas, & de moyenne se, sé.
grandeur, adhérentes à un Burgau dans lequel £ 38.
est logé Bernard l'hermite.

586. Vingt & une Pelures d'oignon de dissérentes grandeurs, & très-intéressantes: sçavoir, deux verd d'eau, plus rares que les précédentes, en ce qu'on y remarque des côtes & cannelures partant, non de la tête, mais du côté gauche de la circonsérence: ces côtes & ces cannelures sont aecidentelles, & dues à celles des Peignes, sur lesquels ces Coquilles se trouvent souvent adhérentes; quatre grandes de la variété des premieres de l'article précédent; huit de même espèce, mais de sormes très-va-

I. FAM. HUTTRES.

riées, dont quatre blanches, trois lilas, & une jonquille; un groupe de cinq autres, lilas clair, adhérentes à un Burgau dépouillé; une trèsgrande, couverte de vermiculaires, & une qui différe de toutes les précédentes, en ce que la ' fenêtre en a été bouchée par l'animal.

587. Une très-grande Huitre des Indes, blanc fale en dessus, d'une très - belle nacre en dedans, de forme applatie, à bords supérieurs des deux valves dépourvus de charniere, mais seulement un peu caves sur-tout vers le milieu pour recevoir le ligament, dont la partie qui reste, a été coupée transversalement, & chatoie comme la plume de paon. Cette Coquille est de l'espèce qui fournit les plus belles * List, tab. perles, ce qui l'a fair nommer Mere-Perle *.

211. f. 56, & tab, 222. litt. F.

588. Une très-belle Huitre des Indes . un Gualt. tab. 84. peu moins grande que la précédente, à robe écailleuse verd foncé, à bandes longitudinales blanches partant du sommet en forme de rayons, d'une très belle nacre en dedans, blanche, excepté vers la circonférence où elle est jaunâtre. & sur les bords qui sont d'un verd tirant sur le noir. Cette Coquille, qui du reste est semblable à la précédente, est nommée par Klein Mere-Perle stérile, & connue en France sous celui de *Arg. pl. 20. Pintade: celle-ci est très - grande dans son es-

List. tab. 223 péce *. F. 57. & 224.

f. 58. Gualt. tab. 84. litt. G.

589. Deux Pintades, dont une dépouillée. 590. Idem.

591. Trois Pintades: scavoir, deux d'Amérique, différentes des précédentes en ce que les I. FAM. écailles de leur robe sont un peu saillantes, en HULTRES. forme de petites seuilles pointues très-serrées; & une des Indes, de couleurs très-vives, donz le sommet est verd d'éméraude.

592. Six Huitres: sçavoir, une Pintade des Indes, différente des précédentes en ce qu'elle est de forme plus étroite & en demi - croissant; une d'Amérique, rougeâtre, teinte de blanc vers la tête; un groupe de trois petites Pintades d'Amérique, sur une espéce d'Alcyonium; & deux valves de petites Meres - Perles, au dedans de chacune desquelles adhére une Perle ronde d'un bel orient, & d'une belle grosseur.

593. Deux belles Huitres des Indes, à valves très-inégales entr'elles, à charnière montrant dans la valve inférieure une petite dent, avec un long fillon, & dans la supérieure une cavité qui reçoit la dent, & un petit filet qui engraine dans la rainure de l'autre valve, nominées l'Hirondelle ou l'Oiseau, à cause de leur forme, qui, lorsque la Coquille est ouverte, imite assez la tête, les aîles & la queue d'un oiseau : l'une est violet-noir en dessus, à aîles assez grandes, & 1 queue médiocrement longue *; l'autre est *Arg.pl. 19. canelle très-finement rayée de marron foncé, Guil. 12b 24. à queue très-longue, à petites aîles & très-pe-litt. A.

I. FAM. HUITRES. *Rumph.tab. 44. litt. G.

tite tête *: toutes deux d'une très-belle nacré en dedans.

594. Quatre Hirondelles: sçavoir, deux d'Amérique, semblables à la premiere de l'article précédent, à cela près que la nacre de l'une est d'un éclat un peu moindre, & que celle de l'autre est dorée : cette derniere est chargée de vermiculaires; une de Malthe, grise en dessus, blanche & nacrée en dedans, à queue courte, à tête presque de même grandeur, & à trèsgrandes aîles un peu arquées ; & une petire des Indes, qui différe de la derniere de l'article précédent, en ce que la queue en est moins longue, la tête plus large, & le corps plus petit.

595. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée d'incarnat, à stries longitudinales fines & granuleuses, à coque mince, à valve inférieure arquée des deux côtés, & échancrée près de la tête, à charniere formée d'un très - petit filet de la valve inférieure, qui s'enchasse dans une légere rainure de la supérieure, & d'une entaille longitudinale dans la tête applatie des deux valves, laquelle est destinée à recevoir le ligament.

596. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée de fauve, à deux faces, l'une triangulaire, l'autre en demi-cœur allongé, presque planes, & à équerre dans la valve supérieure, convexes dans l'inférieure, contournées l'une sur l'autre, de maniere à se joindre, quoique peu exactement, à stries longitudinales partant du HUITRES. sommet. & à charniere formée d'un grand nombre de petites hachures ou entailles, régnant dans presque toute l'étendue du sommet de chaque valve * : c'est l'Ostreum tortuosum, nommé en Hollande le Devidoir, & en France Rumph. tab. la Bistournée.

Gualt, tab.95.

597. Quatre petites Huitres oblongues blan-lit. B. ches teintes de rouge pâle, à stries longitudinales onduleuses peu prononcées, à coque mince un peu arquée, à une échancrure plus ou moins marquée au côté gauche de la tête, & à charniere composée d'une rangée de quatre à cinq dents ou entailles qui régnent dans toute la largeur du sommet applati de chaque valve; trois de forme plus ronde & plus platte, à charniere où l'on compte jusqu'à huit dents; un groupe de vingt autres de cette derniere espéce. liées ensemble par une espéce de By sus; & deux des Indes, dont une revêtue de son épiderme, l'autre polie, toutes deux violettes, & à charniere comme les précédentes, mais composée de dix dents dans l'une *, & de quatorze dans l'autre: en tout vingt - neuf huitres nacrées, 227. f. 62. dont vingt-sept d'Amérique.

* Lift, tabă

508. Une Huitre des Indes, rare, violetnoir en dessus, nacrée en dedans, & où l'on

1. FAM. Huitre. voit même des Perles, à deux branches à-peuprès d'équerre l'une sur l'autre, dont une étroite, courte & finissant en pointe, l'autre large, longue & arrondie à son extrémité, arquée dans son milieu, à charniere comme les précédentes, mais comprenant jusqu'à vingtquatre dents, espèce nommée en Hollande l'Equerre, & en France la Cuisse: celle-ci porte

* Rumph. tab. 47. lit. I. plus de sept pouces de long *.

Gual. tab. 97. 599. Deux Cuisses, dont une de l'espèce de litt. A. Séba, pl. 91. la précédente, mais moins grande, & une plus n°. 6 & 7. Valent. biv. rare en ce qu'elle n'a qu'une scule branche, fig. 3. blanche vers le haut, violet foncé dans le reste,

& à charniere composée de douze dents.

600. Une grande Huitre des Indes, ra e, & d'une belle conservation, violet-noir en dehors, plombée, brillante & nacrée en dedans, de la sorme d'un T un peu plié & contourné, à charniere sormée dans le milieu de la valve insérieure, d'une large dent triangulaire applatie, chargée elle-même d'autres très-sines, correlpondantes à de petites cavités de même sorme dans la valve opposée, & à prosonde échancrure dans les deux valves, destinée à recevoir

*Arg. pl. 19. le ligament, espèce nommée le Marteau *.

Gual. tab. 601. Un Marteau moins grand que le précé-

96. litt. D. Séba, pl. 93. dent, & d'ailleurs un peu fruste.

602. Un beau groupe de trois Huitres des Indes, rares, à robe marron clair granuleuse

& comme chagrinée, de forme presque ronde, à larges plis disposés de maniere que les angles faillans d'une valve s'enclavent exactement dans les angles rentrans de l'autre, à charniere formée d'un simple pli à peine visible. parallele au sommet de l'une des valves. & s'adapant avec le ligament dans un léger enfoncement de l'autre valve, espéce nommée Crête de coq ou Oreille de cochon *.

603. Un autre groupe de trois Crétes de co3 Rumph. tub. semblables aux précédentes, à la couleur près 47. litt. D. qui en est violette de diverses nuances.

604. Deux Huitres des Indes: scavoir, une marron, de forme oblongue, à valve supérieure chargée dans son milieu d'une forte côte longitudinale, plus saillante que large, à valve inférieure divifée par un fillon de même lar-. geur que la côte opposée, & par où la Coquille adhéroit à quelque branche, à larges plis & cannelures obliques naissant de la côte & du fillon. & s'adaptant exactement d'une valve à l'autre, à charnière comme dans la Crête de oq, espèce nommée la Feuille *; & une Crête * Arg. pl. de coq lilas clair, à plis d'une de ses valves chargés de longues pointes applaties *.

104. Litt. C.

605. Deux Feuilles, dont une rose seche, de forme moins oblongue, à côtes & fillon plus larges que dans la précédente *, & une vio- * Arg. 19. lett. F. lette de forme très-allongée, adhérente, ainsi Rumph. tab.

I. FAM. HUITRES.

que plusieurs valves d'Huitres de la même espéce, à une petite branche d'arbre.

606. Un groupe de deux Huitres des Indes. très-rares, & adhérentes l'une à l'autre, grises, de forme oblongue, à tête en pointe & ressemblante à un petit bec, à valves supérieure & inférieure, chargées comme celles de la Feuille, d'une côte & d'un fillon, à plis réciproques d'une valve à l'autre, semblables à ceux de la Crête de coq, mais beaucoup plus nombreux, & naissans, non de la tête, mais de la côte & du sillon; variété que M. d'Argenville dans sa

ag. 116.

Arg. Conch. Conchiliologie * a jugé être non - seulement l'analogue marin du Rastellum (ou Rateau) fossile, mais l'unique qui eût été trouvée jusqu'alors.

> 607. Une grande & belle Huitre des Indes, rare, marron sale, de forme ronde, à grands plis réciproques d'une valve à l'autre comme ceux de la Créte de coq, dont elle ne différe qu'en ce qu'elle est de forme plus bombée, & que les valves en sont composées de divers feuillets placés l'un sur l'autre, qui dans le tranchant des plis, s'allongent en forme d'épines

* Arg. App. turlées *.

608. Un groupe de trois Huitres des Indes, Rumph. tab. Gualt, 12b. & rares, grises nuées de verd de diverses nuances, à valve supérieure applatie, rabotteuse par

ondes vers la tête, feuilletée vers le bas, &

inférieure

inférieure fort profonde, se terminant en pointe recourbée en dessous vers le sommet, & garnie s. Fam. de grosses côtes longitudinales tuilées, de couleur blanche en dedans, excepté vers les bords qui sont violet - noir, & plissés comme dans la Crête de coq, mais moins fortement, à charniere formée de stries nombreuses très-sines, & d'un ligament s'étendant dans toute la largeur du sommet de l'une & l'autre valve, espèce nommée Corne d'abondance.

609. Une grande Corne d'abondance, 2 prolongement de la tête hors de la valve inférieure, se portant plus loin que dans les précédentes.

610. Un groupe de trois Huitres des Indes, fauve-blanc & rose séche, oblongues, à coque formée de divers rangs de seuilletures papyracées, à valve insérieure en sorme de cuillet trèsprosonde, & supérieure convexe en dedans, à charniere comme dans la Crâce de coq, & une Corne d'abondance.

611. Neuf Huitres des Indes: sçavoir, deux couleur de rose teint de lilas vif, de forme demicirculaire, à valve supérieure platte, & insérieure un peu coutbée à équerre vers ses bords, toutes deux à côtes qui finissent en plis réciproques comme dans la Crête de coq, dont elles ont aussi la charniere, & de l'espèce nommée Corbeille*; une grise en dessus, rose sale en dessous, *Gualt, tabé de forme oblongue arquée vers les deux extré- 104. list. De

Tome I.

I. FAW. HUITRES. mités, une blanc sale veiné de marron, de forme un peu triangulaire, & à groffes côtes longitudinales finissant en plis réciproques d'une valve

197. fig. 32.

99. litt. E.

à l'autre *; trois petites de forme presque ronde, à côtes & plis réciproques comme les précédentes, mais à charnière formée de trois dents, qui engrainent dans autant de cavités correspondantes: l'une est blanche & adhére à un brin de madrepore, les deux autres sont blanches, marbrées sur les côtes de violet foncé, l'une desquelles adhére à un tuyau vermicu-Gualt, tab. laire *; une Feuille gris-verdâtre, à côte large, & une Corne d'abondance.

> 612. Deux Huitres des Indes en pendant, blanches & fauve-rougeâtre, de forme oblongue, à valve supérieure arquée vers le dedans, & inférieure composée de trois plans, dont les deux latéraux portent presque à plomb sur celui du milieu, à intérieur de la Coquille violet soncé, blanc, & verd-jaunâtre jouant l'opale, & à charnière comme celle de la Corne d'abondance, à cela près que l'un & l'autre bord de la valve supérieure est de plus garni de sept à huit dents, qui engrainent dans autant de cavités de la valve inférieure.

> 613. Une grande Huitre de la Virginie, rare, quoique d'espéce commune, verdâtre en dehors, blanche en dedans, à l'exception de l'endroit où étoit attaché l'animal, qui est violet

obscur, à charniere semblable à celle des précédentes, & de forme allongée très-étroite, ce I. Fam. qui lui peut-faire donner le nom de Pirogue*: HUITRES. une de ses valves est chargée d'une petite Huitre 2006. fig. 340 de même espéce.

614. Deux autres Huitres de la Virginie, d'espéce commune, remarquables par leur grandeur, blanc sale en dehors, blanches en dedans à l'exception d'une grande tache violetnoir sur chaque valve, comme dans la précédente : elles ne différent de celle qui est représentée dans Lister *, que par leur sorme plus large & moins allongée.

* Ibid. tab.

615. Vingt & une Huitres de différentes grandeurs: scavoir, deux blanches papyracées adhérentes à des moitiés de Moules violettes; trois d'Amérique, grisâtres, à coque mince formée de plusieurs couches seuilletées: une grande de même espéce, qui a adhéré par sa valve inférieure à quelque grosse branche, & dont les deux valves sont en conséquence ar-. quées, conformément au corps que celle du desfous a embrassé; deux petites des mêmes Mers, violet obscur, de forme applatie, à stries longitudinales, & à valves très-minces; une de forme semblable, mais dont la valve supérieure est ornée de deux larges rayons blancs; quatre petites des côtes de Bretagne, blanches, papyracées, transparentes comme le tale, de la forHUITRES.

me d'un demi-cœur, & à valve supérieure platte; un groupe de trois des mêmes Mers, violet-noir & lilas, semblables pour la forme à celles de l'article 610; deux groupes, l'un d'une Huitre rabotteuse marbrée de blanc, de grisâtre & de lilas, chargée de trois glands de mer, l'autre de deux rabotteuses gris de lin, & lilas nue de blanc ; une Corbeille, & une Huitre de l'espèce de deux de l'article 612: toutes, excepté celle-ci, ont la charniere comme la Créte de coq.

616. Une branche de Manglier à trois jets, chargée de petites Huitres oblongues d'Amérique; une grosse masse de terre glaise verdâtre, desséchée & durcie, sur laquelle sont groupées plusieurs grandes Huitres d'espéce commune, avec des vermiculaires; & treize Huitres, ou groupes d'Huitres de nos Mers, de forme très-

Gualt, tab.

variée *. 102. lit. A. B.

617. Une grande Trompe marine montée sur un pied, chargée de plusieurs Huitres de l'espéce des premieres de l'article 610; un trésgros groupe d'Huitres communes, de Pétoncles, de Vermiculaires, d'Éponges, & d'autres Polypiers.

618. Deux groupes, dont un très-joli, formé d'un grand nombre de petites Huitres d'Amérique, papyracées, blanches mêlées de fauve, de violet & de jaune, adhérentes à une branche de Manglier, & montées sur un pied; & l'autre d'Huitres communes, adhérentes avec I. FAM. quelques vermiculaires à un petit vase de terre HUITRES. cuite.

619. Une Bouteille de verre, sur laquelle sont groupées des Huirres d'espèce commune, un Pétoncle, des Vermiculaires, &c.

GENRE SECOND.

HUITRES FEUILLETÉES.

620. NE Huitre des Indes, nommée Gátéau feuilleté, & très-grande dans son espéce:
elle est blanche, de forme ronde bombée, à
feuilles circulaires prosondément découpées, &
recouvrant les deux valves, dont la supérieure
est ornée de trois bandes longitudinales un peu
courbes, couleur de rose, à charniere formée
dans chaque valve, d'une double moulure,
dont la plus grande est garnie de petites dents,
qui s'engrainent réciproquement, ainsi que les
moulures, dans les cavités correspondantes des
deux valves *: cette charniere est la même lett. F.
Séba,
dans toutes les Huitres de ce genre.

621. Un Gâteau feuillete un peu moins Rumph. tab.
grand, mais dont les rangs de feuilles sont Valentyn. hival. s. 4.

T iij

I. Fam. Muitres. dans l'une & l'autre valve, d'une belle couleur de chair.

62.2. Deux Huitres d'Amérique, l'une jonquille, l'autre lilas, toutes deux vives en couleur, à plusieurs rangs circulaires de petites seuilles tuilées, plus longues dans les rangs inférieurs, à dedans des valves mêlé de pourpre, & nommées simplement Huitres seuilletées: la violette adhére à une petite branche de Madrépore oculé blanc.

623. Un beau groupe de cinq Huitres seuilletées, dont trois grandes, l'une jonquille, l'autre lilas, & la troisieme comme panachée de ces deux couleurs, & deux petites, dont une jonquille, & l'autre couleur de chair.

624. Deux groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, un formé de deux Huitres, lilas, adhérentes à une portion de grosse branche de . Manglier, & le second, de deux petites lilas sur une grande jonquille nuée de lilas.

625. Quatre Huitres feuilletées: sçavoir, deux grandes & deux petites lilas, & deux valves d'autres de même espéce, la premiere jonquille, la seconde blanche, groupées sur une très-belle Arche de Noé fasciée de canelle & d'incarnat. Plus, un groupe de deux autres, dont une lilas, & l'autre jonquille nuée de lilas.

626. Deux jolis groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, un de deux grandes lilas, & l'autre de fix, quatre desquelles sont jonquille, une lilas, s & une très-petite blanche.

I. Fam.

627. Deux autres groupes d'Huitres feuille-Huitresse sées: le premier composé d'une jonquille & d'une lilas clair; & le second de trois, dont une jonquille nuée d'incarnat & de lilas, une simplement jonquille, & l'autre lilas.

628. Cinq Huitres feuilletées: sçavoir, une jonquille nuée de violet, adhérente à une branche de Madrépore oculé; une blanche engagée dans une valve de Vieille ridée; une citron nuée de blanc & de pourpre, à feuilles étroites & pointues en forme d'ergots *; & deux lilas, dont une petite semblable à une steur de luzerne.

* Seba, pl. 88. nº. 8.

'629. Trois groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, le premier d'une lilas & d'une petite blanche sur une Arche de Noé reticulée; le second d'une Huitre jonquille nuée de lilas, d'une lilas, & d'une Feuille de la variété de la seconde de l'article 605, sur une branche de Madrepore; & le troisseme d'une Huitre lilas, & de quelques vermiculaires sur une branche de Manglier.

630. Doux jolis groupes d'Huitres, & deux Huitres isolées: sçavoir, le premier groupe formé d'une Huitre feuilletée lilas, & de deux lisses, l'une blanche, l'autre marron, de l'espèce des dernieres de l'article 597; le second de deux Huitres seuilletées, dont une jonquille, & l'au-

I. FAM. Huitres. tre lilas, & d'une Huitre lisse, de l'espèce de la derniere du groupe précédent: les deux Huitres isolées sont petites, blanches, mais rares, à valve inférieure très-convexe, sur laquelle on remarque six rangs de seuilles circulaires plissées en forme de manchettes de serame, & à valve supérieure en forme de cœur, platte, chargée de plusieurs rangs de seuilletures couchées.

63 1. Quatre petits groupes d'Huitres seuilletées: sçavoir, une jonquille sur un Astroue; une jonquille vers la tête, lilas dans le reste, adhérente à une Moule verte striée; deux l'une sur l'autre blanches nuées de couleur de rose & de cérise, toutes deux à stries longitudinales; & trois, dont une lilas, une citron, & une blanche nuée de lilas sur une Arche de Noë réticulée.

632. Trois jolis groupes, dont un de deux Huitres feuilletées lilas; un de trois autres, dont une blanche & deux jonquille nuées de lilas, & le troisieme d'une blanche nuée de lilas, non nettoyée, & telle qu'elle est sortie de la mer, formant une espéce de bouquet sur une branche de Madrepore oculé gris,

633. Cinq Huitres seuilletées: sçavoir, une très-grande jonquille, à seuilles circulaires, plissées & couchées l'une sur l'autre, & logeant dans l'épaisseur de sa valve supérieure une Pholade blanche; & les quatre autres groupées, dont

tine jonquille nuée d'incarnat, dans le dessous de laquelle est nichée une petite Pholade mar I. FAM. ron, nommée Sapotille; trois Huitres lilas, HUITRES, & une petite jonquille.

634. Six Huitres feuilletées: sçavoir, une canelle foncé, marbrée en quelques endroits de blanc, & à trois rangs longitudinaux un peu courbes de feuilles tuilées se couvrant l'une l'autre; une blanche papyracée, à valve supérieure applatie; deux jonquilles nuées de lilas, adhérentes l'une à une valve d'Huitre lisse, l'autre à une branche de Madrepore gris; & deux lilas. Plus, quatre valves inférieures d'Huitres, cerise vis nué de blanc, à tête contournée comme la Gryphite, & nommées communément Huitres de la Mer Rouge, valves qu'on trouve presque toujours isolées, & qui paroissent avoir perdu leurs feuilles par le frottement.

Gualt. tahi 101. lit. D. E.



GENRE TROISIEME.

HUITRES ÉPINEUSES.

HUITRES.

± 635. UNE Huitre épineuse des Indos, rare, & de la plus belle conservation, à valve supérieure blanche ponctuée de lilas vers la tête, lilas dans le reste, à stries longitudinales, serrées & hérissées d'épines plus ou moins longues, fines & recourbées, à valve inférieure mi-partie de grosses épines citron, & de larges seuilles couleur de role, à tête prolongée, formant un plan triangulaire marqué dans son milieu d'un trait longitudinal noirâtre, & dont le sommet se recourbe en dessous, à deux petites oreilles fituées aux deux côtés de chaque valve, à charniere composée de quatre dents, dont deux grosses & deux petites, s'engrainant dans les cavités réciproques des deux valves, & à bord

stba, pl. intérieur orangé-brun*, espèce nommée Spondile, ainsi que les suivantes, qui, quoique trèsvarićes, lui sone d'ailleurs semblables par la forme de la tête & de la charniere.

> 636. Une Huiere épineuse dissérente de la précédente par ses stries moins serrées, & par

ses épines citron, grosses & applaties sur un

* Thid. pl. fond lilas *.

637. Une Huitre épineuse de l'espèce des précédentes, à robe, épines & seuilles lilas I. FAM. clair, & à tête blanche ponctuée de lilas.

638. Une qui différe des précédentes en ce que la valve inférieure est blanche vers la tête, orangée dans le reste, & la supérieure mêlée de blanc & de couleur de rose: les épines de cette valve sont aussi plus courtes & plus étroites *. *Séba, pl. Les Hollandois ont donné à ces Coquilles le 88. n°. 2. nom de Castagnettes.

639. Une Huitre épineuse des Indes, dont la valve supérieure est mi partie blanche & violette, & dont presque toutes les épines sont orangé soncé: la valve insérieure est platte dans plus de la moitié de son étendue, pour avoir adhéré à quelque corps étranger.

640. Une autre à valve supérieure blanche, bordée dans les deux tiers de sa circonsérence, & ponctuée vers la tête de brun, à épines trèscourtes, à valve insérieure chargée dans sa moitié gauche de petites épines blanches, de grandes épines, & de seuilles jaune soncé, & adhérente par l'autre moitié à deux astroües, l'un à grandes, l'autre à petites étoiles, au premier desquels adhére aussi une petite Huitre blanche non épineuse.

641. Une Huitre épineuse des Indes, rare dont la robe est totalement orangée, ainsi que

eles bords intérieurs des valves, & les épines. qui sont plattes, larges & un peu couchées *.

642. Une autre de même espéce, mais de couleur un peu moins foncée, & dont les pi-

* seba, pl. quans sont meins applatis & plus droits *.

643. Une autre d'un bel orangé, dont les piquans tiennent de la forme des deux variétés précédentes : elle adhère à un caillou.

644. Deux Huitres épineuses des Indes: sçavoir, une à valve supérieure violette tachée de blanc, & à stries des deux valves aurore, ainsi que les épines qui sont plattes & larges vers les Flbid. no. 5. bords *: & une aurore vif, à un petit nombre d'épines ne se montrant que sur la valve supé-

rieure, quelques-unes desquelles s'élargissent en forme de feuilles. 645. Une grande Huitre épineuse des Indes,

cramoisi pâle, de forme ronde, à stries inégales chargées çà & là de groffes épines, dont quelques-unes se recourbent en dedans *.

646. Une autre plus grande encore & trèsbelle, à robe nuée de blanc & de cramoisi, à groffes stries longitudinales, dont fept blanches donnent naissance dans les deux valves, à de grandes epines de même couleur, larges & déchiquetées, & à bords intérieurs cerise.

647. Une autre de forme plus allongée, à valve supérieure marbrée par traits fins de blanc à de lilas, garnie d'épines peu nombreuses & pentes, à valveinférieure blanche & couleur I. Fam. de chair, recouverte d'un grand nombre de grosses épines plus ou moins larges, & à tête très-groffe recourbée en dessus en forme de bec de perroquet *. * Arg. pl. 190

648. Une grande & belle Huitre épineuse lett H. des Indes, de forme très-renflée, à valves lie de vin, à six rangs longitudinaux, & également distans les uns des autres de grosses stries chargées d'épines longues & larges, à stries fines intermédiaires d'où naissent aussi quelques petites épines, à tête orangée, & recourbée comme la précédente.

649. Un groupe en forme d'arcade de deux Huitres épineuses des Indes, blanches, à stries chargées de grandes épines applaties, à cannelures peu profondes marbrées par hachures transversales fines & en zig - zag d'amaranthe foncé *.

650. Une Huitre de l'espèce, & à-peu-près \$8. n°. > des mêmes couleurs que celles de l'article précédent, adhérente à une pierre verdâtre.

651. Un groupe de deux Huitres épineuses des Indes, blanches & amaranthe, à valves chargées de peu d'épines, d'une moitié de même espécé, & d'une Huitre-feuille blanche & gris de lin, adhérentes à une pierre noirâtre.

652. Deux Huitres épineuses des Indes,

HUITRES.

adhérentes chacune à un caillou ; sçavoir, une blanche, à neuf rangs de grosses stries longitudinales chargées d'épines courtes & larges, à stries fines intermédiaires, amaranthe clair. chargées de très-petites épines de même cou-Seba, pl. leur *, & une de la varieté de celles de l'article 649, à valve inférieure garnie de feuilles, &

supérieure épineuse, à laquelle tient une valve

de l'Huitre-feuille.

653. Trois Huitres épineuses de moyenne grandeur; sçavoir, deux blanches, marbrées d'amaranthe pâle, adhérentes à une pierre, & une aurore foncé, à pointes peu nombreules, mais longues & applaties.

654. Un groupe de deux belles Huitres des Indes, blanches, marbrées par traits en zig-zag d'amaranthe clair, d'orangé & de rose vif en quelques endroits, à grandes épines blanches dans l'une, couleur de rose dans l'autre. & inclinées vers le bas, à prolongation du sommet de la valve inférieure blanche, & s'étendant fort au loin, espèce nommée par M. d'Ar-

rg. pl. 20, genville le Pied d'âne*.

655. Deux Huitres épineuses des Indes, dont une blanche tachetée dans ses cannelures de fauve roux, à un grand nombre de longues épines, larges sur-tout vers le bas*, & une à

larges bandes alternatives blanches & violetpoir, des premieres desquelles naissent quelques èpines peu longues, mais larges & de même = couleur.

I. Fam. Huitres.

- 656. Idem, avec cette différence que les épines de la seconde Huitre sont nombreuses, la plûpare applaties, couchées sur leur valve, & comme repliées.
- dont une blanche à stries longitudinales grosses & sines, celles-ci amaranthe, & celles-là garnies d'épines, dont une grande partie, sur-tout vers le bas de la Coquille, s'élargit en forme de seuilles accouplées, & quelquesois triplées l'une sur l'autre, frisées & tortillées; & une blanche nuée & veinée par traits en zig-zag gris de lin, armée de longues épines applaties dans les bords des deux valves, & recouverte dans le haut de la valve insérieure, par une valve d'autre Coquille de la famille des Cœurs.
- 658. Trois autres, dont une semblable à la premiere de l'article précédent, à cela près que les épines en sont moins longues, plus serrées les unes sur les autres, & plus tortillées; une blanche à traits en zig-zag nombreux imitant le point d'Hongrie, & d'un bel amaranthe, à épines longues & blanches, excepté quelques-unes vers la rête, qui sont violettes, courtes & ramassées; & une blanche tachetée des mêmes couleurs que les précédentes, à valve inférieure

304 COQUILLES BIVALVES

feuilletée, & supérieure garnie de petites épinés

I. Fais. nombreusés.

HULTES.

659. Trois autres; sçavoir, une rouge-sanguin, à stries fines & serrées entre les grosses qui donnent naissance à des épines peu nombreuses & peu élevées; une blanc-sale, veinée dans les cannelures d'amaranthe, à épines peu longues & applaties, dont quelques-unes sont souci; & une blanche veinée & tachetée de rouge soncé, sur-tout vers le bas, où elle n'a que fort peu d'épines.

660. Trois Huitres épineuses des Indes, dont deux en pendant de la variété de la derniere de l'article précédent, mais plus chargées d'épienes; & une couleur de cérise, à stries inégales, les plus grosses veinées de blanc, donnant naissance à de grosses épines, dont quelques-unes sont assez longues, & à tête recourbée en-dessus en forme de bec.

661. Une Huitre épineuse d'Amérique, trèsrare & très-belle, couleur de rose marbré de blanc, à grandes épines incarnat s'élargissant à leurs extrémités, où elles forment autant de feuilles déchiquetées, à tête garnie, comme celles des Indes, de deux oreilles, & nommée Huitre à feuilles de persit*.

* Seba, pl. 88. n°. 10.

662. Une Huitre à feuilles de perfil, à riges de feuilles plus longues, & feuilles moins lat-

ges que celles de la précédente, & à la valve inférieure de laquelle adhére un petit Buccin de l'espéce nommée Mûre; elle est représentée dans

* Séba ; pl.;

663. Une autre plus grande & plus bombée, à longues feuilles blanches & incarnates, sur un fond couleur de rose *.

* Arg. pl. 191 lett. G.

664. Une grande & belle Huitre d'Amérique, à robe nuée de couleur de rose, d'incarnar & de blanc, à valve supérieure presque platte, armée dans ses stries de six rangs d'épines longues & plattes, entre lesquels s'en trouvent plusieurs autres d'épines courtes & aigues, à valve inférieure très-bombée, striée aussi suivant sa longueur, & chargée partie d'épines, partie de feuilles minces & très-larges incarnates, entre lesquel'es est engagée une petite branche de Madrépore oculé.

665. Une autre semblable à la précédente, de couleurs plus vives encore, & armée d'un

plus grand nombre de petites pointes.

666. Une de même espéce, mais où le blanc domine davantage, à feuilles de la valve inférieure ttès-nombreuses, entre lesquelles, outre le Madrépore oculé, est engagée une valve d'Arche de Noë blanche.

en ce que la plûpart des épines sont plus grandes & plus larges, & amaranthe vif, que la tête

Tome I.

.V

I. FAM. HUITRES. en est vermillon, que la valve inférieure, at lieu d'être bombée, est au contraire un peu applatie, & que les bords de cette valve se replient en dehors.

668. Un groupe de deux Huitres épineuses d'Amérique, blanches nuées de rouge & à tête aurore.

669. Une très-grande & très-belle Huitre d'Amérique, blanche nuée de couleur de rose, à tête citron, & à très-longues épines couleur de rose.

670. Une autre où le couleur de rose domine davantage, même sur la tête, & à grandes épines, moins longues que dans la précédente.

blanche, teinte en quelques endroits d'incarnat, à tête aurore, & hérissée, tant en dessus qu'en dessous, d'épines larges & très-longues.

. 672. Une semblable un peu moins grande.

e 673. Trois Huitres de l'espèce des précédentes; sçavoir, une à valve supérieure cramoiti nué de blanc, & inférieure blanche teinte de jaune, bordée de rouge, tenant entre ses seuilles une branche de Madrépore oculé gris; & deux petites à peu près semblables, dont la moindre est engagée entre deux Tuyaux vermiculaires.

674. Trois autres, dont une à valve supétieure bombée, blanche & couleur de rose, & inférieure recourbée en dessous, rose séche & aurore vif sur-tout vers la tête, à très-lon- I. Fam. gues épines, dont quelques-unes se couchent & s'engagent en partie dans les seuilles du bord; une petite à valves blanches vers les bords; & vermillon près de la tête; & une autre petite nuée de rouge & de blanc, adhérente à une branche de Madrépore oculé.

675. Une grande Huitre épineuse d'Amérique, nuce de blanc & de cramoisi, à tête autore, & longues épines couleur de rose.

676. Une autre très-belle, blanche, à tête. aurore, & à épines larges, fort longues, un peu recourbées en dedans.

677. Une autre moins grande, blanche, à tête cérise, à piquans nués de couleur de rose, & adhérente à une valve d'une autre Huitre chargée de Vermiculaires, & qui lui sert de pied.

678. Une grande & belle Huitre épineuse d'Amérique, blanche vers les bords, nuée d'autore & de rouge vers la tête, à stries très-ser-rées, à épines grandes & petites plus nombreuses, mais moins longues que celles des précédentes, & à intervalles des seuilles de la valve inférieure remplis de petites branches de Madrépore oculé blanc:

679. Une autre blanche; à tête orangé vif, à épines de la valve supérieure peu longues,

308 COQUILLES BIVALVES

l.Fam. Hystres. excepté vers les bords, & celles de la valve inéférieure couchées & entrelassées avec les seulles, auxquelles adhérent plusieurs petites branches de Madrépore oculé.

680. Une semblable, à grosses épines plus nombreuses.

681. Idem.

682. Une très-grande Huitre épineuse de la Méditerranée, à valve supérieure pourpre, & inférieure blanche, à stries longitudinales très-serrées & hérissées d'épines, les unes plus grandes, s'élargissant vers le haut, les autres plus petites & rondes, & à valve inférieure chargée de quelques feuilles qui naissent entre les épines, où adhérent des Vermiculaires, & quelques Escares.

683. Une autre un peu moins grande, à feuilles de la valve inférieure plus nombreuses, & épines teintes de pourpre.

684. Un groupe de deux Huitres épineuses de la Méditerranée, à valve supérieure veinée de pourpre clair & de blanc, & insérieure blanche, hérissée d'épines plus grandes & plus nombreuses que la supérieure.

& lilas, chargée de nombreuses épines sines & grosses de même couleur, dont la plûpart de celles ci sont applaties, & à valve inférieure

blanche, presque entiérement seuilletée & un greu arquée.

I. FAM.

686. Deux autres en pendant, à valves su- Hultage, périeures veinées d'un pourpre très-vif.

687. Deux autres à valve supérieure totalement pourpre dans l'une, blanche veinée de pourpre dans l'autre.

688. Deux grandes Huitres épineuses de la Méditerranée, dont une à valve supérieure pourpre soncé, & inférieure blanche, seuilletée de souci, remarquable en ce que la plûpart des épines de la valve supérieure y sont couchées & comme colées sur cette valve; & une dont la valve supérieure est blanche, ponctuée le long des stries de pourpre, & à épines peu nombreuses de cette derniere couleur.

689. Trois autres de moyenne grandeur; scavoir, une dont la valve insérieure se releve, à équerre sur la supérieure, en sorme de corbeille, & dont les bords de celle-ci, recourbés en dehors, s'emboîtent exactement en sorme de couvercle dans la cavité de l'insérieure; une adhérente à un groupe de Vermiculaires & de Tubipores; & une à seuilles de la valve insérieure souci.


690. Une grosse Pierre d'environ un pied de haut, sans le support, revêtue de concrétions marines, & à laquelle adhérent trois Huitres épineuses de Malthe, dont une sort grande, des

310 GOQUILLES BIVALVES

Corallines, des Fucus, de petits Coquillages;

HULTRES.

691. Deux Huitres très-rares, dont une amaranthe clair, marbrée dans les deux valves par traits langitudinaux de blanc, à stries longitudinales larges & applaties, & à tête recourbée en dessous de gauche à droite, & l'autre à valve supérieure orangé soncé, marbrée par traits longitudinaux de blanc, & insérieure marbrée d'aurore, de blanc, de jonqui'le & de citron, à stries inégales serrées & arrondies, toutes deux dépourvues d'épines, mais de la sonne totale des épineuses, ce qui détermine à les placer dans ce genre.



GENRE QUATRIEME,

ANOMIES QU TÉRÉBRATULES.

verd-noirâtre, à stries longitudinales très-fines, I. Fam. à avance de la valve inférieure sur la supérieure, en bec de perroques, ce qui lui en a fait donner le nom, à trou triangulaire formant le dessous de ce bec, à charniere composée dans la valve insérieure de deux petits crochets, qu'embrassent des sinus correspondans de la valve supérieure, & à deux petits appendices intérieurs fixés vers le haut de celle-ci *. Cette *Arg. pl.23.6 Coquille est des plus grandes que l'on connoisse lett. O. dans cette espéce.

693. Un autre Bec de perroquet un peu moins grand que le précédent.

694. Une Anomie de Mahon, lisse, blanche tirant sur le verd d'eau, papyracée, à avance de la valve insérieure sur la supérieure moins saillante que dans la précédente, à troutond sormant le dessus de cette avance, à large applatissement longitudinal dans le milieu de la même valve, mais peu prononcé sur-tout vers le bas, à charniere & appendice intérieur comme

V ix

dans la précédente, & nommée Coq & Poule

I. FAM. ou Poulette*: elle est grande dans cette espèce,

HUITRES.

* Ar. App. & tient par un petit nerf à une valve d'autre

pl. 3. lett. E. Anomie de même espèce.

695. Deux Pouleites blanches moins grandes que la précédente, dont une tient par un petit nerf à un brin de Corail rouge.

696. Une grande Anomie des parages voisins du détroit de Magellan, blanche, à stries longitudinales, à trou du sommet rond & fort grand, à large élévation longitudinale en sorme de carêne dans le milieu de la valve insérieure, à charniere peu dissérente des précédentes, mais montrant deux appendices latéraux longs & étroits partant du sommet de la valve supérieure, s'étendant vers le milieu de la même valve, où ils sont assujettis de nouveau par deux petits ligamens, pour se recourber ensuite vers la tête d'une saçon trèsfinguliere. Cette Coquille porte un pouce sept lignes de diametre.

697. Une *Anomie* Magellanique qui peut servir de pendant à la précédente.

698. Deux autres en pendant, dont une Magellanique, & l'autre de la variété de l'article 694, mais moins grande.

699. Treize Anomies: sçavoir, deux petites de Mahon, rares & en pendant, jaune-blond, transparentes, à stries circulaires presqu'im-

perceptibles, à valve inférieure fort concave, & supérieure plus platte, débordant l'insé- I. FAM. rieure dans un grand triangle curviligne en for-HUITRES. me de lampe du côté de la tête, à petite queuë forée, & à deux espéces de petites aîles. Ces Coquilles sont du diametre d'un gros pois, & imitent assez la forme d'un Scarabée, ce qui leur en peut faire donner le nom; quatre autres beaucoup plus petites, qui différent des précédentes en ce qu'elles sont sans stries, que la valve inférieure en est moins concave, & qu'au lieu de deux aîles, on y voit deux tuyaux latéraux à-peu-près égaux, & semblables à celui du milieu qui forme la queue; deux petites de la Méditerranée, blanches, de forme ovale, peu convexes, à trou rond, & à stries longitudinales partant du sommet *; deux autres blanc *Guale tabl sale, à deux espéces de petites oreilles près du 96. litt. B. trou du sommet, à stries longitudinales & circulaires très-fines, & à appendice intérieur en forme de gouttiere, tenant au sommet & au milieu de la valve supérieure *; une très-petite * thid. lie. A1 de même espéce, mais à stries moins serrées: une Magellanique & un Bec de pertoquet. 700. Idem.



SECONDE FAMILLE.

PEIGNES.

II. FAM. PEIGNES. OE font des Coquilles de forme plus ou moins applatie, qui ne différent des Huitres du troisieme genre qu'en ce que leurs côtes ou stries longitudinales sont dépourvues d'épines, & que le sommet de leur valve insérieure ne se prolonge, ni ne se recourbe en dehors. Leurs caracteres généraux sont d'avoir le sommet comme coupé en ligne droite, d'aller ensuite en s'élargissant insensiblement pour prendre une sigure arrondie, & d'être ordinairement pourvues d'oreilles. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. Les Peignes à oreilles égales & à charnière composée 1°. d'un ligament à ressort placé dans une cavité qui occupe le milieu du sommet de chaque valve; 2°. d'un petit silet transversal

de la valve supérieure, se logeant dans une rainure correspondante de la valve PEIGNES, inférieure. On nomme vulgairement les Coquilles de ce genre, Pélerines ou Coquilles de Saint-Jacques.

- 2°. Les Peignes à oreilles inégales, à charnière comme les précèdens, à valves supérieure & inférieure convexes, & nommés plus particuliérement Pétoncles.
- 3°. Les Peignes sans oreilles & à charniere formée d'un petit applatissement en sorme de triangle obtusangle isoscele, sur lequel est placé le ligament, & de plusieurs petites dents rangées de part & d'autre en sorme d'arc dans l'une & l'autre valve.



GENRE PREMIER.

Prignes A oreilles égales.

II. FAM. PRIGNES.

701. Un grand Peigne rare, quoique de nor mers, à valve supérieure blanche & platte, chargée de seize côtes longitudinales tachées de rouge de diverses mances, & d'autant de larges & profondes cannelures blanches, à valve inférieure convexe presque entiérement blanche, chargée de côtes plus larges que celles de la supérieure, & dont la plûpart contiennent *Grale tab. quatre stries de même direction *.

702. Dix Peignes par pendans: sçavoir, deux très-grands, à valve supérieure marbrée de blanc & de rouge, & inférieure blanche, à deux zônes nuées d'orangé, d'aurore & de citron dans l'un, blanche nuée de jaune dans l'autre, tous deux à larges côtes & profondes cannelures, chargées de stries longitudinales & transversales, mais done celles-ci sont plus senfibles dans le fecond, & celles-là dans le pre-* Gualt. tal. mier *; deux blancs, & quatre marbrés de 98. litt. A. B. blanc & de diverses belles nuances de rouge & de jaune, de la variété des deux premiers de cet article, & deux de celle de l'article précé;

Tent, mais plus petits, & qui en différent d'ailleurs en ce que le fond en est rose séche.

703. Deux Peignes d'Amérique, à valve in- PATGNES. férieure très-convexe, & supérieure un peu concave, chargées l'une & l'autre en dehors de stries applaties peu marquées vers la tête, & en dedans de paires de firies peu sensibles aussi vers le haut, espèce nommée Bénitier, l'un desquels est peu commun en ce qu'il est entiérement blanc, l'autre n'a que la valve inférieure qui soit blanche, la supérieure est lilas marbrée de fauve & de brun.

704. Deux Bénitiers, à valve supérieure marbrée de rouge-brun, de violet & de gris, & inférieure fauve nuée de blanc.

705. Deux Peignes des Indes en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures peu serrées, à valve supérieure rose séche en dehors, rayonnée de lignes longitudinales rouge - brun, & en dedans blanche, bordé lie de vin, à valve inférieure totalement blanche, à coque mince, & de forme très - peu bombée, quoiqu'également dans chaque valve, espèce nommée Sole ou Eventail *.

706. Une Sole des Indes de quatre pouces 24 lett. G. & demide diametre, à valve supérieure veinée 45. lkc. A. B. en dehors par cercles alternatifs de rouge-brup fig. 364. de diverses nuances & de blanc, à rayons blancs peu prononcés, & en dedans blanche

Bonan. cl. 4.

II. FAM. Prignes. bordée de citron, à valve inférieure blanch nuée de citron en dehors, & semblable en dedans à la supérieure, variété que l'on nomme Sole de la rare espèce.

707. Une Sole de l'espèce de celles de l'article 705, mais rare en ce que sa valve supérieure est parsemée vers les bords de taches grandes & perites ventre de biche, & que l'inférieure est pareillement tachée d'un blanc plus mat que le sond, variété que l'on nomme Sole marquetée.

708. Deux autres variétés de Soles rares, l'une à valve supérieure rouge-brun, rayonnée sur-tout vers le haut de faisceaux jaunes, & de lignes brunes en dehors, bordée de pourpre en dedans, à valve inférieure comme les précédentes; & l'autre à stries longitudinales intérieures très-serrées, à valve supérieure rouge-sanguin, & inférieure nuée par zônes de blance de couleur de rose de diverses nuances.

709. Deux Peignes d'Amérique en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures bien prononcées, à valve supérieure platte, rouge-brun en dehors, blanche tachée d'orangé-brun en dedans, & inférieure concave, blanche tant au dedans qu'au dehors dans l'un, fauve nuée de blanc dans l'autre. Cette espèce de Peigne que nous connoissons

de la Sole & du Bénitier.

II. FAM. Percres.

710. Un Peigne Magellanique rare & trèsgrand, mais un peu dégradé, à robe nuée de blanc & de couleur de tuile en dessus, blanc nué d'incarnat en dessous, à stries longitudinales fines & serrées, à valve supérieure applatie, & inférieure un peu bombée, toutes les deux nacrées en dedans.

GENRE SECOND.

PEIGNES A OREILLES INÉGALES.

711. Un grand Peigne d'Amérique, ponceau vers la tête, rouge-brun dans le corps, à stries longitudinales partie blanches, partie du sond, à grosses côres comprenant chacune plusieurs de ces stries, & chargées en outre de tubercules disposés par zônes, qui dans la valve supérieure sont quelquesois en sorme de tuiles arrondies, dentelées & relevées, à stries transversales très sines & très servées, espèce que la ressemblance de sa couleur avec celle du cosail, a fait nommer Coraline*.

712. Une Coraline un peu moins grande & lett. F. Séba, pl. 87.
d'un rouge plus brun que la précédente.

II. FAM. PELENES. 713. Une autre de moyenne grandeur, 3 valve supérieure, d'un beau rouge-sanguin, & inférieure couleur de rose vis *.

* Séba, pl. \$7. n°. 3 & 4.

714. Une autre à valve supérieure rougesanguin, teinte en quelques endroits de blanc & de rose séche, & à valve inférieure couleur de rose, blanche & aurore.

715. Une Coraline de moyenne grandeur, & tres-zare en ce qu'elle est entiérement aurore.

716. Deux Peignes, dont un rare d'Amérique blanc en dehors, jonquille & violet en dedans, à neuf côtes dans la valve supérieure, & dix dans l'insérieure, chargées de tuiles plus ou moins recourbées en dessous, à oreilles trèsinégales chargées elles-mêmes de petites tuiles, espéce nommée Pélerine tuilée, ; & un des

* Ibid. n° espèce nommée Pélerine tuilée *; & un des Indes, marbré en dehors par zônes ondées interrompues vers le haut, d'amaranthe & de blanc, bordé en dedans d'aurore & de cramoisse, à côtes longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, de stries tuilées, nommé en Hollande Manteau Royal, & en France Man-

*Arg. pl.24. reau Ducal *.

lett. I. Séba, pl. 87.

717. Un Manteau Ducas marbré en dehors de diverses belles nuances de rouge, de jaune & de blanc, presque entiérement jonquille pâle vers les bords, blanc bordé d'orangé en dedans, & grand dans cette espèce.

718.

718. Un Manueau Ducal plus grand que le précédent, dans la marbrure duquel n'entrent II. FAM. que le blanc & les plus belles nuances de rouge, PRIGNES. à bord intérieur couleur d'or, plus large que celui du précédent.

719. Un autre marbré en dehors par zônes ondées alternatives de rouge-brun & de blanc, teint dans les côtes de cerise pale, & en dedans blanc teint de cramoisi, bordé d'orangé.

720. Un autre, dont le dessus est blanc tacheté de noir à la tête, marbré dans le reste de rouge de diver es nuances, de blanc & de noir, & dont le dedans est bordé d'aurore vis teint de cramoisi.

721. Un Peigne des Indes, à valve supérieure blanche, tachée par zônes d'orangé foncé, & inférieure blanche en entier, à grosses côtes longitudinales, chargées, ainsi que les cannelures, de stries sines en même sens, à oreilles peu inégales, & grand dans son espèce, nommé par quelques-uns Manteau Ducal blanc, & par d'autres la Gibeciere ou la Bourse*.

* Arg. pl.

722. Une Bourse, dont les taches sont orangé, brunes & noires.

723. Un grand Peigne des Indes, rare, marbré en dehors de blanc, d'amaranthe & de lilas, teint en dedans des mêmes couleurs, à grosses stries & cannelures longitu inales, à

Tome I.

- II, FAM. Prignis.

oreilles fort inégales, & à la valve supérieure

duquel adhére une belle Crâte de coq. 724. Un Peigne des Indes, rare, ponceau

nué d'aurore tant en dehors qu'en dedans, à stries longitudinales égales & un peu rabotteufes.

725. Idem.

726. Trois Peignes des Indes: scavoir, deux Pétoncles rares, dont un marbré en dessus par larges zônes en zig-zag de brun & de blanc veiné vers la tête de bleu, clair, à neuf côtes longitudinales, & à stries fines & serrées en même sens; l'autre à tête blanche veinée de rouge & de bleu clair, rouge-brun dans le reste, à cinq côtes peu saillantes chargées, ainsi que les cannelures, de stries fines en même

sens *: & un Manteau Ducal riche en cou-Gualt, tab. 74. litt. Z. leurs.

> 727. Trois autres: sçavoir, deux Pétoncles en pendant, marbrés par grandes taches de brun, de blanc & de rouge, mais du reste sémblables au second de l'article pré-édent, & un très-beau Manteau Ducal.

> 728. Trois autres : sçavoir, deux Pétoncles de l'espèce des premiers de l'article 726, marbrés en dessus par zônes d'olive, de brun & de jaune de diverses nuances, jaunes en des-Sous: & un beau Manteau Ducal à tête blanche.

729. Trois Pétoncles peu communs: sç2-

voir, un de la mer du Sud, rouge-sanguin nué d'aurore; & taché de blanc, semblable du II. FAM. reste à celui de l'article 724; & deux des côtes PEIGNES. d'Espagne, à larges côtes peu nombreuses, marbrés en dessus, l'un de souci, de blanc & de brun, l'aurre d'olive, de bleu clair & de gris, tons deux blancs en dessous * Gualt. Labs.

730. Six Pétoncles des côtes d'Espagne, & C. Litt. A. B. côtes peu saillantes, de couleurs & marbrures

très-variées.

731. Huit jolis Pétoncles par pendans, dont quatre des côtes d'Espagne; deux des Indes, à grandes taches blanches & rouge obscur; un Manteau Ducal marbré par zônes ondées de rouge-brun & de blanc, & un semblable d'un rouge plus vis.

732. Neuf Pétoncles: sçavoir, huit d'Espagne par pendans, dont deux nommés Brocatelle, à cause de leur belle marbrure blanche & rouge de diverses nuances dans l'un, rouge-sanguin, couleur de rose & aurore dans l'autre; & un Manteau Ducal.

733. Dix - huit Pétoncles d'Espagne, d'un beau choix, & de couleurs très-variées, dont quelques-uns papyracés & transparens, d'autres à grosses côtes peu nombreuses, & le reste des espéces déjà décrites.

634. Deux Pétoncles d'Amérique, peu communs, à grosses & petites stries longitudinales

II. FAM. de fauve & de fouci *.

Peignes.
** séba, pl.
87. n°. 14.

& petits: sçavoir, quatre d'Amérique, de l'espéce des précédens, dont trois rouges un peu

* Ibid.n°. 13. marbrés de blanc sale *, & un citron vis; quatre autres à stries longitudinales rudes au toucher, à tête blanche tachetée d'amaranthe. & le reste

*Arg. pl. 24. ponceau *; & deux des Indes, à petites côtes longitudinales, tuilées dans l'un, chagrinées dans l'autre; tous deux blancs tachetés d'orangé & de brun.

736. Deux Peignes des mers du Nord, papyracés, à stries longitudinales grosses & petites, à robe formée dans l'un de zônes aurore de diverses nuances, & dans l'autre de saisceaux alternatifs blancs & amaranthe clair; tous deux blancs nués de lilas endessous & vets le sommet.

737. Deux grands Peignes de l'espèce des précédens, dont les valves, quoiqu'assez semblables, ne sont point pareilles, & qu'il est très-rare de trouver complets; tous deux nués par zônes de couleurs très - vives, entr'autres d'incarnat, de couleur de rose, d'aurore, de

* 566a, pl. cerise, de violet & de ponceau *.

738. Deux autres semblables, à quelques dis-

férences près dans les nuances.

739. Idem.

740. Vingt-quatre Pétoncles: sçavoir, vingtdeux de nos mers, du plus beati choix, qui par II. FAM. la richesse & la variété de leurs couleurs, ne cédent en rien à ceux des Indes, entr'autres un violet, un couleur de feu, deux blancs, un marbré de blanc & de couleur de rose, quatre deforme bizarre, qui leur vient d'avoir adhéré à d'autres Coquilles; deux tuilés, dont un marbré de jonquille & d'aurore, &c. * & deux pe- * Gualt, tabe tits Manteaux Ducaux.

741. Vingt-huir Pétoncles de nos mers, de couleurs très-belles & très-variées, dont deux grands chargés de tuyaux vermiculaires, & deux petits adhérans à deux valves d'Huitres d'espéce commune.

742. Quarante-cinq Pétoncles de nos mers, non moins variés. & non moins bien choisis que ceux de l'article précédent.

742. Deux Pétoncles rares: scavoir, un de la Chine, à tête blanche tachée de brun, cerife vif dans le reste, de forme arrondie & bombée, à oreilles peu inégales, à stries & cannelures égales & bien prononcées; l'autre du Pérou. à valve supérieure marbrée de blanc, de couleur de chair, de jonquille & de brun, & inférieure blanche tachée en quelques endroits de brun, à oreilles très-petites, & du reste semblable au précédent.

744. Trois autres de même forme : sçavoir, X iii

COQUILLES BIVALVES

II. FAM. Peignes.

24. lett. E.

44. litt. D.

deux de S. Domingue, marbrés en dessus de blanc & de gris verdâtre, un peu tachés de fauve en dessous, & un de la Chine, semblable au premier de l'article précédent.

745. Cinq Peignes blancs de forme oblongue & évalée d'un côté, à très-petites oreilles inégales, & à valves un peu béantes au - dessous: sçavoir, deux des Indes, hérissés sur les stries de petites tuiles presque droites, qui leur ont Arg. pl. fait donner les noms de Rapeou de Ratissoire*, & grands dans leur espéce; un de S. Domin-Rumph. tab. gue, à stries longitudinales fines & serrées, composées d'espéces de bâtons rompus qui se suivent obliquement & régulièrement d'une strie à l'autre, & à une des oreilles retroussée

> la Lime; un des mêmes parages, & semblable à cela près que les stries en sont plus fines, & les petits bâtons rompus plus contigus, variété que l'on nomme Lime douce; & un de la Barhade a à stries longitudinales peu serrées, de forme un peu renflée, & béant des deux côtés

> d'un côté dans les deux valves, espéce nommée

List. tab. à la fois \$77. f. 14.

GENRE TROISIEME.

PEIGNES SANS OREILLES.

746. Un Peigne des Indes, blanc marbré par taches de brun, de jaune & de bleu, à côtes II. Fam. nombreuses serrées l'une contre l'autre, arron-Paigness. dies & ficelées, à bords intérieurs applatis, de forme ronde & bombée, nommé Pétoncle sans ereilles, & grand dans son espèce *.

747. Cinq Pétoncles sans oreilles: sçavoir, lett. B. 239. deux d'Amérique en pendant, jonquille point s'. 739. tillés de brun; un petit des Indes, nué de blanc & de couleur de rose, taché & pointillé de brun; & deux de la variété de celui de l'article précédent.



TROISIEME FAMILLE

CAMES.

III. FAM.

CES Coquilles différent des Huites par l'uniformité constante de leurs deux valves, & des Peignes, en ce qu'elles n'ont point d'oreilles. Leurs caracteres généraux sont d'avoir les deux valves égales, convexes & parsaitement semblables. Nous les diviserons ici, d'après le contour commun des bases de leurs valves, en quatre genres; sçavoir,

- 1°. Les Cames à bases rondes régulieres, qui sont les vrais Cames.
- 2°. Les Cames à bases rondes irrégulieres par quelque pli ou sinuosité.
- 3°. Les Cames à bases ovales régulieres, nommées vulgairement Palourdes.
- 4°. Les Cames à bases ovales irrégulieres, dont un des bords est ondé & comme replié, nommées aussi Lavignons.

GENRE PREMIER.

CAMES A BASES RONDES RÉGULIERES.

748. DEUX grandes Cames de S. Domingue, dont une blanche nuée de couleur de III. FAM. chair, & réticulée en dehors, citron clair, bordée de couleur de rose en dedans, & à charmiere formée dans l'une des valves, de deux groffes dents fort proches l'une de l'autre. & de trois cavités qui reçoivent les trois dents correspondantes de l'autre valve, nommée le Rézeau blanc; & une de même espéce, mais polie, & devenue par-làblanche, rayée dans le bas, & par zônes de couleur de rose *.

749. Deux Rézeaux blancs, l'un nué de ci- Adanson, pl. tron en dehors, citron en dedans; l'autre poli. 16. fig. 3. & devenu citron bordé de trois zônes couleur de rose en dehors, & d'une seulement en dedans.

Gualt, tab.

- 750. Deux Rézeaux blancs, l'un teint de rouge en dehors, bordé de rouge en dedans. l'autre poli & devenu citron, bordé de couleur de rose tant en dedans qu'en dehors.
- 751. Trois Rézeaux blancs un peu moins grands, dont un teint vers la tête de citron, &

CAMES.

deux polis, l'un à deux zônes couleur de role III. FAM. près des bords, l'autre à une seulement.

752. Deux grandes Cames de même espèce.

polies, & en pendant.

753. Une autre très - belle; polle, blanche teinte de citron, ornée dans toute sa robe de plusieurs zônes rouges de diverses núances en dehors, citron bordé de cerise vis en dedans

754. Une Came de même espéce, très-grande, & du plus bel éclat, citron vif, ornée fur les bords près de la tête, de deux flammes cerise en dehors, & citron clair en dedans.

755. Trois Cames polies, dont une des Indes très - grande & peu commune, mais un peu fruste, blanche, de sorme très-bombée, à charnière formée dans l'une des valves de trois grosses dents sous les sommets, & de deux latérales, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes de l'autre valve : & deux de l'espéce des précédentes, dont une citron en entier-

756. Idem.

757. Trois Cames d'Amérique: sçavoir, une de la Jamaique, peu commune, blanche, de forme applatie, à stries circulaires très-fines, & à charniere composée de quatre dents dans

Tie rah l'une & l'autre valve *; & deux de S. Dominass. fig 124. gue, polies, de l'espèce des précédentes.

758. Six Cames par pendans: scavoir, deux Adans. Hist. du sénég. pl. de la Méditerranée, blanches, flambées par 26. fig. 5.

zones de canelle foncé, à charniere comme celle des Peignes sans oreilles, & nommées Fu- III. Fam.

ries *; deux blanches, teintes de jaune vers la *Bonan. cl.
tête, à rayons peu prononcés couleur de rose, 2. n°. 60 &c
à stries circulaires fines & égales en dehors, Gualt. tab.72litt. G.
blanc teint de circon en dedans, & à charniere Adans. Hist.
composée de trois dents dont une latérale dans du séa. pl. 18.
une des valves, & de deux dans l'autre * List. tab.
deux de S. Domingue, polies, de l'espèce des 299. £ 236.
précédentes.

759. Deux Cames des Indes, très-rares, l'une marron foncé, de forme bombée, à firies fines longitudinales canelle, à bords dentelés en dedans, & à charniere comme les premieres de l'article précédent, espèce nommée en Hollande l'Eventail des Meanonites; & une plus petite, qui n'en dissére que par sa couleur moins foncée, & deux grandes taches latérales blanches rayées par traits fins en zig-zag jonquille. Cette definiere a beaucomp de ressemblance avec l'Orpheline dont parle M. d'Argenville dans son appendice *, & qu'il range parmi les Peignes sans oreilles.

* Arg. App. pl. 3. lett. C.

760. Sept Cames: squvoir, une de la Méditerranée, gris de lin mué de sauve soncé, à stries circulaires & longitudinales très-sines, à bords dentelés en dedans, & cà charnière comme celle des premieres de l'article 758. Cette Coquille est aussi rare à trouver dans la mer,

III. FAM. CAMES.

qu'elle est commune fossile; deux des Indes, de forme applatie, blanches marbrées en zig-zag d'orangé - brun, à stries fines circulaires . à charniere formée de trois petites dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nom-

Arg. Pl. mées le Point d'Hongrie *; deux de forme Rumph. tab. moins applatie, ventre de biche, à un large

litt. C. Lift. tab. rayon blanc sur le milieu du corps *; une en-232. fig. 128. core plus bombée, blanche, à grandes taches circulaires rougeâtres, interrompues dans cha-

* Ibid. tab. que valve par deux rayons du fond *, & une 295. fig. 131. petite blanche & platte, à stries fines longitu-

* Ibid. tab. dinales tuilées *. 311. f. 147.

761. Huit Cames, dont six par pendans: sçavoir, une rare des Indes, violette, nuée par zônes & par rayons longitudinaux de blanc tant en dedans qu'en dehors, à stries fines circulaires, à charnière formée dans une des valves de deux grosses dents, avec deux cavités sur les côtés, & une troisieme entr'elles, qui reçoivent les trois dents de l'autre valve; deux petites d'Amérique, peu communes, blanches, à stries fines onduleuses bien prononcées *;

301. f. 142. quatre petites de la Jamaique, à zônes rouges

de diverses nuances tant au dedans qu'au dehors, & à stries onduleuses sines & serrées *;

339. £ 176. & une des Indes, de l'espéce de la premiere de l'article 757.

762. Six Cames de forme très-bombée, & à

coque épaisse : sçavoir, deux d'Amérique, = blanc sale, à quatre flammes longitudinales fau- IIL FAM. ves, à stries transversales nombreuses, minces CAMES. & ridées, laissant entr'elles de profondes cannelures. & à charnière comme celle de la premiere de l'article précédent, espéce nommée Clonisse *; deux Clonisses de la Méditerranée, * List. cabi qui différent de celle-ci en ce que les stries en 185. fig. 123. sont plus arrondies, traversées vers les côtés f. 1. d'autres cannelures, qui les rendent en cet endroit comme ficelées, & en ce que la robe en est couverte de petites marbrures très-fines en zigzag fauve-roux *; & deux de même espéce. * List. 1161. 284. f. 122. dépouillées de leurs stries. Gualt. tab.75.

763. Six groffes Cames par pendans: sça-litt. H.
voir, deux du Sénégal, fauves, revêtues d'un
épiderme noir, à stries ou rides circulaires trèssines, & à charniere formée dans chaque valve
de quatre dents: c'est le Pitar de M. Adanson,
mais du double plus grand que celui dont parle
l'Auteur *; quatre de la Méditerranée, dont
deux couleur de tuile, à coque épaisse, à charsénég. pl. 16.
f. 7.
niere comme celle des Peignes sans oreilles, & f. 108.
à rézeau très-sin, revêtu dans l'une & dans
l'autre d'un drap marin, qui imite le velours *; * Gualt. tab.
& deux lisses sauve soncé, rayonnées de fauve

73-litt. A.
Bonan. cl. 2.
clair, à charniere composée de trois dents s. 80.

dans chaque valve *.

* Gualt. tab.

764. Quatre belles Cames des Indes, de 16. litt. A.

CAMIS.

forme bombée, dont deux blanches marbrées III. FAM. en quelques endroits de violet pâle. & par larges traits en zig-zag de brun obscur, à sfries circulaires très-fines, & à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, & de * Gualt, tab. quatre dans l'autre *; une de même espèce, peu 82. litt. H. Lift. tab. 262. commune en ce que les traits en zig-zag y sont

È. 98.

orangé; & une fauve foncé rayonnée de marron de diverses nuances en dessus, citron, bordée de blanc en dedans, & à charniere * Ibid. tab. comme dans la premiere de l'article 757*.

241. f. 84. Gualt. tab.71. litt. C.

765. Huit autres de mêmes forme & charniere: scavoir, denx blanches, à rayons formés de traits & de taches triangulaires rouge-brun, imitant des caracteres, & à stries circulaires * Lift. tab. très-fines *; deux blanches ornées par zônes

457. 1. 91. Gualt, 120.82. fines & serrées de traits en zig-zag canelle soncé, litt. G.

258. f. 94.

6g. 16.

Valent, biv.

à stries fines transversales. & jaune d'or en de-* Ibid. tab. dans *; deux blanches rayonnées de canelle clair: & deux de la variété des premieres de l'article précédent.

71. litt. O.

766. Six autres: sçavoir, deux blanches, à rayons formés de taches & de traits fauvenoirâtre. & à stries circulaires bien prononcées; une blanche marbrée de raches & de chevrons fauve-roux, à stries circulaires plus fines, à charniere comme les précédentes *; une des Indes, peu commune, polie, blanche teinte vers les bords, en partie de rouge pâle, & en partie de bleu tant en dehors qu'en dedans, & la charnière comme celle de l'article 148; III. Fam. une blanche bariolée de traits pourpres for Cames. mant un rézeau à taches triangulaires du fond 2; 36. 11°. 18. & une de l'espèce des premieres de l'article List. tab. 2781 f. 107. précédent.

GENRE SECOND.

CAMES A BASES RONDES IRRÉGULIERES.

767. DEUX grandes Cames des Indes, blanches, marbrées par grandes taches, & rayonnées de fauve brun, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, celles-ci plus saillantes, les autres plus fines formant un réfeau celluleux, à charnière composée dans chaque valve de trois grosses dents, & à valves garnies de deux lévres latérales se recouvrant l'une l'autre, espèce nommée en Hollande le Rayon de miel*.

* Ibid. tab.

768. Deux grands Rayons de miel de Saint-336. f. 173. Domingue, blanc fauve, à stries transversales très-saillantes, & en vive arrête, & du reste semblables aux précédens *.

769. Deux Cames de Bengale, blanches, tab. 41. lit. 8. ernées de traits fauves en zig-zag, réticulées, f. 178.

III. FAM. Cames.

granuleuses, à charniere souci, composée dans l'une des valves de trois dents, & de deux dans l'autre, & à lévres latérales se recouvrant plus

Lift. 2015, exactement que dans l'espéce précédente *. 335 . f. 172.

770. Six Cames d'Amérique & par pendans; scavoir, deux blanches, à coque épaisse, de forme presque sphérique, à stries & fascies circulaires peu prononcées, à double finuosité vers les bords de chaque valve, & à charnière formée de trois dents dans l'une des valves. & de quatre dans l'autre : c'est la Jamaique de M.

Lift. tab. coc. f. 138,

*Arg. pl. 11. d'Argenville *; deux semblables, polies, d'un lett. N. bel éclat. & nommées Billes d'yvoire; deux peu différentes des précédentes, quant aux plis latéraux des deux valves, mais de forme applatie, jaune clair en dehors, & souci en dedans, à charniere composée de trois dents dans l'une des valves, s'engrainant dans trois cavités correspondantes, l'une à stries circulaires fines & lamelleuses, l'autre dépouillée & polie : on les * Ibid. rab. nomme Abricots *.

300. f. 137.

771. Six autres; sçavoir, deux blanches en dehors, jonquille en dedans, de forme bombée, à stries circulaires très-fines, & fascies peu marquées, à deux sinuosités de chaque côté des sommets, & à charniere formée d'un très-petit filet transversal se logeant dans une rainure correspondante *; deux de l'espéce des premieres de l'article précédent, mais dans l'état où elles

260, £. 96.

ont été tirées de la mer : leurs stries sont fines & lame leuses; & deux Abricots, dont un peu III. FAM. commun, en ce qu'il est blanc, & l'autre poli CAMES. de la variété des précédens.

772. Huit autres; sça oir, deux peu communes, dont une blanche nuée d'amaranthe clair, & une blanche nuée de laune, toutes deux papyracées, à stries fines transve sales, serrées & peu marquées, & longitudinales fines aussi, mais plus distantes & mieux prononcées, à valves s'avançant & se relevant d'un côté, ce qui rend la Coquille béante en cet endroit où les bords sont dentelés, & à charniere composée dans l'une des valves de trois dents, dont une petite sous le sommet, & deux minces latérales s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve; une de la Jamaïque, blanche & lisse, à valves prolongées d'un côté, mais jointes exactement. & à charnière fo-mée de trois dents dans les deux valves *; une des Indes, blanche, de forme peu renflée, ornée 274 f. 110. d'un compartiment très-serré de petites tuiles de champ, à sinuosité dans un des bords latéraux de chaque valve, à charniere composée de deux dents latérales, & d'une sous les sommets dans chaque valve, nommée Guillochie*, * Gualt, tabe & grande dans cette espèce; deux petites ver- 76. litt. E tes, à bords sinueux & à stries circulaires la-fig. 141.

Tome I.

338 COQUILLES BIVALVES

melleuses *; & deux de l'espéce des premieres des articles 770 & 771.

CAMES.
* Gualt. tab.
77. litt. Q.

191. f. 234.

773. Cinq Cames à bords sinueux d'un côté; sçavoir, deux des côtes de Normandie, blanches, teintes légérement de citron, tant au dehors qu'en dedans, à stries & fascies transversales très-sines, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre*; deux Guillochées tachées de sauve, & un Rayon de miel de la variété de ceux de l'article 767.



GENRE TROISIÉME.

CAMES A BASES OVALES RÉGULIERES.

774. UNE grande & belle Came des Indes, peu commune, blanche marbrée dans les deux III. FAM. tiers de chaque valve d'un beau violet, polie, CAMES. & à charniere formée de trois grosses dents sous les sommets, & d'une quarrieme latérale *.

775. Une Came des Indes, rare, marbrée 81 par grandes zônes de fauve, de couleur de chair & d'aurore, à rayons longitudinaux de nuances plus foncées que le fond de brun & de marron. interrompus en quelques endroits de blanc, à stries larges & applaties, à charnière comme celle qui a été décrite dans l'article 748, & très - grande dans son espèce, nommée Cedo nulli *.

* Lift. tabi 776. Une belle Came des Indes, blanche, à stries longitudinales & transversales, celles-ci un peu ondées & formant avec les autres un rézeau granuleux vers la tête & les côtés, à bords épais, taillés en biseau, & très-finement dentelés, à charnière formée de deux dents dans chaque valve, & grande dans son espéce, nommée la Tricotée ou la Corbeille *.

Gual. tab. 75.

III. FAM. CAMES.

777. Deux belles Cames un peu moins grandes que les précédentes; sçavoir, un Cedo nulli de couleurs très-vives, & une Corbeille teinte sur les côtés de couleur de rose.

778. Six Cames par pendans; sçavoir, deux du Brésil, lisses, couleur de chair, ornées de taches fauve brun, quarrées dans l'une, & en zig-zag imitant le point d'Hongrie dans l'autre. à charnière composée de trois dents dans chaque valve, & nommées Cames truitées *; deux

86. litt. I. Lia. tab. 170.

des mêmes mers, de forme applatie, à zig-zags plus nombreux, diversement entrelacés, de couleur violette sur un fond blanc-jaunâtze, à stries plattes circulaires, à bords très-finement dentelés, & à une grande tache violette au dedans de chaque valve, espéce nommée le Zig-¿ag *; & deux blanches marbrées vers la tête

* Arg. App. pl. 1. lett B. List. tab. 378. £. 221.

& l'un des côtés de fauve brun, à groffes stries longitudinales granuleuses, & comme ficelées, devenant obliques vers le côté finueux. à charniere de quatre dents dans chaque valve, espéce nommée Came-feuille ou l'Amande *.

Lift. tab. 412. fig. 148. Gualt tab.75.

779. Trois autres, sçavoir, une Corbeille teinte en dedans de citron, & deux Cedo nulli en pendant.

780. Quatre Cames des Indes; sçavoir, une blanche à deux larges faisceaux de taches gris de lin, à cinq fascies circulaires peu prononcées, & peinte en dedans par les Chinois, pour servir

à un de leurs jeux, dans lequel il s'agit d'apparier, avec le plus de promptitude, les deux val- III. FAN. ves d'une même Coquille, mêlées à deffein avec celles d'un grand nombre d'autres; deux Cames - feuilles marbrées presque entiérement de fauve roux, & teintes de bleu aux sommets: & une Came truitée: toutes, à l'exception d'une des Cames-feuilles, sont grandes dans leur espéce.

781. Cinq Cames des Indes; scavoir, une peu commune, fauve nué de gris, à un petit nombre de rayons étroits d'une nuance plus foncée, à stries circulaires égales & applaties comme dans le Cedo nulli, mais moins larges & à charniere formée de quatre dents dans les deux valves; deux à peu près semblables & de même fond, mais ornées de petits chevrons gris-verdâtre plus prononcés dans quaire rayons & vers le bas que dans le reste, & à charniere composée dans l'une des valves de trois petites dents, & de deux dans l'autre; & deux petites Cames-feuilles blanches.

782. Vingt-quatre petites Cames des Indes; scavoir, dix-fept lisses & du brillant de l'agathe, de marbrure & couleurs fort variées, à rayons plus ou moins prononcés & de forme bombée, connues sous le nom général de Cames luisantes *; deux Zig-zags de la variété de l'article 778; trois autres qui n'en différent qu'en 379. fig. 222.

ce qu'ils sont lisses & à traits canelle plus sins & plus nombreux 1: & deux Rayonnées 2. III. FAM.

CAMES. Lift. tab. 487. f. 224. Rumph. 12b. 42. litt. M. ² Ibid. litt. L. 96. litt. B. 4 Lift. tab.

429. f. 2-3.

783. Neuf Cames d'Amérique, sçavoir, deux blanches nuées de citron & de violet 3; deux rayonnées de blanc & de violet 4; une à Find. Htt. L. faisceaux alternatifs des mêmes couleurs : deux blanches à tête cerise, nuées plus bas de couleur de rose, toutes les sept à stries longitudinales bien prononcées, & à stries fines circulaires formant, sur-tout vers les bords, un rézeau granuleux, à valves un peu béantes dans l'un des côtés, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux denns : pne blanche à trois zônes couleur de rose, à firies longitudinales ondées, plus grosses que celles des précédentes, & à charnière formée d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre; une de l'espéce des deux premieres de cet article, mais polie & blanche, bordée de violet; & une des Indes, qui ne différe des troisseme & quatrieme de cet article, qu'en ce qu'elle est plus

> 784. Douze Cames par pendans; sçavoir, dix de la Méditerranée, dont deux à stries longitudinales & transversales très-fines, marbrées & rayonnées de brun & de gris de lin, sur un fond blanc 1; deux pen différentes pour les couleurs, mais à fimples stries circulaires applaties comme dans le Cedu nulli; deux gris de lin,

grande & nuée de jaunâtre.

Gual tab. Be. litt. H.

rayonnées de blane, à stries circulaires trèsfines; deux à stries semblables, ornées d'un def- III. Fam. sein canelle en rézeau; deux autres à robe par-CAMES tie blanche, chargée de traits fauves en zig-zag très-déliés, & partie marbrée par grandes taches de gris de lin, toutes à charniere formée de trois dents dans l'une & l'autre valve : & deux Cames violettes polies de l'espèce de celles de l'article précédent.

785. Deux grandes Camés des côtes de Bretagne, rayonnées de blanc & de fauve de diverses nuances, à coque mince, & à charnière composée dans l'une des valves d'un chevron sous le sommet, & de deux lames latérales qui se logent sous un chevron semblable, & entre quatre lames correspondantes de l'autre valve.

786. Douze Cames des mêmes parages. grandes & de moyenne grandeur; fçavoir, une blanche à une large zône verte près des bords, & une petite de même couleur sur les bords mêmes; une blanche à trois zônes fouci, & à firies circulaires inégales; deux blanc sale à fascies circulaires inégales & peu prononcées; deux nuées de fauve & de gris; une blanche rayonnée de sauve, à tête & intérieur nué de violet *; une blanche à zônes fauves peu prononcées; deux 387. f. 230. entiérement blanches, & deux de la variété de celles de l'article précédent, dont une blanche

COQUILLES BIVALVES 344

en entier, toutes à charniere à peu près sembla-III. FAM. ble à celle qui est décrite dans le même article. CAMES. .

GENRE QUATRIEME.

CAMES A BASES OVALES IRRÉGULIERES.

787. U NE grande Came des Indès, à stries transveriales fines & applaties, ornées d'un des-· fein de tra ts en zig-zag violet-noir, qui se croisent diversement l'un l'autre, & forment plufieurs lozanges sur un fond blanc, à charniere composée de trois dents dans l'une des valves. & de deux dans l'autre, espèce que l'onnomme

Arg. pl. 21. en France Ecriture Arabique ou Chinoise, & en Hollande la Natte de jonç,

List. tab. 402. fig. 246.

788. Une Ecriture Chinoise de même gran-Gualt. tab. 86. deur & de même fond, mais peu commune en litt. F. Valenyn. biv. ce que la marbrure brune y est jettée partie par fig. 13. grandes taches, partie par chevrons, dont

* Ibid. f. 10. quelques-uns se réunissent en zig-zags *,

789. Une autre différente des précédentes, en ce qu'on n'y remarque aucun zig-zag, mais seulement de grandes taches noisette sur un * Ibid. f.y. fond paille *.

790. Deux Ecritures Chinqises de moyenne

grandeur, l'une tenant à la fois des deux variétés décrites aux articles 787 & 788; & l'autre à III. FAM. zig - zags jettés par zônes, & à taches par fais-CAMES. ceaux de rayons.

791. Trois Cames rares: scavoir, une marron clair de la forme d'une amande revêrue encore de sa coque, à robe en rézeau granuleux, sur laquelle on remarque d'espace en espace des stries ou suites longitudinales de grains, plus élevées que les autres, & d'où naissent vers le bas des franges ou plumaceaux de petites feuilles flexibles; Coquille que l'on peut nommer l'Amande à cils, & dont Séba regardoit la pareille qu'il possédoit, comme unique *; une des Indes, marbrée de jaune, de marron & 88. nº. 13. de brun-noirâtre, à l'exception d'une avance fin. tab.6. Livers la tête, qui est blanche, à stries longitudinales, à bords dentelés, & à charnière formée dans l'une des valves, de deux dents, dont une latérale & très-longue, lesquelles s'engrainent dans une cavité & une rainure correspondante de l'autre valve *; & une fauve clair à rayons * valent. He d'une nuance plus obscure, mais peu pronon-val. f. 27. cés, & semblable pour les stries, la forme & la charniere à l'Ecriture Chinoise *. * 1bid. £. 12.

792. Deux autres, dont une comme la seconde de l'article précédent, mais polie, & d'un grand volume pour son espéce; & l'autre comme la derniere du même article.

III. FAM; CAMES. 793. Huit Carnes: sçavoir, six petites des parages Magellaniques, rates, & par pendans; dont deux jonquille, deux soufre, & deux olive, toutes de sorme oblongue bombée, ressemblante à celle d'une petite séve, & nommées de là Féverolles, & deux Estitutes Chinoises de moyenne grandeur, l'une de la variété de celles de l'arricle 787, & l'autre de la variété de la seconde de l'arricle 790.

794. Quatre Cames des Indes: sçavoir, une rare, blanche papyracée, à stries transversales très-sines & inégales, à grosse côte en sorme de pli à l'un des côtés de chaque valve, mieux marquée dans l'une que dans l'autre, & à un second pli moins sensible dans l'autre côté, ce qui donne à la Coquille une sorme un peu tor-

406. f. 252.


vif, & rayons de même couleur peu prononcés, à robe en rezeau fin, granuleux imitant le chagrin, à un large pli dans l'un des côtés de chaque valve, & à charniere formée de trois petites dents, dont une latérale, espèce nommée la Chagrinée ou le Chagrin, & par Rumphius la

*Rumph.tab. Langue de chas *; & une blanche de même 45. litt. G. dualt. uto 76. forme aussi rayonnée, mais à stries circulaires litt. B. *Rumph inégales & crès-sines, & nullement granuleuses *,

sab. 45. litt. I. nommée simplement la Langue.

795. Quatre Cames par pendans: sçavoir, deux des parages Magellaniques, peu commu-

nes, blanc mat, à stries circulaires serrées, minces & tranchantes, à coque épaisse, & à III. Fam. charniere formée de trois dents dans une des Camzes, valves, & de deux dan: l'autre; & deux Langues dissérentes des dernieres de l'article précédent, en ce qu'elles sont papyracées & entiérement blanches.



QUATRIEME FAMILLE.

COURS.

IV. FAM. CŒURS. mes qu'en ce que leurs deux faces latérales, ou tout au moins l'une de ces faces, représentent assez exactement la figure d'un Cœur. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

- 1°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, des cœurs bien formés, & dont les sommets sont sort près l'un de l'autre: on les peut nommer Cœurs proprement diss.
- 2°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, la forme de cœurs, & dont les sommets, fort écartés l'un de l'autre, laissent entr'eux un espace rhombe ou lozange nommé Carenne; genre qui comprend les Arches.

3°. Celles dont une seule des faces latérales représente bien un cœur, lors Cœurs. que la Coquille est fermée, & que l'on distingue par les noms de Cames tronquées ou de Conques de Vénus.

GENRE PREMIER.

CŒURS PROPREMENT DITS.

796. Un Cœur des Indes, blanc & papyracé, à valves pliées chacune en demi-cœur applati, rensiées vers le milieu, & montrant par leur réunion un cœur de forme très - élégante, garni de petites pointes dans tout son contour, à stries longitudinales granuleuses, courbées sur chaque face, à sommet se croisant un peu, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve, de trois petites dents, espèce nommée Cœur de Vénus *.

797. Un très-grand Cœur de Vénus, blanc lett. I. Rumph. taba uné d'incarnat, ayant un côté de ses faces con-43. litt. E. Lift. ab. 3184 cave, à une petite élévation près sous les f. 155 sommets, qui se croisent encore plus que dans litt. B. C. D. le précédent, & à contour dépourvu de piquans, variété qu'on désigne par le nom de Cœur de Vénus en baseau *.

450 COQUILLES BIVALVES

798. Un Cour de Vinus rare en ce que l'une IV. Fau. de ses faces est ornée de petites fascies blanches Et coulour de rose, suivant la direction des stries; le contour de ses valves est sans pointes comme dans le précédent.

799. Un Cœur de Venus en bateau, d'un pesus couleur de rose, à la sommité près de la partie convexe qui est blanche.

800. Un Cœur de Vénus peu commun, ponctué dans sa face convexe de couleur de rose, & bordé dans l'autre de petits traits de même couleur, à deux échancrures vers lebas, & à côtes destituées de piquans.

801. Un Cœur de Vénus en bateau, dont le centre de la face concave est beaucoup plusélevé que dans les précédens, moucheté d'un côté & rayé de l'autre de gros eraits onduleux fauve-jaune, & légérement dentelé dans son contour.

802. Trois Cœurs de Vénus: sçavoir, deux de moyenne grandeur, dont un blanc, à côtes chargées de pointes, un couleur de rose, à côtes dépourvues de pointes, mais garnies l'une & l'autre de deux petites échanceures paralleles; & un Cœur en bateau blanc.

803. Un Cœur du Sénégal, grand, mince, & de forme presque sphérique, blanc tant au dedans qu'au dehors, excepté sept à huir larges cannelures qui sont canelle soncé, à côtes sor-

mées chacune de trois stries, dont celle du milieu est mince, élevée en vive arrête, & creu- IV. Fame se intérieurement en forme de tuyau, à bords Cœuas. dentelés, laissant entr'eux un jour assez grand quand la Coquille est fermée, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux dents sous les sommets, & d'une très-grande latérale. Cette Coquille, nommée Conque exosique, est très-rare à trouver complette comme celle-ci, dont les deux valves ont certainement appartenu au même Coquillage: c'est le Kaman de M. Adamion *.

804. Une autre Conque exotique plus grande, Pl. 18. f. a. & à valves bien assorties quoique dépareillées.

805. Un très-grand Cœur de la baie de Cam- 48. nº. 4. pêche, peu commun, blanc sale, taché de lin. D. touge pâle en dehors, & de pourpre en dedans, à stries longitudinales bien prononcées, chargées en quelques endroits d'anneaux minces, à charnière formée dans l'une des valves de trois dents s'engrainant dans trois cavités de l'autre valve. & à faces latérales représentant des cœurs inégaux ; le plus grand des deux est teint de rougeatre, & le mieux formé *.

806. Un Cœur de l'espèce du précédent, 348. fig. 1651 mais un peu moins grand, & dont le fond est jaune pâle.

807. Un Cœur rate de Carthagene d'Amézique, fauve, excepte vers les bords qui font

* Adamfon 1 Arg. pl. 234

*List. tala

IV. FAM. ficelées, de forme allongée d'un' côté, & à charnière comme celle de la seconde Coquille

* séba, pl. de l'article 791 *.

808. Un grand Cœur des mêmes parages, peu commun, blanc teint en quelques endroits de pourpre, de forme un peu oblongue de la tête aux bords, à stries arrondies chargées d'anneaux minces & peu saillans, bordé de pourpre en dedans, & à charniere composée dans l'une

* Ibid. n°. 2. & l'autre valve, de quatre dents *.

809. Trois Cœurs, dont un qui ne différe du précédent, qu'en ce qu'il est marbré en dehors de blanc & d'orangé, bordé en dedans de ci* List. tal. tron, & de forme encore plus oblongue *; & deux de S. Domingue, jaune pâle, nués de couleur de rose & de blanc, à stries longitudinales hérissées de periode paisses *

* Ibid. tab. nales hérissées de petites pointes *.

810. Trois autres, dont un de Carthagette, à trois zônes amaranthe clair, la dernière formant une bordure qui s'étend en dedans, & y devient plus foncée, & à valves un peu béantes

* Séba, pl. des deux côtés *; un de l'espèce du premierde l'article précédent, mais plus petit; & un comme les derniers du même article.

> 811. Deux Cœurs de la Jamaique, blancs teints de fauve, & tachés en quelques endroiss de pourpre clair en déhors, & de rouge pale en dedans, à stries longitudinales, chargées dans

dans toute leur étendue & à distances égales, de petites tuiles, à charniere comme les pré- IV. FAM. cédens, & nommés Cœurs de bœuf tuilés, Cœurs. tous deux de la plus parsaite conservation *. *Arg. pl. 2

812. Deux Cœurs de la Jamaïque, blancs, à leit. M. 3231 groffes stries chargées d'anneaux cerise, finissant f. 166. par de prosondes dentelures, à côtés inégaux, dont le plus allongé représente le mieux un cœur, & grands dans leur espèce nommée la Fraize*.

813. Six cœurs par pendans : sçavoir, deux 316. fig. 153. Fraizes à stries plus fines, chargées d'anneaux litt. A. Bonan. cl. 30 jonquille très-serrés, excepté vers les sommers f. 375. qui sont blancs & dépourvus d'anneaux, nommées Fraizes blanches *; deux petits blancs des * Lin. tabl Indes, à stries ficelées & cannelures piquetées. 315. f. 152. à valves composées de trois faces; dont une applatie. & nommés Cœurs criangulaires ou Cœurs en souffles * 1 & deux d'Amérique, blancs * Gualt, mbe marbrés l'un de fauve, l'autre de jaune & de 38. lit. C. rouge-brun, à stries longitudinales bien pro- 44 litt. H. noncées, de forme plus courte & plus bombée. mais d'ailleurs affez ressemblante à celle des précédens, nommés en France Cour de pigeon, & en Amérique Caur de l'homme *. * Bonan. cl.

814. Quatre autres par pendans, dont deux Cœurs triangulaires, grands dans leur espéce, & deux Cœurs de S. Domingue, blancs nués Tome I.

d'aurore & de jonquille, de l'espèce des der-IV. FAM. niers de l'article 809.

CŒURS.

815. Six Cœurs des Indes, peu communs: scavoir, un oblong de la tête aux bords, blanc, à grosses stries longitudinales ornées de petits chevrons bruns, à une avance latérale près des sommets, & à charniere comme celle de la seconde Coquille de l'article 791, espéce nommée le Cœur allongé *; un fauve-roux de forme encore plus allongée, à groffes stries

947. f. 184. 90. litt. F.

eadem.

longitudinales un peu tuilées *, un de même espéce partie blanc & partie gris*; un petit blanc à stries fines longitudinales & rides onduleuses seuilletées transversales *; un blanc marbré de fauve-roux, de forme moins sinueuse & moins allongée que les précédens, à groffes

Aries longitudinales, chargées d'autres transversales en forme d'anneaux, & à charnière

comme les quatre premiers de cet article *; & un petit Cœur souti, à stries fines longitudinales. & à charniere formée de trois denrs dans l'une des valves, qui s'engrainent dans trois cavités correspondantes.

Valentyn, bival. f. 30.

> 816. Deux grands Cœurs de la Méditerranée, fauves à la tête, marron foncé dans le reste, à larges fascies circulaires peu prononcées, à sommets, contre l'ordinaire des Coquilles de ce genre, écartés, recourbés en sens

contraire l'un à l'autre, & bleus en cet endroit, à charnière formée dans les deux valves, de IV. FAM. trois larges dents, dont une latérale, espèce cours. nommée en France Boucarde ou Cœur de bœuf, & en Hollande Bonnet de fou*.

817. Deux grands Cœurs de la même mer: 86. n°. 1.

scavoir, un fauve nué de blanc & de bleu pâle, litt. E.

de forme très-bombée, à grosses stries longitu-s. 111.

dinales hérissées de pointes plus ou moins longues, à charniere composée de cinq dents dans

l'une des valves, & de quatre dans l'autre, &

nommé Cœur de bœus épineux*; & l'autre fauve- *Arg. pl. 23:

roux, à stries moins grosses, plus serrées & plus séba, pl. 86.

chargées de pointes que le précédent, espèce

nommée simplement Cœur épiqeux*.

litt. A.

*Séba, pl.

*Séba, pl.

*Séba, pl.

818. Les mêmes Coquilles un peu moins 86. n°. 3.

grandes.

819. Six grands Cœurs de la Méditerranée:

scanolires deux blancs, à grosses stries & larges
cannelures longitudinales, à stries transversales
onduleuses très-fines en forme de rides, dans
l'un desquels les grosses stries sont chargées surtout vers le bas, de quelques tuiles ou mammelons *; deux qui n'en dissérent qu'en ce qu'ils * Bonan. cl.
sont rayés par zônes inégales de blanc, de sauve 2. f. 97.
& de rouge-brun, & sans tuiles *, tous à charniere comme les précédens; un Cœur de bœus 86. nº. 7.
Bonan. cl. 20.
spineux, & un Bonnet de sou.

S20. Huit Cœurs de moyenne grandeur, litt. M.

Zij

356 COQUILLES BIVALVES

des espéces décrites dans les articles 809, 816,

IV. FAM. Cœurs.

821. Deux Cœurs d'Amérique, blancs, à stries longitudinales herissées de très-longues épines creusées en tuyaux, à cannelures chargées de petits grains, ainsi que la face, qui représente le mieux un cœur, au milieu de laquelle est un léger sillon; à charniere comme celle des Huitres seuilletées, & nommés Marrons épineux, à l'un desquels adhère un autre Cœur de l'espèce des Vieilles ridées, de la quatrieme variété décrite article 843.

822. Idem.



GENRE SECOND.

ARCHES.

823. LEUX petits Cœurs des Indes, à carenne étroite, rares & en pendant, de la forme IV. Fam. d'une amande dépouillée de sa coque, à robe cœurs. en rezeau granuleux très-sin, l'un brun-noirâtre, l'autre fauve-roux, à l'exception de deux petites bandes longitudinales blanches, qui dans l'un & l'autre s'étendent des sommets aux bords des deux valves, & nommés en Hollande Amande rotie: leur charniere, ainsi que dans toutes les Coquilles de ce genre, est presque égale à la largeur des battans, & composée d'une suite nombreuse de petites dents dans l'une & l'autre valve.

824. Un Cœur des Indes, très-rare, canelle dans le corps, blanc vers les bords, & teint de violet en dedans, à carenne fort oblongue, à valves applaties vers l'une des faces latérales, qui représente un cœur des mieux formés, à stries fines longitudinales accouplées, traversées d'autres encore plus fines & plus serrées, & à larges avances ou appendices intérieurs en forme d'oreilles: cette Coquille provient de la

IV. FAM. CŒURS.

vente de la vente de M. l'Abbé de Fleury qui la nommoit Coqueluchon de Moine: elle porte près de quatre pouces sur trois.

825. Un autre Coqueluchon de Moine moins grand. & de couleurs plus foncées que le précédent.

826. Un Cœur de la Jamaïque, peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales, larges & applaties, à carenne large, à coque épaisse & pesante, à bords intérieurs profondément découpés, & à dents de la charniere lamelleuses, plus grandes que dans toutes les Co-

* Lift. tab. quilles de ce genre *.

238. f. 72. Gualt. tab.87. Lit. D.

827. Trois Cœurs: sçavoir, un peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales chargées par zones de petits tubercules, à carenne oblongue, & grand dans son espèce, nommée par

*Arg. pl. 23. M. d'Argenville la Corbeille *; & deux d'Amé-Lett. C. Gualt, tab. 87. rique, blanc sale, à stries longitudinales chargées de petits anneaux, à carenne lozange,

* Arg. App. large dans l'un *, étroite dans l'autre : celui-ci a pl. 3. lett. H. List. rab. 240. les valves un peu inégales dans le bas.

£g. 75.

828. Cing Cœurs: fçavoir, deux d'Amérique, blancs, à stries longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, d'autres très-fines transversales, & à carenne peu large & fort al-

* Ibid. tab. longée *; un comme le premier de l'article Gualt. tab.87. précédent, & deux comme les autres du même Rumph. tab. article.

44. litt. I.

829. Trois Cœurs: scavoir, deux grands en pendant, à chevrons alternatifs blancs & fauve- IV. FAM. roux; à stries longitudinales un peu rabotteuses, à valves béantes vers le bas, à carenne large & fort allongée d'un côté, ainsi que la forme de la Coquille, nommée Arche de Noé, à cause de sa ressemblance avec un navire *; & un semblable *Arg. pl. 23. au premier de l'article 827,

Rumph. tabe

830. Cinq Cœurs: sçavoir, deux de l'espèce 44. litt. P. des premiers de l'article 828, mais beaucoup plus grands; & deux grandes Arches de Noé, sur la carenne de l'une desquelles adhére une autre petite Arche de même espéce.

821. Neuf Arches de Noé, dont quatre à-peuprès semblables à celles de l'article 829, mais moins grandes, & de couleurs plus vives *; *Gualt. 126. une qui n'en différe que par sa forme moins al-87. litt. H. longée, & par sa carenne qui est très-large *; * Ibid. 97: 184 une blanc-fauve, & une brune, qui ont ceci de particulter, que leurs carnes latérales sont chargées de petites seuilles, que la carenne en est marron foncé, & leur robe réticulée *; & deux *15id. lit.G. blanches papyracées, à robe réticulée, à carenne étroite & creuse; l'une de forme large & applatie, bordée de Drap marin, & l'autre de la forme ordinaire.

832. Treize Arches de Noé de différentes: grandeurs & des variétés de l'article précédent

GENRE TROISIEME.

CAMES TRONQUÉES ET CONQUES DE VÉNUS.

IV. FAM. CŒURS. blanc & lisse, à coque mince, à valves de sorme ovale, applaties vers l'un des côtés, où elles représentent une espéce de cœur sort allongé, dont le contour est relevé d'un pli en vive arrête, à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, dont deux latérales, s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve, & connu sous le nom de Came

* Gualt. tab. coupée *.

834. Une rare & très-grande Came coupée, différente de la précédente en ce qu'elle est à coque épaisse, de forme plus bombée, que le contour du cœur qu'elle représente n'est point en vive arrête, & que les dents de sa charnière en sont plus grosses & moins allongées.

835. Une Came coupée très-rare, blanche & polie, nuée par zônes & par traits longitudinaux de violet, à retour des valves en forme de cœur, chargé de stries sines longitudinales

ondées partant d'un sillon ovale, & représentant une chevelure flottante, à charniere for- IV. FAM. mée dans l'une des valves, d'une seule dent, Course. & de deux cavités recevant les deux dents de l'autre valve, à bords dentelés, & nommée par cette raison en Hollande la Scie *.

* Séba, pl. 86. nº. 11.

836. Deux Cames coupées des Indes orientales, peu communes, blanches teintes de violet tant en dedans qu'en dehors, à robe finement reticulée, à applatissement des valves en forme de cœur bordé vers le bas de petites feuilles tuilées. à stries transversales lamelleuses. en vive arrête près des bords, & à charniere composée dans l'une des valves, de quatre dents, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes. On nomme cette espèce la Came soupée en bec de flûte *.

837. Quatorze petites Cames coupées des lett. L. Indes, & par pendans: sçavoir, six blanches, f. 220. Rumph. tab. trois en entier, & les trois autres nuées de violet, 43. litt. F. toutes à stries fines longitudinales, à bords dentelés, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de quatre dents *; quatre de forme femblable, dont deux canelle & deux citron; tab. 376. fig. deux rayonnées de blanc & de canelle foncé, Gualt tab.890 lisses dans le corps, à stries fines, granuleuses litt. D. sur la face tronquée, de forme plus applatie que les précédentes, à charnière composée dans chaque valve, de trois petites dents, & nom-

mées Radiées * : & deux Cames en bec de flûte. 838. Quatorze Cames coupées: scavoir. IV. FAM. CŒURS. deux d'Amérique, blanches, revêtues de leur * Gualt, tab. épiderme verd de terrasse, nuées de violet en 88. litt. O. Arg. pl. 22. dedans, à stries circulaires fines & peu prolett. L. Bonan. cl. 2. noncées. & à charniere comme celle de l'arti-Rª. 47. cle 835; deux de même espéce, mais polies, & dont la robe est devenue par-là d'un beau violet vers la tête, & blanche vers les bords:

* séba, pl. deux petites Scies polies *; quatre Radiées. 6. nº, 10. rayonnées l'une de souci, l'autre de violet, & les deux autres de canelle; & quatre semblables aux premieres de l'article précédent, dont deux nuées de rose pâle.

839. Huit Conques de Vénus: sçavoir, une d'Amérique, lilas nué de blanc, à stries cireulaires saillantes en vive arrête, terminées dans tout le contour de la face qui représente le Cœur, par un rang de longues pointes, & un demi-rang intérieur de pointes plus petites, au centre desquelles, qui est un peu rensté, se trouve une tache ovale violet plus foncé, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de trois dents, espèce nommée Concha Veneris à poin-

* Arg. pl. tes *; un Concha Veneris semblable, mais dé-27. lett. I. Gualt. tab. 76. pouillé de ses stries & de ses pointes, poli, & 21. lett. 1. ett. D. Rumph. tab. devenu par-là blanc, à l'exception de la tache 48. nº. 4. ovale & des endroits où se trouvoient les stries. qui sont restés violet; un Concha Veneris sans pointes, blanc, à stries circulaires moins saillantes, à renflement latéral rouge-brun dans IV. FAM. le milieu, nommé en Amérique la Créole; une Cours. Créole d'une autre variété, lilas nué de blanc, & de forme moins bombée que la précédente; deux Conques de Vénus des Indes, & d'une autre variété peu commune, petites, à robe en rézeau granuleux, blanche tachée de gris, & desquelles le renslement latéral est bordé de petites tuiles au lieu de pointes; & deux autres aussi des Indes, lisses, blanches, à renslement latéral marron, & nommées Gourgandines *.

840. Sept Conques de Vénus : sçavoir, deux 21. lett. P. Concha Veneris à pointes; un dépouillé; une Créole de la premiere variété de l'article précédent; deux Gourgandines canelle pué vers les bords de blanc, & à renslement latéral marron nué de bleu; & un petit Concha Veneris à rézeau qui ne différe des quatrieme & cinquieme de l'article précédent, qu'en ce que la marbrure n'y est jettée que sur les bords, & par trois grandes taches seulement.

841. Dix Conques de Venus : sçavoir, deux Gourgandines l'une souci, l'autre blanche teinte de fauve; une qui ne différe des précédentes que par sa forme plus bombée, par un ensoncement dans le milieu de sa face oblongue latérale, & par ses taches fauves disposées par zônes & par rayons sur un fond blanc, espèce que l'on pour-

IV. FAM. COLURS.

roit nommer fausse Gourgandine; deux autres applaties des deux côtés du sommet, l'une blanche tachée de fauve, l'autre fauve tachée de blanc; & cinq petites des Indes, dont une blanche, à quelques traits pourpre, une canelle foncé. & trois blanches marbrées de violet, de verd & de bleu, toutes à stries circulaires, & à enfoncement latéral sur lequel s'étendent aussi les stries.

842. Quatre Conques de Vénus : scavoir. deux Gourgandines couleur de chair, à renflement latéral fauve, à coque plus épaisse, & de forme beaucoup plus bombée que les précédentes, variété qui n'est pas commune, & deux de l'espéce des quatrieme & cinquierne de l'article précédent.

843. Onze Conques de Vénus d'Amérique: sçavoir, une marbrée de blanc, de fauve & de marron, à stries circulaires groffes & arrondies en bourrelet, excepté vers l'enfoncement latéral, où elles font minces & faillantes en forme *Arg. pl. 21. de petites feuilles, espéce nommée Vieille ridée*;

gualt cab.8c, une Vieille ridée peu commune, blanche, à litt. A. 48 nº. s. Lift. 12b. 279. £ 116.

28. litt. D.

rt. A. Rumph. tab. deux rayons rose séche, à stries circulaires minces, recourbées en forme de feuilles, & découpées le long des bords de l'enfoncement latéral qui est fauve-roux *; deux blanches, à * Gualt. tab. stries fines circulaires en vive arrête, mais peu élevées & fort écartées les unes des autres, à

enfoncement latéral plus profond que dans les précédentes, & nommées Levantine de la petite . IV. FAM. espèce; deux autres blanches rayonnées de traits Cours. & bandes interrompues marron clair & canelle. à stries fines longitudinales. & à stries circulaires en vive arrête, encore plus distantes les unes des autres que dans les précédentes *; deux grises, à trois rayons blancs sur chaque 378. f. 115. valve, à stries transversales serrées, arrondies & bisourchues; deux autres, qui n'en différent qu'en ce que les rayons y sont moins sensibles *, " Hid pale & un Concha Veneris à pointes.

844. Une Conque de Venus orientale trèsrare. gris-verdatre dans le corps, de forme un peu applatie, à coque très-épaisse, à stries circulaires en forme de feuilles tranchantes. nombreuses vers le bas, fort distantes vers le haut. & à enfoncement latéral très - profond fauve-roux: cette Coquille nommée magna Vetula ou Levantine de la grande espéce *, porte trois pouces deux lignes sur deux pouces huit 21. lett. lignes, grandeur très - considérable dans cette 47. nº. s. espéce.

845. Un Cœur des Indes, blanc, à côtes & groffes stries longitudinales, les premieres tachées par intervalles, de pourpre, & chargées de tuiles peu saillantes, à bords très-profondément dentelés, à face représentant le Cœur, concave vers le sommet, & à charnière com-

posée dans l'une des valves, d'une très-grosse dent. & de deux filets longitudinaux, se lo-IV. FAM. Cours. geant dans la cavité & les rainures de l'autre valve, de l'espèce nommée Chou ou Feuille de

*Arg. pl.23. chou, & grand dans cette espéce *. lett. H.

846. Deux Feuilles de chou de movenne Lift. tab. 350. f. 188. Gualt. 126.93. grandeur, en pendant, & très - vives en cou-Rumph. tab. leur.

43. litt. C.

847. Un grand Cœur des Indes, peu commun, à stries longitudinales & transversales fines, mais rabotteuses, formant un rézeau assez grossier, à six grosses côtes chargées à distances égales de tuiles minces presque droites, & de plus en plus grandes, à mesure qu'elles s'approchent des bords, à face représentant le Cœur, applatie & ouverte dans le milieu, & chamiere formée dans l'une des valves, de trois dents, & de deux dans l'autre; espéce nommée Faitiere

4 Arg. pl. ou Tuilée*, & de la plus parfaite conservation. 23. lett. E. 848. Une Tuilée semblable à la précédente, , Rumph. tab. 43. litt. A. 43. utt. A. Gualt. tab.93. à cela près que la couleur en tire un peu sur le litt. B. cirron.

> 849. Une autre Tuilée, nuée de couleur de rose, & un peu moins grande que les précédentes.

> 850. Une autre, blanche vers la tête, couleur de rose vif dans le reste, à seuilles naissantes seulement, de sorme plus applatie, & d'une

variété moins commune encore que les précédentes *.

IV. FAM.

85 1. Une de forme plus étroite, plus oblongue & plus bombée que les précédentes. à tuiles 92. list. G. nombreules partie peu élevées, & partie couchées les unes sur les autres, & à face représentant le Cœur, laissant une grande ouverture ovale dans le milieu, dont les bords sont dentelés en dedans vers le haut, & retroussés en forme de lévres vers le bas.

852. Une autre blanche teinte de couleur de rose & d'aurore, bordée en dedans de cette derniere couleur, à neuf côtes qui ne sont chargées que de tuiles naissantes, couchées les unes sur les autres, de forme large & bombée, & à grande ouverture latérale, semblable à celle de la précédente *.

853. Une très-grande Tuilée d'un pied sept 43. litt. B. pouces de long sur un pied de large, à six f. 190, groffes côtes réticulées, où les tuiles paroissent à peine vers le bas, à intervalles des côtes fort profonds, blanc sale & rabotteuse en dehors, d'un beau blanc en dedans, & conservant encore une partie de son nerf, dont on taille les prétendues pierres jouant l'opale, nommées vulgairement Pierres à queue de paon. Cette Coquille est connue sous le nom de Bénitier,

Rumph. tab.

68 COQUILLES BIVALVES

IV. FAM. COURS. depuis qu'on a employé en effet pour Bénitiers; dans l'Eglise de Saint Sulpice de Paris; les deux valves d'une semblable, dont la République de Venise avoit autresois fait présent à François Premier.



CINQUIEME FAMILLE.

TELLINES.

deux familles précédentes, qui, à proprement parler, n'en font qu'une, par une forme oblongue, & en ce que le fommet des valves ou la charniere sont toujours plus ou moins éloignés du milieu de leur longueur. On peut les diviser en trois genres; sçavoir,

- 1°. Les Tellines exactement fermées ou béantes seulement à l'une des extrémités; leur forme est oblongue, assez platte, plus large d'un côté que de l'autre, & la charniere, ainsi que la tête, en sont placées près du milieu.
- 2°. Les Tellines béantes aux deux extrémités; leur forme est très oblongue, également large, mais peu bombée dans toute leur longueur; la charniere en est plus éloignée du milieu:

Tome I.

370 COQUILLES BIVALVES

V. Fam. Tellines.

3°. Les Manches de couteau, ou Tellines improprement dites, dont la forme est extrêmement longue, également large & bombée dans toute leur longueur; elles sont béantes aux deux bouts, dans l'un desquels est située la charniere.

GENRE PREMIER.

·Tellines exactement fermées, ou béantes seulement a l'une des . Extrémités.

854. UNE Telline des Indes, peu commune, blanche nuée de fauve, recouverte de suites de chevrons gris de lin peu prononcés, à quatre rayons de taches rouge brun, à stries transversales fines & applaties, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nommée Aile de papillon, &

* Arg. App. grande dans son espèce *.

855. Quatre Tellines des Indes, peu communes; sçavoir, une lisse ventre de biche, ornée dans toute sa robe de traits sins en chevrons se croisant diversement, canelle dans le haut, violet

* Lift. tab. clair dans le bas *; deux de même espéce, mais 396. f. 339.

Sius petites & à stries transversales très-fines *; _______ & une Aile de papillon. V. Fans

856. Une Telline de la Chine, rare, à zônes Tabainas; alternatives inégales blanches & couleur de rose 85. litt. H. en dehors, couleur de rose très-vif en dedans, où l'on remarque un surcroit d'épaisseur dans le milieu, & à charniere formée dans l'une & l'aume valve de deux dents *. Cette Coquille, * 151d. litt: ainsi que toutes celles de ce geure qui suivront, List. tab. 390; ont, vers le côté le plus étroit, un pli ou sinuo-f. 233. sue dans les deux valves, qui les rend béantes en cet endroit.

857. Quatre Tellines de même forme que la précédente; sçavoir, deux des côtes de Bretagne, blanches nuées vers la tête de ventre de biche, aurore clair en dedans; & deux des Indes entiérement blanches.

858. Quatre Tellines des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches teintes de jonquille, à rayons couleur de rose, interrompus par quelques zônes de nuances plus soibles, à stries sines transversales, & nommées Tellines radiées *; & * Rumph. deux blanches à extrémité des sommets cerise, tab. 47. litté & dont la sinuosité latérale est moins prononcée que dans les précédentes.

859. Quatre Tellines par pendans; sçavoir, deux d'Amérique, blanches teintes en partie de couleur de chair, à tête cerife, à zône un peu creuse, située vers le milieu, & à sinuosité latérale

Aa ij

presqu'insensible *; & deux Radies, l'une & v. FAM. rayons jonquille & orangé, l'autre à rayons Tellines. couleur de chair foncé & lilas clair, toutes deux List. tab. grandes dans leur espèce.

860. Une Telline des Indes peu commune, couleur d'or en dehors, nuée de cette couleur & de violet en dedans, à valves composées de deux faces très-inégales entr'elles, formant un angle très-obtus: la plus petite de ces faces est granuleuse & bordée du côté de la tête de quelques dents triangulaires: on nomme cette espéce en Hollande Telline-feuille, & en France

* Arg. pl. Langue d'or *.

Rumph. tab. 861. Idem, à cela près que le violet y do-45. litt. K. mine davantage.

862. Une Langue d'or plus grande que les précédentes, jaune-verdâtre en dehors, violet clair en dedans.

863. Deux grandes & belles Tellines d'Amérique, lisses & d'un grand éclat, l'une rayonnée & nuée par zône, de blanc, de cirron clair, de couleur de rose & de lilas, l'autre blanche à deux zônes citron clair, toutes deux à bords un peu sinueux & à charniere comme Arg. pl. les précédentes *.

22. lett. A. List. A. B64. Idem, à quelque légere dissérence près f. 240.
Gualt. tab. 89. dans les nuances.

litt. L

865. Idem.

866. Idem.

867. Quatre Tellines; scavoir, une des Indes, peu commune, d'un beau violet tant en V. FAM. dedans qu'en dehors, & à charniere formée d'une seule dent dans l'une des valves. & de deux dans l'autre; deux en pendant, dont une cramoisi teinte dans une large zône de verd, & une couleur de rose, nuée dans une large zônede blanc, toutes deux de l'espéce nommée Griblette; & une semblable aux dernieres des quatre articles précédens, à cela près que l'on remarque quelques petites zônes couleur de rosevers le haut, & que l'intérieur de chaque valve est couleur d'or.

868 Sept Tellines des Indes de diverses grandeurs; sçavoir, une blanche nuée en quelques endroits de citron, à tête ponceau, & à extrémité latérale doublement sinueuse, formant en cet endroit une espéce de bec allongé, nommée de-là Pince de Chirurgien *; deux de même es- * Gualt. tab. péce, citron clair; deux autres couleur de rose, à un rayon jonquille pâle sur l'une des valves, lett. O.
Rumph. tab. & à stries transversales très-fines; une totale-45. liu. L. ment blanche, & une Telline blanche peu com- f. 237. mune, bombée vers la tête & d'un côté seulement, & à bords tronqués vers le côté finueux & applati *.

869. Dix-huit Tellines de moyenne gran- 89. lut. B. deur & petites; fçavoir, deux d'Amérique, lisses, nuées par zônes, & rayonnées de violet Aa iii.

* Gualt. tab.

TELLINES.

195. f. 138.

& de blanc * : deux à ftries fines transversales rayonnées des mêmes couleurs; deux couleur de rose, à stries fines semblables, nommées Tellines de la Chine; deux blanches, marbrées de traits fins en zig-zag bruns, intercompus par des rayons du fond, teintes en dedans de citron. & à stries transversales fines, mais bien Lift, tab, prononcées *; deux de nos mers. nuées par zônes de rouge, de jaune & de blanc ; deux aurres de forme plus étroite, rayonnées des mêmes couleurs: une blanc fale. à stries transversales obliques & simueuses dans les deux tiers de sa robe, & longitudinales dans l'autre tiers, terminées par des dentelures; une blanche nuée vers la tête de lilas, à groffes stries longitudinales accouplées, traversées d'autres très-sines.



qui ne sont guères sensibles que vers les bords; deux de l'espèce des premieres de l'article 859;

& deux Pinces de Chirurgien. .

GENRE SECOND.

TELLINES BÉANTES AUX DEUX EXTRÉ-MITÉS.

870. SEPT Tellines de nos mers; scavoir. une grande fauve clair, à fascies inégales rabot. V. FAM. teuses & peu prononcées, jettées par ondes, à coque épaisse, de sorme très-oblongue, & à charniere formée dans l'une des valves d'une grosse dent qui s'emboîte sous une cavité correspondante de l'autre valve *; une plus petite * Gualt. tab. de même espèce *; deux blanches teintes de * Rumph. fauve, de forme un peu moins oblongue, & à tab. 45. lit. N. extrémités moins béantes que la précédente; une qui n'en différe que par la forme de sa charniere qui, dans l'une des valves, est formée d'un appendice fort saillant, garni de deux dents qui répondent aux cavités de l'autre valve; & deuxde forme plus courte & plus bombée, nommées par Lister Cames Pholades; elles conservent toutes deux leur animal *.

871. Une grande & belle Telline des Indea, * Arg. 200rare, d'un beau violet, à deux rayons & quel-lett. C.
ques nuances de violet moins foncé, & à charniere formée dans les deux valves d'une lame

Aa iv

V. FAM. Tellines. platte transversale, terminée par une petite dent dans l'une, & par une cavité correspondante dans l'autre.

872. Deux Tellines des Indes, peu communes, sur-tout de cette grandeur, papyracées, à robe violette, ornée de quatre rayons blancs tant en dehors qu'en dedans, & à charniere formée dans les deux valves d'une côte longitudinale intérieure, terminée par deux petites dents dans l'une, & par deux cavités correspondantes dans l'autre, espèce nommée le So-leil levant*

* Arg. pl. leil levant *.

22. lett. P.
Rumph. tab.
45. litt. E.
45. litt. E.
45. litt. E.
46. diterranée, rose séche, à deux rayons blancs
16. 226.

Gualt. tab. 422.

Gualt. tab. 91.

un peu onduleuses, & à charmere de l'espèce

* List. tab. décrite dans l'article 871 *; deux d'Amérique, 416. f. 260. Gualt. tab. 91. blanches, à stries transversales peu prononcées, list. C. à valves sinueuses d'un côté, moins béantes que fig. 77. dans l'espèce précédente, & à charnière sem-

Adaní, pl. 19. blable *; & un grand Soleil levant.

* List. tab. 874. Idem, à peu de différence près dans les couleurs.

875. Trois Tellines blanches des Indes, peu communes; sçavoir, une papyracée transparente comme le talc, bombée sur-tout vers la tête, à stries sincs transversales en forme de rides, à une extrémité beaucoup plus béante que l'autre, & à charnière sormée dans s'une &

l'autre valve de deux petits appendices sous les fommets, espéce nommée la Lanterne ou la V. Fam. Papyracée *; & deux qui ne dissérent des deux Tellines. * Guali. tabs premieres de l'article 873, qu'en ce qu'elles sont ?1. list. D. entièrement blanches & de sorme plus courte.

876. Quatre Tellines; sçavoir, une de la Méditerranée, rev tue de son épiderme noirâtre, à valves contournées ne pouvant joindre que près de la tête, très-béantes dans le reste de leur contour, chargées dans l'intérieur d'une excroissance platte, dentelée dans ses bords, à charniere de l'espéce décrite dans l'article 871, & nommée le Bec de canard *; une de même cab. 45 espéce, mais polie & devenue par-là blanc sale teint de gris; une semblable aux deux dernieres de l'article précédent, & une Lanterne.

* Rumph. ab. 45. litt. P.



GENRE TROISIEME.

MANCHES DE COUTEAU.

877. N EUF Manches de couteau : sçavoir, un V. FAM. des Indes, rare pour sa grandeur, gris nué par TELLINES. ondes de fauve, de forme droite, & à charniere, ainfi que toutes celles de ce genre, formée dans l'une des valves, d'une dent applatie se logeant entre les deux correspondantes de List ub l'autre valve 2; deux d'Amérique, fauves nués de blanc, presque aussi gros que le précédent, ² Ibid. tab. mais de moitié moins longs ² ; deux des mêmes 412. fig. supeparages, jaune pâle, à une des exerémités terrior. minés en bourrelet, l'un desquels est revêtu 3 Ibid. fig. vers un bout, d'Ovaires de Buccins 3; & quatre inferior. Arg. pl. 24 de nos mers, dont deux courbes 4; & deux s Gualt, tab, droits s nués de blanc, de gris & de verdâtte. 95. litt. D. 878. Quatre Manches de couteau: sçavoir, deux rares, fauve & lilas, tachetés de pourpre foncé, minces, transparens, & de forme un peu courbe, nommés Gousses de feves 6; & deux de l'espéce des second & troisieme de l'article 90. litt. E. Rumph. tab. précédent. 45. litt. F.



SIXIEME FAMILLE.

MOULES.

C e sont des Coquilles oblongues, non d'un côté à l'autre comme les Tellines, VI. FAM. mais de la tête au bord opposé; elles sont de plus caractérisées par l'égalité constante de leurs deux valves, & par leur forme convexe, large vers le bas, sinissant en pointe aux sommets. Quelques-unes sont encore remarquables par leur belle nacre & les perles qu'on y trouve quelquesois. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

- 1°. Les Moules proprement dites, dont les valves ferment exactement, & dont un des côtés est presque droit, tandis que l'autre & l'extrémité inférieure sont arrondis.
- 2°. Les Moules cylindriques, dont les valves sont sort longues, à peu près également larges des deux bouts, &

VI. FAM.

aussi exactement fermées que dans les précédentes, genre qui comprend les *Pholades bivalves*, nommées *Dattes*.

3°. Les Moules triangulaires, nommées particuliérement Pinnes marines, dont la forme est applatie, à peu près triangulaire isoscele, & dont les valves ne ferment point exactement.

GENRE PREMIER.

MOULES PROPREMENT DITES.

879. NE Moule des parages voisins du détroit de Magellan, dépouillée de sa pellicule, & non polie, blanche vers le haut, violette & pourpre dans le reste, à stries longitudinales un peu ondées, croisées de distance en distance par d'autres transversales jettées par ondes, nacrée d'un bel orient, & offrant aux yeux, tant en dedans qu'en dehors, toutes les couleurs de l'arcen-ciel, à charniere formée d'une dent oblongue sous le sommet de l'une des valves, & d'une cavité de même forme dans l'autre; nommée Magellanique *, & grande dans son espéce.

*Arg. pl. 12.

880. Une Moule Magellanique dépouillée con non polie, plus grande que la précédente, VI. FAM. blanche dans les trois quarts de sa longueur à Moulls. prendre de la tête, & violet nué de blanc dans le reste-

- 881. Une qui ne différe de la précédente qu'en ce qu'elle est toute blanche, excepté quelques nuances de violet jettées par zônes surtout vers le bas.
- 882. Une très-grande Moule Magellanique polie, & dont la robe privée de ses stries, est d'un beau pourpre veiné de blanc & du plus grand éclat.
- 883. Uue autre polie & plus foncée en couleur que la précédente.
- 884. Une autre Moule Magellanique polie, dont les deux valves sont jointes & assujetties ensemble par une bordure d'écaille, & forment ainsi une tabatiere à goulot à l'usage des Indiens, qui ressemble parfaitement à nos poires à poudre.
- 885. Deux Moules Magellaniques polies, dont une remarquable par une excroissance représentant parsaitement une autre Moule qui autoit crû sur la premiere, mais du reste semblable aux précédentes, & que l'on pourroit nommer Moule double; & une autre variété, blanche dans plus de la moitié de sa longueur, bleu-turquin légérement nué de blanc dans le reste, laquelle n'a jamais eu de stries, & dont le dedans

VI. Fam. Mouses. est presqu'entiérement recouvert d'une couche légere, blanche, parsemée d'un grand nombre de petites perses: on n'y apperçoit pour toute charnière que la rainure latérale destinée à recevoir le ligament.

886. Une Moule de la serre des Papous, polie, fauve nuée par ondes de blanc & de couleur de rose, de l'éclat de l'agate, de forme trèsbombée, un peu sinueuse dans son bord insérieur, bossue vers les sommets, d'où naissent deux avances arrondies en portion de cercle: on n'y distingue point de charaiere, maisseulement un sillon léger & fort long, qui se termine dans chaque valve par une dent prosque insersible * cette Coquille a plus d'un demis

*Arg. pl. 12. insensible * : cette Coquille a plus d'un demilett C. Adans, pl. 15. pied de long sur deux pouces neus lignes de f. 1. large.

> 887. Une autre des mêmes parages, & semblable, mais moins grande; & une valve de Moule Magellanique, très-rare, mais un peu fruste, brun-noirâtre tant en dessus qu'en desfous, & portant un pied trois pouces & demi de long sur huit pouces & demi de large.

> 888. Cinq Moules peu communes : sçavoir, trois petites Magellaniques, dont une de forme affez large, blanche & nacrée depuis la tête jusqu'au milieu, bleu foncé nué de blanc dans le reste; une toute violette, à la tête près, qui est blanche, & une entiérement blanche: les deux

entres sont des paragés voifins de Rio de la Place. lisses & polies, à robe violet noir VI. FAM. jouant l'opale, & bordee de violet clair.

889. Quatre Moules de moyenne grandeur, & polies: scavoir, une Magellanique peu commune, nuée d'orangé & de rouge-brun; & trois d'Afrique, dont une marbrée par ondes de lilas, de couleur de rose & de rouge-brun; une marbrée de blanc, de gris de lin & de lilas; une factve tachée de verd, & marbrée par traits en zig-zag de fauve plus foncé: toutes les trois à charniere formée d'une très-petite dent sous le sommet de l'une des valves, qui se niche dans une cavité correspondante de l'autre valve.

890. Quatre Moules : sçavoir, une de Rio de la Plata, revêtue de son épiderme marron foncé, & à charnière comme les dernières de l'article précédent; deux d'Afrique, dont une jonquille clair, & à tête lilas; & une d'un beau verd, ornée dans toute sa robe de traits en zigzag plus foncés, imitant le point d'Hongrie; & une de la terre des Papous, polie, marbrée principalement par ondes de violet, de blanc, de fauve & de verdâtre.

891. Quatre autres Moules polies, dont une violette nuée de gris de lin, & jouant l'opale; une de Rio de la Plata, & deux d'Afrique, semblables aux seconde & troisieme de l'article précédent.

V CAM.

892. Quatre Moules d'Afrique, dont une couleur de paille, à grand nombre de zônes formées de traits en zig-zag fauves, imitant le point d'Hongrie; une à cinq larges zônes alternatives verd fo cé & fauve clair; celles-ci bariolées de traits fins en zig-zag rouge pâle; une blanche, & une jonquille pâle.

893. Deux Moules d'Alger, tessemblantes aux Magellaniques pour la nacre & les couleurs, mais de forme plus étroite & plus allongée, grandes dans leur espèce; l'une desquelles est polie, l'autre revêtue de son épiderme, & adhérente encore à son byssus: leur charnière est de l'espèce décrite article 879.

894. Huit Moules d'Amérique: sçavoir, deux blanches rayonnées de rouge-brun, ayant àpeu-près la forme de la Moule des Papous, & List. tab. nommées Tulipes *; deux de même espèce,

* Lift. tab. 1 359. f. 198.

mais revêtues encore de leur épiderme, partie marron & partie fauve; deux petites de même forme, couleur de rose; & deux petites grises tachées de violer foncé, nuées vers l'un des bords de couleur de rose, à stries longitudinales très-fines, terminées par des dentelures presque insensibles, & à charniere formée de deux trèspetites dents qu'on ne decouvre qu'à la loupe,

lett. K. espèce nommée Gueule de souris, & par M. List tab. 366. Adanson le Dotel*.

Adans. Hist. du Sénég. pl. 15. fig. 3.

895. Trois belles Moules de la Méditerranée, dont

dont une très-grande revêtue de son épiderme noir, de sorme large, & à charnière sormée de VI. Fau. deux petites dents sous les sommets; & deux de même espèce, polies, moins grandes, d'un, beau violet en dehors, blanches bordées de violet en dedans*.

896. Cinq Moules de la Méditerranée, de 11. Int. E. 164. Pespéce des précédentes : sçavoir, deux revê-s. 2014. Pespéce des précédentes : sçavoir, deux revê-s. 2014. Pespéce de leur épiderme brun-noirâtre, à l'une desquelles adhère un groupe de tuyaux vermiculaires; & trois polies, dont deux d'un beau violet veiné en quelques endroits de blanc, & une violette vers le haut, bleu soncé au dessous, & bordée vers le bas d'une zône sauve assez large.

897. Quinze Moules de différentes grandeurs, la plûpart dépouiliées de leur épiderme : sçavoir, deux d'Amérique, blanches au sommet, bleu soncé dans le reste, à charnière sormée de trois petites dents, & chargées l'une & l'autre de deux Huitres blanches papyracées, d'une espèce très-rare; deux petites rousses, de la sorme des Moules des Papous; deux Tulipes; deux Gueules de souris; une Moule de la Méditerranée, de la variété de la dernière de l'article précédent; quatre de nos mers, rayonnées de violet & de bleu; deux aumes bleu soncé, chargées de glands de mer; & une petite boête de semence de Moules de nos mers.

Tome I.

GENRE SECOND.

Moules cylindriques et Pholades BIVALVES, NOMMÉES DATTES.

VI. FAM. Moules. 898. DE UX Moules peu communes en pendant, à coque très-mince, nacrée en dedans, de forme presque cylindrique un peu applatie vers l'un des bouts, à robe partie fauve, & partie chargée d'un dessein en rézeau très-sa, de couleur plus soncée, qui se ramisse vers le bas, & qui a fait donner à cette espèce le nom de Moule arborisée: on n'y apperçoit nulle trace de charniere.

899. Deux Moules arborisées, à ramifications du dessein plus nombreuses & mieux prononcées que dans les précédentes, qu'elles surpassent aussi en grandeur.

900. Dix Pholades bivalves: sçuvoir, deux rares d'Afrique, revêtues d'un périoste brun, à stries sines longitudinales partant du sommer en sorme de rayons, & à bords repliés en partie d'un sur l'autre en dedans des valves; deux grandes d'Amérique, dont une revêrue de son épiderme verdâtre, à stries onduleuses erès-

4 Rumph. fines, & nacrée en dedans *; l'aintre laisse vou tab. 46. lit. F.

la robe blanche de la Coquille dans les parties où l'épiderme a été enlevé; deux petites noires VI. FAM. des mêmes parages 1; & quatre de la Médi- 1 Gualt. tab. terranée, dont deux marron 2; une fauve, & 90. litt. D. Arg. pl. 260 lett. K. Bonan, cl. 26

901. Un groupe de quatre Dattes de la Mé-f. 28 & 23.
diterranée, dont trois grandes & une petite, 317. f. 268.
logées dans la pierre même qu'elles ont creusée; & deux grandes de l'Amérique, dont une polie, l'autre simplement dépouillée de son épiderme, toutes deux parsaitement blanches & nacrées.



GENRE TROISIEME.

PINNES MARINES, NOMMÉES AUSSI JAMBONS ET JAMBONNEAUX

VI. FAM.

de neuf pouces & demi de long, & à coque mince, rouge & transparente; de forme assez large, à huit côtes longitudinales partant dusommet, laissant entr'elles de larges, mais peu profondes cannelures, chargées, ainsi que les côtes, de feuillets minces & couchés, dont quelquesuns s'élevent en forme de tuiles, nacrée en dedans vers le haut, & à charniere formée, ainsi que toutes celles de ce genre, d'un simple ligament, sans aucun vestige de dents.

903. Une Pinne-marine des Indes, peu commune, de près d'un pied de long, de forme plus étroite, & à coque plus épaisse que la précédente, brune en dehors, presqu'entiérement nacrée en dedans, à stries fines longitudinales peu prononcées vers le bas, où elle est chargée d'une grande Huitre de l'espéce des Crêtes de coq.

904. Quatre Pinnes-marines de moyenne grandeur: sçavoir, deux des Indes, dont une

leur de corne, à stries fines longitudinales, & VI. FAM.

de forme assez large vers le bas; l'autre est
fauve, chargée dans une partie de sa robe de
stries qui partent du sommet en forme de rayons
hérissés de tuiles plus ou moins longues, pliées
en cornets ou tuyaux cylindriques vers le bas
des deux valves qui sont coupées à équerre *; *sébe, pre
deux de la Méditerranée, couleur de rose pâle,
presqu'entiérement recouvertes de seuillets ondés & plissés, formant des tuiles nombreuses plus
ou moins cylindriques, & à l'une desquelles
adhère encore son Bysus * Plus un Bysus * Ronan, el'
2. f. 24.
Gualt. tab.782

905. Sept petites Pinnes-marines: sçavoir att. B. deux d'Amérique, couleur de rose papyracées, àstries longitudinales un peu sinueuses, chargées vers le bas de quelques tuiles *; une violette des. * Gualt. taba Indes , à tuiles plus longues & plus nombreu-79. litt. E. ses *; deux papyracées de la côte Coromandel * Arg. pl.222 verdâtres nuées de pourpre, à stries sines non tuilées *; une rate par sa sorme bizarrement. * List. raba contournée , à grosses stries longitudinales peu 371. sig. 212. nombreuses; une de l'espèce des dernieres de l'article précédent, & un Byssus.

906. Dix autres, la plûpart papyracées; sçavoir, trois blanches nuées de couleur de rose *, *Gmilt. tab à dont une a quelques tuiles vers le bas; une 78. litt. C. légérement siaueuse vers la tête *; une gris de *Rumph.

Bb iij

Moures. * Lift tab

170. £ 111.

litt. A.

lin nuée de pourpre, à stries fines longitudina-VI. FAM. les, traversées d'autres encore plus fines *; une violette presque en entier; trois des variétés déja décriter, & une comme la fixieme de l'article précédent, dont les deux valves sont confidérablement arquées. Plus, deux Byssus, & deux plaques de Pinne marine, taillées & polies, imitant la Cornaline.

907. Six Pinnes-marines; scavoir, deux de la

Méditerranée, couleur de corne, à stries longitudinales peu prononcées. & à feuilletures transversales ondées & déchiquetées, couchées * Bonan. cl. les unes sur les autres *; trois de la même mer, 2. f. 23. Arg. pl. 12. dont une de forme moins allongée que les prélett. B.
Gualt. 22b.78. cédentes, de couleur plus obscure, & à feuilletures non déchiquerées; les deux autres sont de l'espèce des deux dernieres de l'article 904; & une du Sénégal, de huit pouces de long, de forme large & applatie, à stries longitudinales nombreuses, hérissées de tuiles plus ou moins longues, dont les plus grandes sont pliées en tuyaux cylindriques. C'est l'Apan de M. Adan-

* Adans pl. fon *.

5. £. 5. 908. Une Pinne-marine de la Méditerranée, de l'espéce des dernieres de l'article 904; elle * stba, pl. porte un pied huit pouces de long *. On a joint 91. nº. 1. à cette Coquille une paire de bas & une paire de gands de Byffus, qui ne cédent en rien à ceux de soie pour la finesse & la beauté. Ils viennent de la Manufacture de Naples.



COQUILLES DE MER.

CLASSE TROISIÈME.

MULTIVALVES.

On range sous cette classe, qui est moins nombreuse & beaucoup moins Multivale variée que les précédentes, les Coquilles composées de plusieurs pièces, ordinairement inégales entr'elles. Nous la diviserons en six familles, qui sont,

- 1º. Les Oscabrions.
- 2°. Les Pholades.
- 3°. Les Tuyaux de mer multivalves.
- 4°. Les Glands de mer.
- 5°. Les Pouce-pieds & Conques ana-
 - 6°. Les Oursins.



PREMIERE FAMILLE.

OSCABRIONS.

M. Adanson a rangé ces Coquilles dans la classe des Univalves, à cause de l'animal qui les habite, qu'il a reconnu appartenir au genre des Lépas; mais, comme nos divisions ne font sondées que sur les Coquilles mêmes privées de leurs animaux, nous ne pouvons nous dispenser de rapporter cellesci aux Multivalves. Elles ont la forme d'un demi-ovoïde, & sont composées de huit écailles courbes, posées en recouvrement les unes sur les autres de devant en arriere, relevées toutes dans le milieu d'une petite côte plus ou moins aigue, & enclavées vers le bas dans une membrane flexible, écailleuse & chagrinée dans son contour, Cette famille ne contient qu'un seul genre,

909. Douze Oscabrions formant fix variétés, scavoir, deux du Chili, à écailles violet-noit nué de jaune vers le haut, traversées chacune dans le milieu d'une bande affez large, & de deux rayons obliques de même couleur que le fond, à côte longitudinale obtuse, & à bords de la membrane destitués d'écailles ou non chagrinés. Leur forme un peu arquée leur donne beaucoup de ressemblance avec une grosse Chenille. ou avec une Chaloupe, dont les membres & les varangues sont représentés par les écailles courbes de la Coquille; deux à-peu-près de même forme, mais moins arqués, bleu céleste en dedans, à contour extérieur de la membrane revêtu de très-perites écailles qui imitent le chagrin, & de plus orné de taches alternatives grises & noires; deux de S. Domingue, plus grands que les précédens, gris cendré en dehors, & chagrinés sur leurs bords *; deux de la *Arg.pl.25. Caroline, gris de lin, nués de verdâtre, à taches séba, tom. 3. brunes triangulaires sur le milieu des écailles, pl. 61, nº. 3 qui sont chargées chacune vers les côtés de deux suites triangulaires de stries partie longitudinales, & partie tra sversales, à extrémités chagrinées ainsi que le contour, & blancs en dedans; deux petits de nos mers, bruns nués de verdâtre, & pointillés de gris en dehors, violets en dedans, à côte du milieu plus aiguë que celle des précédens, mais du reste semblables pour les stries & la partie chagrinée *; deux autres petits de couleur cendrée, de for-lett. M.

394 COQUILLES MULTIVALVES

I. FAM. OSCABRIONS.

me étroite & allengée, à bords de chaque écaille chargés de deux crans triangulaires & très-finement striés. Pius, un Oscabrion dont les huit piéces ont été détachées pour en faire voir la structure, & dont la membrane ressemble alors à la carcasse d'une chaloupe privée de son bordage.

910. Quatre très-grands Oscabrions des parages Magellaniques, de forme plus large & plus applatie que ceux de l'article précédent; deux desquels ont les écailles brunes tachées dans le milieu de blanc, & striées à-peu-près comme celles de la petite torque de terre : les

*Arg. Zoomorph. pl. 7. comme celles de la petite tortue de terre; les
lett. V.
Séba, tom. 2. deux autres sont tels qu'ils sont sortis de la
pl. 61. n°. 6. mer *.



SECONDE FAMILLE.

PHOLADES.

CES Coquilles, dont le caractere général est de se loger dans les pierres ten. PHOLADES. dres, l'argille & le bois, sont ordinairement composées de cinq ou six piéces fort inégales entr'elles, & plus ou moins fines, dont les deux plus grandes, qui sont latérales, répondent aux battans des Bivalves; les autres, qui sont beaucoup plus petites, se trouvent fixées par des ligamens partie sur le sommet & sur le repli extérieur de chaque battant, partie le long des battans mêmes, soit en dessus, soit en dessous. Ces dernieres piéces sont si fragiles & si minces, qu'il est rare de les trouver jointes aux deux principales qui d'ailleurs ne ferment jamais exactement. Nous connoissons deux genres dans cette famille; sçavoir,

- 1°. Les Pholades sextivalves.
- 2°. Les Pholades quintivalves.

GENRE PREMIER

PHOLADES SEXTIPALVES.

911. O UATRE Pholades à six piéces ; sça-II. FAM. voir, une de nos mers, blanc sale, de forme PHOLADES, allongée, à robe en rézeau granuleux dans les deux tiers de sa longueur, à valves sinueuses & évalces vers l'une des extrémités; elle con-¹Arg. pl. 26. serve son animal ; une autre de même cou-Life tab. 433. leur, mais de forme plus large, plus courte & f. 276. Gual. tab.105. plus bombée; elle n'est reticulée que dans sa partie antérieure, le reste de sa robe n'a que litt. A. B. C. des stries transversales en façon de rides: l'ani-2 List. tab. mal y est aussi rensermé 2; une grande d'Amé-436. f. 279. Gual. tab. 105, rique, blanche, de forme allongée, à groffes itt. D. Séba, pl. 16. stries longitudinales tuilées partant des sommets, traversées d'autres très-fines & onduleuses, à longs appendices intérieurs un peu concaves, à larges replis des valves sur les sommets, & Lift. 12b. à bords dentelés 3; & une petite d'Angleterre, 434 fig. 277. Gual tab. 105. entiérement réticulée 4. litt. G.

912. Idem. 4 Lift. tab.

435. f. 178. Gual. tab.105. 913. Deux grandes Pholades d'Amérique en pendant, de la variété de la troisieme de l'article 911.

913. (bis) Six Pholades de la Méditerranée, avec leur animal parfaitement conservé dans II. FAM. l'esprit-de-vin: elles forment trois variétés.

GENRE SECOND.

PHOLADES QUINTIVALVES.

piéces, dont les trois perites sont placées, l'une sur les sommets, les deux autres le long des valves tant sur le dos que dans la partie insérieure: la sorme totale de la Coquille est presque conique, & la robe en est partie sisse, partie très-sinement réticulée, & partie simplement ridée *; plus, un morceau de bois qui se sépare en trois, contenant deux petites Pholades de cette espèce, & plusieurs cavités coniques que d'autres y ont creusées. Cette variété de Pholades n'est pas commune.

* Kumph. tab.46. litt.H_e

915. Six Pholades de l'espèce précédente, dont cinquichées en partie dans un morceau de bois.



TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX DE MER MULTIVALVES.

CES Coquilles, que M. Adanson 2 distinguées le premier des Tuyaux de MER MULTI. mer univalves, ne différent de ces derniers que par deux valves ou par deux paires de petites valves qu'on trouve en dedans, qui, lorsqu'elles ne sont qu'au nombre de deux, peuvent faire regarder la Coquille comme trivalve, & comme quintivalve lorsqu'elles sont au nombre de quatre; ce qui constitue deux genres dans cette famille, que nous comprendrons dans les deux arricles suivans.

> 016. Quatre petits Tuyaux trivalves d'Amérique, adhérens à un cœur de l'espèce nommée Marron épineux, composés chacun extérieurement d'un tuyau grisâtre fermé & bombé par un bout, chargé en cet endroit de tubercules, mais mince, foré, relevé & un peu applatipar l'autre, & intérieurement de deux petites valves assez semblables pour la forme aux battans des

Pholades de la famille précédente : la ressemblance de ces Tuyaux avec une Cornue ou Re- III. FAM. torte, leur en peut faire donner le nom; un pe-TUYAUX DE tie Tuyau decette espèce, dont la partie supé- VALVESO rieure a été enlevée pour faire voir les valves intérieures dans leur position naturelle; deux autres petites valves détachées de l'un des quatre Tuyaux précédens; une espèce de fruit spongieux que l'on trouve sur le rivage de la côte Coromandel, dans lequel sont logés plufieurs Tuyaux quintivalves diversement contournés, fermés & bombés par un bout, minces & forés de l'autre; deux Tuyaux de même elpèce « l'un desquels a été troué à sa partie bombée pour en tirer les quatre petites valves intérieures, dont les deux qui occupent la partie inférieure du Tuyau, font arquées, & les deux qui se trouvent à l'extrémité supérieure, sont en forme de palettes ou de petites cuillers à manche court; ce qui doit faire regarder cette espèce de Tuyaux, comme une variété de celle que M. Adanson a décrite sous le nom de Taret: un auere Tuyau quintivalve blanc, long, un pen finueux, fermé par le bout le plus large, d'une espèce d'opercule hémisphérique, qui est comme engagé dans le Tuyau; ouvert par le bout le plus étroit, dont l'orifice est parragé par une cloison longitudinale de peu d'étendue, en deux petits demi-cylindres inégaux, & dans

400 COQUILLES MULTIVALVES

19. f. 1.

l'intérieur duquel on reconnoît en l'agitant, que sont contenues les petites valves qui lui sont propres; c'est le vrai Taret rongeur de bois de M. Adanson *; deux Tarets d'une autre va-* Adams. pl. riété, dont le dedans est sur-tout remarquable par un grand nombre de feuillets circulaires minces en vive arrête, & placés en forme d'anneaux, à distances à-peu-près égales les uns des autres vers le bout le plus étroit du Tuyau. l'un desquels a été coupé dans la longueur de plus d'un pouce, pour en mettre la construction intérieure à découvert *. Plus, deux valves atquées provenantes de cette variété de Tarets, lesquelles sont beaucoup plus larges que celles des aurres variétés.

* Rumph.tab. 41. litt. F. G.

> 917. Quatre morceaux de bois ctiblés & vermoulus par des Tarets de la derniere variété de l'article précédent : l'un desquels est un morceau de sapin de treize pouces de long sur quatre de large & autant d'épaisseur, dont une des faces présente encore un de ces Tuyaux niché dans fon trou, & des fragmens de plusieurs aures Les trois autres morceaux sont beaucoup moins grands, & contiennent plus ou moins de ces Tuyaux. -.



QUATRIEME FAMILLE.

GLANDS DE MER.

Ces Coquilles, dont le caractere distinctif est de s'attacher par groupes GLANDE BA
nombreux aux cailloux, aux autres coquillages, & généralement à rous les
corps qui se présentent, sont composées de deux portions, l'une extérieure
de forme cylindroïde ou conoïde, &
l'autre intérieure de forme pyramidale
quadrangulaire.

La premiere de ces portions ressemble à un calice formé de douze pétales triangulaires oblongues, liées intimement les unes aux autres, dont six plus épaisses ont leurs pointes vers le haut, & six plus minces ont les leurs renversées.

La feconde est composée de quatre valves triangulaires à coulisse, que l'animal a la faculté d'écarter les unes des autres par leurs pointes, pour en faire

Tome I. Co

fortir un panache, au moyen duquel il IV. FAM. se procure sa nourriture. Cette famille GLANDS DE ne contient qu'un seul genre.

> 918. Quatre groupes de Glands de mer, & la portion intérieure détachée d'un autre Gland de mer: sçavoir, le premier groupe de deux Glands violets de diverses nuances, d'environ deux pouces de diametre dans le bas, & de presque autant de hauteur, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales, & pétales minces striées transversalement, espèce nom-

litt. H.

B°. 15.

Arg. pl. mée Gland de mer Turban * : le second de deux 16. lett. A. Gual. tab. 106. glands de forme moins renstée, de plus de deux pouces de haut sur un pouce de diametre dans le bas, à pétales épaisses amaranthe clair, & pétales minces violet nué de blanc. striées comme celles des précédens, & de l'espèce nommée

* Rumph. Gland de mer Tulipe * : le troisieme d'un grand tab. 41. lit. A. nombre de petits Glands violet clair & blancs, litt. E. adhérens à un grand Lépas, & nommés sim-

* Arg. pl. 26. plement Glands de mer rayés *, & le quatrieme lett. C. d'un grand nombre d'autres Glands blanc fale, très-petits, & conservant presque tous leur

portion intérieure * : ce dernier est de nos mers; 106. litt. G. les trois premiers viennent des Indes. Bonan, cl. 1.

919. Deux Glands de mer: sçavoir, un rare, violet, dont les pétales épaisses sont chargées d'épines, & nommé Gland épineux : il adhére

à une valve de Conque anatifere; un de la Méditerranée, conservant ses valves intérieures, IV. Fam. fixé sur une petite branche de Corail rouge, & GLANDS DE recouvert en entier de cette substance; & une Moule Magellanique violette, à tête blanche, dont une des valves est chargée d'un grand nombre de petits Glands de mer blancs & lilas, à stries longitudinales ondées sur toutes les pérales, & garnis tous de leurs valves intérieures.

920. Un groupe de trois Glands de mer Turbans, & un de trois Glands de mer Tulipe, adhérens à un fragment de Moule Magellanique;
deux Glands de mer revêtus de Corail rouge,
liés ensemble par deux branches de même matiere; un d'Amérique, couleur de rose, dont
les pétales épaisses sont sans stries longitudi:
nales, mais seulement un peu rabotteuses, &c
dont les pétales minces sinissent par une section
oblique, ce qui en rend la bouche crénelée;
& un Gland Turban adhérent à une valve des
Crête de coq; en tout dix Glands de mer.

921. Quatre groupes de Glands de mer : sçavoir, un de plusieurs perits couleur de rose, adhérens à un Lithophite épineux, & formant un joli bouquet, auquel ce Lithophite sert de tige; trois autres de gros Glands Turbans, dont un de cinq, & deux de trois chacun; un Pétoncle & un Lépas de nos mers, chargés l'un & l'autre de petits Glands de l'espèce commune.

404 COQUILLES MULTIVALVES

GLANDS DE MER.

Plus, une Coquille des mers du Nord, formée extérieurement comme les Glands de mer, mais différente en ce que les douze pétales en sont un peu recourbées vers le haut, six desquelles sont chargées chacune de quatre côtes striées transversalement. & en ce que la base en est concave, percée dans le milieu d'un trou rond. & divisée en plusieurs cellules étroites & profondes : espéce que l'on trouve adhérence à la peau des Baleines, & qu'on nomme par cette raison List. tab. Pou de baleine *: en tout sept pièces.

445. £. 188. Gual. tab. 106. lett. Q.

922. Un groupe de six Glands de mer blancs & de la forme d'un cône tronqué, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales trèssaillantes en forme de rayons, de l'espéce nommée Clochette, & adhérens au dos d'un Crabe; un Gland de mer blanc nué de violet, à pétales épaisses & minces, mieux prononcées que les précédentes, ce qui lui a fait donner le nom de Gland de mer à côte de Melon : il est chargé d'onze autres petits Glands de même espéce; un Gland revêtu de corail rouge, tenant à une branche de même matiere, & représentant une tulipe avec sa tige; un groupe de Glands coubur de rosa, & un de trois gros Glands Turbans; en tout cinq piéces.



CINQUIEME FAMILLE.

CONQUES ANATIFERES OU POUCE-PIEDS.

Ces Coquilles, qui doivent le premier de ces noms à la fausse opinion où l'on poucrétoit autresois que certains canards de pirale mer y prenoient naissance, sont toutes remarquables par un pédicule plus ou moins long, qui leur sert de support. Nous n'en connoissons que trois espéces.

- 1°. Celle qui a retenu le nom de Conque anatifere, & qui est composée de cinq valves à peu près triangulaires, assez dissérentes entr'elles, dont deux grandes & trois petites, portées sur un pédicule membraneux, long, étroit & ridé.
- quels sont composés de nos mers, lesquels sont composés de cinq valves inégales, dont deux ovales & convexes, deux lozanges, & une en forme de bec,

Cc iv

V. FAM. Pouce-Pieds. fans comptet un grand nombre d'autres plus petites qui toutes sont portées sur un pédicule court, large, noirâtre, chagriné & assez semblable à une bottine.

3°. Les Pouce-pieds des Indes, composés de huit grandes valves & d'un grand nombre de petites recourbées en façon de panache, & portées sur un pédicule large & long.

923. Un groupe de Conques anatiferes des Indes, adhérentes par leurs pédicules trèslongs, à un morceau de bois de fapin de qua-

* seba, pl. torze pouces de hauteur *.

924: Un très-beau groupe de Pauce-pieds de nos mers, formant un bouquet de huit pouces tant de hauteur que de largeur, & de la plus parfaite conservation, sur lequel se trouvent quelques Moules entremêlées avec les Pouce-

* Arg. plac. pieds *.

925. Six variétés de Pouce-pieds: sçavoir, deux Pouce-pieds des Indes, rares, nommés Couronnes de serpens, tous deux isolés & privés ** seba, com. de leurs pédicules * ; deux de nos mers, de la 2. pl. 61. 11°.8. variété de ceux de l'article précédent ; deux pl. 16. 10°.3. branches, l'une de trois, l'autre de cinq Con-Rumph. tab. pues anatiferes d'Europe, à pédicule large &

court i dix Conques anatiferes, à pédicule = mince, groupées ensemble 2; un paquet de V. FAM. plusieurs autres enfilées, & un morceau de bois PIEDs. de sapin, chargé de Conques anatiferes des 'Séba, pl Indes, de la variété de l'article 923.

Arg. pl. 16.



SIXIEME FAMILLE.

OURSINS,

VI. FAM.

Le sont des Coquilles de forme voûtée plus ou moins convexe, composées d'une quantité prodigieuse de pièces de rapport fragiles, hérissées de pointes nombreuses qui tombent après la mort de l'animal, & qui laissent alors à découvert les apophyses & les petits trous sans nombre dont la Coquille est couverte.

Le célébre M. Klein, en donnant au Public deux distributions de ces Co-quilles, tirées l'une de l'anus, l'autre de la bouche, dit qu'il en auroit pû faire une troisieme prise de la figure existieure; c'est celle que nous présentons dans ce Catalogue, non comme la plus parfaite, mais comme la plus simple & la plus commode. Nous diviserons dong les Qursins en six genres; sçavoir,

- 1°. Les Oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, nommés Turbans Ouasins. (Cidares,)
- 2°- Les Oursins de forme ovoide, échancrée d'un côte, à base un peu applatie, & à partie supérieure sillonnée, nommés Cœurs marins, Barillets ou Pas de poulain (Spatagi.)
- 3°. Les Oursins de forme ovoide sans échancrure, & fort convexe depuis la bouche jusqu'à la pointe tronquée, nommés Oeuss marins ou simplement Ovoides (Brissi.)
- 4°. Les Oursins à pans irréguliers, de forme large & peu bombée, & ornés dans leur partie convexe d'une espéce de sleur à cinq pétales, nommés Pavois ou Boucliers (Scuta.)
- 5°. Les Oursins de forme applatie, ornés dans leurs deux faces de cinq seuilles, & percés ou non de quelques trous oblongs, nommés Gâteaux ou Beignets (Placentæ.)
 - 6°. Les Oursins de même forme que

A10 COQUILLES MULTIVALVES

yl. Fam. Oursins, les précédens, mais dont la moiné & plus de la circonférence est rayonnée ou dentée en forme de roue, tandis que l'autre moitié est entiere & arrondie, nommés Rosules (Rosulæ.)

GENRE PREMIER.

TURBANS.

926. L'EUX grands Turbans de la Méditerranée, couleur de rose, de forme sphéroidale, à sommet très-élevé, à bouche ronde, située, ainsi que dans tous ceux de ce genre, au milieu de la base, qui est un peu convexe, à grands ex perits colures, chargés d'apophyses nombreuses en forme de grains de miller, qui ont sait donner à cette espèce le nom de Turban miliaire; et desquels l'un est encore hérissé de ses piquans jaune pâle, sins comme des aiguilles.

927. Deux grands Turbans miliaires de la même mer, violet foncé, de forme sphéroidale, mais à sommet moins élevé que les précédens, hérissés tous deux de petits piquans ai-

* séba, pl. guille fauve-gris *.

12. n°. 9.
Klein. pl. 1.

928. Deux autres, dont un fauve-verdâtte, lett. A.

à formmet élevé, à base applatie, & hérisse de

piquans verds, clair semés & un peu longs: l'autre est de la forme de ceux de l'article précédent, mais un peu plus petit, d'un beau violet, ainsi que ses piquans dont l'extrémité tire sur le blanc.

929. Deux très-grands Turbans miliaires de la Méditerranée, dépouillés de leurs piquans. de forme sphéroïdale, à petits colures nués de couleur de rose, de verdatre & de brun, à panneaux bien prononcés, dont les rangs de sutures sont fauve clair, à base presque platte; & nommés particuliérement Turbans à panneaux *.

930. Trois Turbans miliaires, dont deux de Klein. pl. 50 la Méditerranée, de la forme de ceux de l'article 927, mais plus petics, violets ainsi que leurs piquans; & un d'Amérique, dépouillé de ses pointes, de forme hémisphérique, & à bouche décagone de cinq grands & cinq petits côtés alternatifs *.

931. Sept Turbans miliaires: sçavoir, cinq 1. lett. D. armés de leurs pointes, dont un violet foncé, à piquans fauve clair; un noirâtre en entier; un marron, à piquans violets; un couleur de rose, à piquans blancs rabattus; un olive foncé en entier; & deux dépouillés de leurs piquans, dont un couleur de rose, à apophyses jaunes, & un violet, à apophyses fauve clair.

932. Douze Turbans miliaires, dont dix de

COQUILLES MULTIVALVES

OURSINS.

moyenne grandeur & deux petits, fix des-VI. FAM. quels sont hérissés de leurs piquans. & de conleurs variées: parmi ceux qui en sont privés. deux sont verds de diverses nuances, deux couleur de rose, un nué de couleur de rose, de fauve & de brun; tous les cinq à apophyses blanches, & un gris de perle en entier.

933. Trois Turbans d'Amérique: scavoir. deux grands fauves, teints l'un de rougeatre, l'autre de blanc, dépouillés de leurs piquans; tous deux à sommet élevé, à cinq espéces de pans arrondis, & à bouche décagone sinueuse dans les angles, nommés Turbans miliaires an-

* Klein. pl. guleux *; & un petit rare, noirâtre, hérissé de s. lett. F. piquans très-longs & très-nombreux, nommé

* Rumph. Oursin à soyes *. tab. 13. n°. 5.

934. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans, dont un grand & sept petits: scavoir, le premier des Indes, rare, miliaire anguleux, à base & sommet applatis, à colures marbrés dans toute leur longueur de verd & de violet, & par bandes transversales de blanc. & à bandes percées de trous, larges, blanches & repréfentant une espéce d'ouvrage en filigrane *; un

des Indes, rare, miliaire, verd pâle, à tête éle-Séba , pl. 11. vée, à colures grands & petits peu inégaux en n°. 6. A. B. Gual. tab. 197. largeur, chargés d'apophyses nombreuses, enitt. M. tre lesquelles les bandes percées de trous, paroissent à peine; deux de la Méditerranée, miliaires & applatis, à colures verd foncé. & à bandes percées de trous, blanches : deux de VI. FAM. l'Océan, miliaires aussi, très-applatis, & verd Oursins. foncé en entier 2; & deux de l'Isle de France, 20.110 13: 26. nués de fauve & de couleur de tuile, à cinq leu. B. grands & cinq petits colures, séparés par des bandes en filigrane, & apophyses de moyenne grandeur, qui ont fait donner à cette espèce le nom de Turbans à grains de pesise vérole3. Ibid. pl. 24

935. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans: scavoir, deux des Indes, rares, à grains de petite vérole, dont un fauve clair, à bouche décagone sinueuse dans les angles, & à base applatie; & un gris-vineux, à petits colures élevés, à grands colures enfoncés & dépourvus d'apophyses dans le milieu de leurs parties supérieures, & à bouche large, nommé le Turban curc 4 : & fix miliaires de la Méditerranée, des variétés déjæ décrites, dont cinq verds à tab. 14. lkt. B. Klein. pl. 2. apophyses blanches, & un grisâtre.

letta B.

936. Deux Turbans de l'Iste de France, à grains de petite vérole, peu communs : sçavoir, un violet foncé, recouvert en entier de grands piquans applatis en forme de spatules ou de pignons de pommes de pin, se recouvrant mutuellement, & ne laissant voir les uns des autres en deffus, que de petits pentagones dont l'arrangement imite celui des carreaux d'une chambre, à base hérissée aussi de perits piquans. VI. FAM. que sa ressemblance à un artichaut, a fait appeller de ce nom; d'autres le nomment le Char-

* Arg. pl. don*; & un de même espèce, dépouillé, violet s, leti G. Klein. pl. 23. clair, dont la forme est alors elliptique, à base lett. A. B. platte, à bouche large & sinueuse, & à grand

* Ibid. pl. nombre d'apophyses *.

937. Idem.

938. Un grand Turban d'Amérique à grains de petite vérole, rare, de forme sphéroidale applatie, noirâtre en entier, à piquans cylindriques longs & fins, chargés de stries longitudinales granuleuses qu'on ne distingue bien qu'à la loupe, & finissant tous par une pointe ob-

* séba, pl. tule & forée *.

rangs longitudinaux de grosses apophyses en forme de mammelons: cet Oursin est garni de ses dents, & hérisse dans le corps de grossiquans en forme de pieux de palissade ou de doiges, cendrés, rayés vers le bout & par zônes de save clair, longs, arrondis, finissant en

*Ibid. pl.21. tiers point *; & vers la base, d'autres piquans Arg. pl. 2) plus petits en forme de spatule, violet nué de sauve, Rumphius nomme cette espèce l'Oursin

* Rumph. digité *.

tab. 13. n°. 2. Séba, pl. 13. 940. Un grand Turban à mammelons, & din°. 1 & 2. gité, de même forme que le précédent, mais hérissé dans le corps de piquans d'une variété VI. FAM. rare, en ce qu'ils sont très-longs, d'une seule Oursins. couleur verdâtre, & ornés d'une côte longitudinale en vive arrête, qui les fait paroître comme triangulaires; les piquans de la base sont en forme de spatule, beaucoup plus courts, & violet nué de fauve * : cet Oursin est garni de .* ses derus, & porte près d'un pied de diametre en mesurant de l'extrèmité des piquans d'un côté, à l'extrémiré des piquans de l'autre.

941. Un Turban à mammelons de la Méditerranée, peu commun, de forme sphérique, noiratre, à gros piquans gris, à-peu-près cylindriques, & cannelés vers l'extrémité qui est arrondie *.

942. Un Turban à mammelons de l'Isle d'Amboine, sphérique, noirâtre, à gros piquans peu longs, en forme de pilon, chargés de stries longitudinales granuleuses bien prononcées vers l'extrémité, qui s'élargit & forme une espécé de tête sur laquelle les stries se prolongent en façon de rayons *.

942. Deux Turbans à mammelons de la Méditerranée, de forme sphérique, l'un fauve dépouillé de ses piquans, garni de ses dents, à cinq grands colures charges chacun de deux rangs de mammelons, & féparés les uns des autres par des bandes onduleules dont les bords

A16 COQUILLES MULTIVALVES

VI FAM. OURSINS. ¹ Rumph.

Klein. pl. 3. lett. C.

Arg. pl. isi lett. E. Gual, tab 108. litt. E. Bonan, el. i.

lett. D.

\$7. D°. 11.

11. nº. 4.

sont en filigrane, nommé le Turban maure & un Turban maure garni de ses piquans ronds, très-longs, s'amincissant de leur base à leur extab. 13. nº 3. trémité, striés en longueur, & forés dans le bont 1

944. Quatre Turbans à mammelons : scavoir . un de la Mer Rouge, blanc sale, de-*Ibid. Be. D. pouillé de ses piquans, de sorme hémisohérinº. 17 & 18. que, à cinq grands colures charges de deux Arg. pl. 25. doubles ratigs de mammelons, & cinq petis colures charges d'un double rang seulement? & trois Turbans maures un peu moirs grands que les précédens, dont deux déponillés de leurs piquans; on a enlevé la base & le sommet de l'un de ces Oursins. & on donne à part les dents & osselets, formant ce que l'on appelle la Lanserne d'Aristose : le troiseme est garni de ses piquans grands & petits.

945. Cinq Turbans à mammelons : scavoir.

deux d'Amérique, à piquans gros & courts, prisatres. Ariés & granuleux, terminés par une 4 seba, pl. couponne platte, d'où sort un petit mammelon radié 4; un de même ospéce, dépouillé de ses Rimpie. tab. pointes, remarquable en ce que, quoique les grands colures en foient fort larges, on n'y trouve que deux rangées de gros mammelons, séparées par un amas d'autres très-peuts; & deux Turbans maures, l'un garni de ses pichans. l'autre d'un beau violet dépouillé des 946. fiens.

quans, & par pendans: sçavoir, deux grands VI. FAM. d' mammelons, de l'espèce de celui de-l'article Oursins.

940 *; deux moins grands, qu' ne différent de 'Gualt. tab. 108. litt. C. ceux-ci qu'en ce que les apophyses de leurs petits colures ne se continuent point jusqu'au sommet; ils appartiennent à l'espèce de l'article 939 *; & quatre à grains de petite vérole, Gual tab. 108. litt. B. dont deux à base un peu convexe, & à grosses litt. B. apophyses peu nombreuses *; & deux comme lett. A. B. *Ibid. pl. 2. lett. E. lett. E.



GENRES II & III.

COURS MARINS ET GUFS MARINS.

INO Caurs-marins : sçavoir, un de nos mers, de forme large & médiocrement VI. FAM. OURSINS. convexe, orné en dessus d'une fleur à cinq pétales en forme d'étoile, quatre desquelles sont bordées d'une double rangée de petits trous; fémé dans le reste d'apophyses inégales & peu saillantes, à échancrure peu profonde dans le haut, qui se prolonge jusqu'à la bouche : celleci est près de la circonférence, ainsi que dans Arg pl. 25. tous les Ourfins de ce genre : & quatre de forme plus oblongue & plus bombée, dont un de nos mers, à sillon large & assez prosond, qui passe du dos jusqu'à la bouche, accompagné fur le dos seulement de quatre autres plus petits posés obliquement, percés chacun dequatre rangées de trous, & à robe semée d'apophyses

* Mid. let. I. très-fines, espéce nommée Pas de poulain 2; Gual. tab. 109º un de même espéce, revêtu encore de ses pischa, tab. 100 quans capillaires 3; un d'Amérique, de même n°. 11. a. b.

5 Klein. pl. forme & de même grandeur, mais dissérent en 28. let. A. B.

ce que les sillons en sont étroits, prosonds &

4 Gualt. tab. sinueux 4; & un de nos mers, plus gros, de

Forme un peu plus oblongue que les précédens, & ne différant d'ailleurs du fecond qu'en ce que VI. FAM. les fillons en sont tous très - prosonds; espèce OURSINS. nommée Tête de mort *.

948 Les mêmes Oursins, avec cette dissété tab. 14. n°. 2. Bonan. cl. 1. Bonan. cl. 1.

ou Œuss marins, dont un de forme étroite, gris en dessus, blanc en dessous, à quatre larges fillons partant d'une cavité garnie de quatre trous, ornés chacun de quatre rangées de petits trous, & entoures d'un autre sillon trèsléger, qui représente une espéce de demi - dalmatique, à base un peu convexe, & à trèsfines apophyses *; un de même espéce, couvert en entier de ses piquans capillaires gris, lesquels Gual tab.109. reffemblent à de gros poils de souris; deux d'A-lit. A. mérique, l'un blanc sale, qui ne différe du 14. n°. 1.
premier qu'en ce qu'il est plus petit, & à pro-n°. 22. 22. 2. b. portion plus bombé *; & l'autre gris en entier, * 151d, n°, peu commun, de forme large, à robe semée 19. a. b. d'apophyses blanches entourées chaeune d'autres plus petites, à fillons ponctués très - profonds, entourés d'un autre étroit & peu prononcé, dont le contour représente cinq bastions avec leurs flancs & leurs courtines: les trois autres sont des Caurs-marins, dont un de

A10 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS.

l'espèce du premier de l'article 947; & deux Pas de poulain de nos mers, de la variété du second du même article, l'un desquels est gami de ses piquans.

950. Idem.

951. Un très-rare & très-bel Oursin ovoide, de forme large un peu élevée, gris nué de sauve en dessus, blanc en dessous, orné comme les précédens dans sa partie convexe, d'une étoile à cinq rayons, dont quatre seulement sont percés de petits trous, à intervalles des rayons formant un compartiment chargé d'apophyses assez grosses, entourées d'autres très - sines, à apophyses du dessous disposées d'une saçon très-élégante, & chargées chacune de petits grains, qui à la loupe brillent comme autant de perles. Cette Coquille que les Hollandois regardent comme une variété de celles qu'ils appellent Têtes-mortes *, porte plus d'un demi-

* séba, pl. pellent Têtes-mortes *, porte plus d'un demi-



GENRE QUATRIEME.

PAVOIS OU BOUCLIERS.

952. 31X Oursins de dissérentes grandeurs: squoir, deux grands d'Amérique en pendant, VI. FAM. de forme un peu convexe en dessus, à base concave vers le centre, à cinq pans arrondis, ornés dans leur partie convexe d'une rose à cinq larges pétales bombées, bordées chacune d'une double rangée de petits trous, & dans leur partie concave, d'une étoile à cinq rayons caves & étroits, à robe semée dans toute son étendue de petits cercles creux dans lesquels sont les apophyses, espèce que sa ressemblance avec un Bouclier, a fait appeller de ce nom * un des Indes, moins grand, plus convexe en seba, pl. 11. dessus, & plus concave en dessous que les pré-no. 1 & 3. cédens; un plus petit, qui en différe en ce qu'il litt. Al est plus applati, que la base n'en est presque point concave, & que les cinq pans en sont mieux marqués: variété nommée Pavois angulaire *; deux encore plus petits, de forme elliptique, à base un peu convexe, à sommet 10 lett. C. percé de quatre petits trous, d'où partent cinq no. 13 & 14paires de rayons formant autant de pétales qui Dd iii

A11 COQUILLES MULTIVALVES.

VI. FAM. Bouclier de l'espèce des deux premiers, coupé OURSINS.

1 Rumph
tab. 14-litt. D. & dix Offelets en forme de soc dentelé, dont séba, pl. 15.

1°. 33 & 37.

2 Klein. pl.

2 Klein. pl.

3 Klein. pl.

3 & les cinq dents canines du même Oursin³.

Ibid. pl. 20. lett. H-P.

953. Un très-beau Pavois d'Amérique, portant près de neuf pouces de long sur sept & demi de large, de forme platte, à pétales plus oblongues & moins bombées que dans les premiers Boucliers de l'article précédent, à panneaux quarré-long, larges & hien prononcés; espèce nommée le grand Pavois applai, & ayant, ainsi que tous les Oursins de ce gente, la bouche au centre, & l'anus au bord de la base.



GENRE CINQUIEME.

GATEAUX OU BEIGNETS.

954. DEUX Ourfins plats de l'Iste de Bourbon, ornés tant en dessus qu'en dessous d'une VI. FAM. fleur à cinq pétales, dont l'inférieure a ceci de OURSINSE particulier que les feuilles s'en sous divifent & se ramifient en plusieurs autres : ils sont percés de part en part de six larges sentes, dont cinq placées près des bords à l'extrémité de chaque pétale, & la sixieme entre les deux pétales de la partie inférieure qui est la plus large *: cette espèce nommée Pain d'épice, a la bouche au 25 St. 26. centre, & l'anus près de la troisieme partie de n'. 5 6 6. l'axe. Plus, un Oursin de même espéce, coupé en trois pour en faire voir le dedans, avec ses offelets.

955. Trois Pains d'épice: sçavoir, un de la Vera Cruz, peu commun, à cinq fentes, done une au-dessous de l'anus, & quatre latérales *; un plus rare encore, à deux fentes seulement 11. lett. C. Gual. 120. vers le bas, & ayant l'anus près de la circon- lit. E. Sérence *; & un de la Barbado, à six sentes, qui nº 9 & 10. ne différe des deux de l'article précédent, qu'en pre lett. Be

Séba, pl. 15-

Dd iv

ALA. COQUILLES MULTIVALVES

ce que les fentes en sont plus longues & moins

larges *. VI. FAM.

OURSINS. 956. Trois autres: sçavoir, un de la côte Co-* Klein. pl. 24. lett. A. B. romandel, à fix fentes étroites, conservant les Scba , pl. 15. p°.7 & 8. piquans capillaires gris - cendré, de forme plus mince & plus platte que les précédens, un de la Barbade, à six sentes, & un de la Vera Cruz à cinq, semblables à ceux de l'article précédent.

> 957. Quatre Ourfins plats: sçavoir, deux de forme orbiculaire peu réguliere, à bords un peu relevés, ornés dans leur partie supérieure d'une fleur à cinq pétales, mais dépourvus de fentes; espéce nommée Beignets ou Médailles *; & deux

* Rumph. tab. 14. litt. E. Pains d'épice, l'un à cinq & l'autre à six sentes. litt. B. C. Séba, pl. 15. Klein. pl. 12. leu, D.

958. Deux Ourfins rares, de forme plane & 26. 15 & 26. circulaire, mais un peu sinueuse dans son pourtour : sçavoir, un de couleur terreuse, à sommet un peu élevé, d'où partent cinq pétales dont les extrémités se partagent en deux lignes qui s'écartent & se prolongent jusqu'à la circonférence; le desseln de sa robe, qui imite assez le rézeau de certaines toiles d'araignée. lui a fait donner le nom d'Arachnoide *: la bouche en est au centre de la base, & l'anus à la circonserence; & un Arachnoide différent en ce que la couleur en est lie de vin noirâtre, la forme plus plate, les extrémités des pétales moins divergentes, & que l'anus en est placé un peu en dessus.

Gual, rab, 110, litt. G.

GENRE SIXIEME.

ROTULES,

met un peu élevé, orné de cinq pétales affez VI. FAM. femblables à la fleur du jasmin, & à douze rayons dans la moitié de sa circonférence; espéce nommée l'Oursin solution solution placée comme dans ceux du genre précédent, Rein. pl. 122. mais l'anus est à la troisieme partie de l'axe; & Séba, pl. 156. deux peu communes, de forme plus applarle, n°. 15 & 16. ornées dans la moitié de leur circonférence d'onze échancrures, trois desquelles sont plus prosondes; ces Oursins ont aussi deux fentes latérales vers la partie non échancrée*, *Klein. pl.

960. Idem, à ces différences près que l'Oursin 12. lett. A. B. Gual. tab. 110. solaire n'a que dix rayons, & que l'une des litt. H. Séba, pl. 15. deux autres Rotules, a trois échancrures dans n°. 17 & 18. la partie de la circonférence qui en est ordinairement dépourvue.

961. Un grand Carton très-intéressant, contenant quarante petites boëtes de dissérentes parties séparées d'Oursins, de tous les genres précédens: sçavoir, 1°. des Oursins coupés en divers sens pour en faire voir les parties intétieures: 2°, les dents & les osselts de plusieurs

416 COQUILLES MULTIPALVES, &c.

VI. FAM. OURSINS. * Séba, pl. '23. 11°. 12.

espéces, formant ce que l'on appelle la Lanterne d'Aristote*, dont une entiere, & les autres séparées; 3°. des piquans de toutes grandeurs, parmi lesquels il s'en trouve deux espéces extêmement rares, dont on ne connoît point les Oursins; l'une est cylindrique, granuleuse & remarquable par des espéces d'anneaux ou de moulures dentelées, placées à distances égales; l'autre espéce est en sorme de suseau, à stries longitudinales granuleuses, hérissées de piquans très-pointus, &c. &c.

961. (bis) Cinq Bocaux contenant douze Coquilles avec leurs animaux dans l'esprit-devin: sçavoir, un Lépas, une Tonne nommée l'Oublie, un Peigne, un Manche de content, une Came pholade, un Dail, une Pholademultivalve, un Buccin occupé par un Bunard l'hermite, deux Conques anatiferes, un Poncepied, & un Oursin.



中で名字でのできると

SECTION SECONDE.

Coquilles fluviatiles.

Les Coquilles d'eau-douce n'étant pas assez nombreuses pour pouvoir suivre ici le même ordre que dans notre premiere Section, nous les diviserons seulement en deux classes, les Univalves & les Bivalves. La premiere de ces classes ne renferme que six familles relatives à celles des Univalves de mer; sçavoir, les Lépas, les Plan-Orbis, les Limaçons, les Buccins, les Tonnes & les Vis. Nous n'en connoissons même que deux dans la classe des Bivalves, qui sont les Cames & les Moules ou Tenilles; ce qui nous engage à n'en point faire de subdivisions.



CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES D'EAU-DOUCE.

962. VINGT - SIX petites Boëtes contenant plusieurs Coquilles fluviatiles des trois premieres familles: scavoir, six petits Lépas du lac de Geneve, blancs, lisses, à tête pointue & re-Gualt. 12b. courbée, & à bouche ovale *: six autres du litt. AA. même lac, différens des précédens en ce que la robe en est réticulée, que la tête s'en éleve & recourbe davantage, & qu'on remarque dans le bord opposé au recourbement du sommet, une petite fente ou entaille, qui s'éleve jusqu'au * List. tab. quart de la Coquille *; un autre petit de la sor-543. f. 28. me d'un demi-ovoïde, olive & transparent, orné de trois lignes longitudinales bleues par-*Ibid.f. 27. tant du sommet comme autant de rayons*; deux verd foncé, à stries circulaires inégales, à base presque ronde, & à tête élevée sans être sensiblement recourbée; quatre de la riviere des Lataniers dans l'Isle de France, dont deux à fommet un peu recourbé, & deux à appendice en demi-cornet; trois Tuyaux formés d'un amas de petites Coquilles fluviatiles, principalement de Plan-orbes & de Buccins, de petits brins &

filamens d'écorce & de bois, lesquels ont servi d'habit & de logement à une Teigne aquatique; huir autres Tuyaux à-peu-près semblables, de la riviere des Gobelins; trois autres Teignes de le fontaine de Verri près Genêve, revêtues de bois & d'écorce; quatre Limaçons à bouche ronde * olivâtres, à zônes marron, de forme bombée & élevée, dont un du lac de Genève, List. 126. un de la Loire, & deux de la Seine; une petite f. 26. Gualt. tab. 5. boëte d'Opercules marron clair, papyracés, litt. A. Séba, pl. 39. provenant de la même espèce de Limaçons ; nº. 33 & 34. un Limaçon d'Amérique, du même genre, blanc dans le corps, à base & tête violettes, & à bouche presque triangulaire; cinq des Indes, de l'espèce du précédent, violets nués de blanc, à bouche formant un peu moins le triangle; trois. Plan - orbes fauves des étangs d'Aranjuez *; trois Plan - orbes d'Amérique, * Gualt. tab. dont un blanc, de forme très-renslée, & deux 4-litt. D. D. gris : deux Plan - orbes de la riviere des Gobelins . l'un blanc & l'autre marron *; deux de la * Arg. pl. Seine; deux petits du lac de Genève, de for-27. f. 8. me très-applatie, & à spirale chargée dans son se. 41. milieu d'une côte mince en vive arrête, & six petites boëtes contenant chacune douze petites Nérites de différentes rivieres de l'Europe *.

963. Un Limaçon à bouche ronde d'Amé-f. 3. Guair. tab. 4. rique, rare, fauve-blanc, marbré par zônes litt. LL. Lift. tab. 136. de taches quarré-long fauve-roux, à coque f. 38.

AND COQUILLES UNIVALVES.

mince & transparente, umbiliqué, & à lévres formant dans toute la circonsérence de la bouche, un bord très-saillant, mince & plat; & deux Buccins non moins rares, blancs, à coque mince, à fix orbes, dont le premier est remarquable par un double applatissement du côté de la bouche, à lévres sinueuses & retroussées formant une espéce d'oreille, & umbiliqués.

964. Une Nérite des Indes, rare, verd foncé, à fix épines forées, placées le long du milieu de la spirale, de plus en plus grandes à mefure qu'elles approchent du bord; la dernière de ces épines est plus longue que la Coquille 'Arg. pl. 7. même, qui conserve encore son opercule."

> 965. Deux Nérites rares, dont une verd de terraffe nuée de brun vers la tête & les bords, à stries fines transversales, à lévre intérieure

dentelée, & extérieure finissant en une espèce

Gualt. tab. d'oreille ou d'umbilic *; & une de même espée lit. HP: ce., polie & devenue blanche en dessus.

966. Une très-grande Nérite du Mississipi, verd-noirâtre, ventrue & umbiliquée, à stries inégales en forme de rides, qui partant d'un per au dessous de la clavicule, viennent toutes se perdre dans l'umbilic; espéce connue sous le

* Lift. tab. nom d'Idole *.

précédente, dépouillée de son épiderme, & mi-partie de fauve & de blanc.

968. Un Carton contenant dix - huit petites boëtes de Buccins fluviatiles : sçavoir, deux du Mississipi, rares, de forme oblongue, à bouche étroite & sinueuse, dont un revêtu de son épiderme verdâtre, l'autre dépouillé & gris de lin; un des Indes, ventru, blanc sale, marbré par taches longitudinales, & quelques zig-zags de rouge-brun; deux autres des Indes, de forme un peu moins renflée, & plus petits 1; un grand 1 Gualt. tals des fossés de Genève, blanchâtre, ventru, à s. iii. N. 1. coque mince & clavicule très-pointue 2; deux 2 Ibid. litt. L. des canaux d'Aranjuez, semblables au précédent, à cela près qu'ils sont plus petits & moins ventrus ?; deux de la Loire, & deux de la stidd. litt. I. Seine, à-peu-près semblables; deux petits des List. tab. 123. fossés de Genève, papyracés, à coque blonde & transparente 4; trois du même endroit, fort 41bid.f. 23. ventrus, à bouche encore plus évalée, & re- litt. F. gardés par M. d'Argenville comme de petites Tonnes fluviatiles 5; deux d'auprès de Valence en Espagne, blanc de lait, à sept orbes renssés 27. f. 7. & à petit umbilic 6; deux fort petits du lac de f. 22. Gualt. tab. f. Genève, blancs, ventrus, à bouche ronde 7; litt. G. quatre de la Marne, & seize de la Seine, à-108. f. 1. peu-près de même forme; deux colorés de la Gualt. tab. 5. riviere de S. Thomé aux Indes orientales; cinq 7 Ibid. lit. B. de la Virginie, en forme de sabots, à petite côte aiguë sur le milieu du dernier orbe 8; six de la Lézarde; deux de l'Isle de France, peu com- 111. f. 5.

432 COQUILLES UNIVALVES

muns, verd foncé, à sept orbes couronnés de tubercules aigus en forme d'épines, & nommés Thiares fluviatiles *; & cinq petites Thiares

* Arg. pl. 27. més Thiares fluviatiles *; & cinq petites Thiares f. 6. Rumph. tab. fauves de la riviere de S. Thomé.

Rumph. tab

969. Vingt Coquilles fluviatiles: sçavoir, deux Buccins blancs, nués de gris de liu, marbrés par flammes longitudinales de marron, à tête couleur de rose, & à six orbes renssés; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article précédent; un des Indes, à bouche presque ronde, gris de lin tacheté par zônes de rougebrun; un autre rare, blanc rayé par zônes de fauve, à neuf orbes, dont les cinq derniers sorment une clavicule aigue, & les quatre autres renssés, finissant par une bouche ovale à doubles lévres retroussées en dehors, à stries sines longitudinales, & umbiliqué; deux petits peu communs, à cinq orbes renssés, terminés par

* Arg. pl. une bouche saillante & toute ronde *; deux
Thiares semblables aux antépénultiemes de l'article précédent; une plus petite, marron clair;

une rousseâtre, grande & ventrue, à coque épaisse; une autre fauve; une petite blanche nuée de fauve, rare en ce que les épines qui couronnent les orbes, en sont moins nombreuses & plus réguliérement disposées; une Visdes Indes, rare, fauve-blond, marbrée par slam-

mes longitudinales de rouge-brun, à cannelures * List tab en même sens, & à stries circulaires très-fines*;

433

& cinq petites Vis brunes de la riviere de S. Thomé, à stries longitudinales & transversales formant un rézeau granuleux.

CLASSE SECONDE.

BIVALVES D'EAU-DOUCE.

070. LINO Cames fluviatiles, de forme à-peu-près ovale: sçavoir, deux grandes & fort épaisses du Mississipi, dont une revêtue de son épiderme noir, à grosses côtes obliques & onduleuses en forme de rides, à stries circulaires fines & serrées, blanche nacrée en dedans, & à charniere formée dans l'une des valves, d'une très-groffe dent striée sous le sommet. & d'une longue avance latérale, qui s'engrainent dans les cavités & la rainure correspondantes de l'autre valve; & une d'une autre espèce, dépouillée, nacrée d'un très-bel orient tant au dedans qu'au dehors, & ornée de gônes alternatives blanches & couleur de chair : sa charnière différe de la précédente en ce que la groffe dont des sommets le subdivise en plusieurs lames striées & dentelées dans l'une & l'autre valve * ; une peute des Indes, revêtue en partie de son épiderme brun, 150. qui couvre une très-belle nacre, & à charniere

Lift. tob

Tome I.

971. Deux Cames du Mississipi, de l'espèce des deux premieres de l'article précédent, mais

plus grandes.

972. Deux grandes Cames ovales du même steuve, dont une revêtue en partie de son épiderme noir, qui dans les endroits où il a été enlevé, laisse paroître une très-belle nacre blanche en dehors, jouant l'opale en dedans; & une dépouilée jouant l'opale tant en dehors qu'en dedans, & déployant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel: leur charmiere est de la première espéce décrite dans l'article 970.

973. Vingt-deux Moules on Tenilles suviatiles: sçavoir, deux grandes Tenilles d'étang, à coque très-mince, lisse, traversée de quelques rides, à sommet placé vers l'extrémité la plus large, & à charnière formée d'un silet longitudinal & d'une rainure correspondante peu sensible, routes deux macrées, & l'une re-

* Lift. tab. vêtue de son épiderme verdâtre *; une autre 156. f. 11. Sualt. tab. 7. moins grande, mais plus bombée, à coque plus épaisse, conservant en partie son épiderme noiràtre: sa charnière est encore moins sensible qu'aux

précédentes *; deux grandes du Mississipi, àbord * titt tabi finueux dans fon milieu, à léger fillon s'éten- 155. f. 10. dant de la tête à cet endroit, à coque trèsépaisse, & à charniere de la premiere espéce décrite article 970 : l'une est blanche & dépouillée, l'autre conserve son épiderme noirâtre *, une de la riviere de Connel en Ecosse : deux des rivieres d'Irlande, blanches, revêtues: 149. fig. 4 de leur épiderme verdâtre, & aux valves desquelles adherent de très - petites perles; deuxde la Vologne en Lorraine, de forme un peu large & renflée, revêtues de leur épiderme norâtre; & une petite boête contenant douze perles provenant des Moules de cette espéce; deux de la riviere des Gobelins, à bords sinueux d'un côté, à coque mince, revêtue de son épiderme verd clair *; une de la Loire, dépouillée, * Arg. pl. 27. & d'une très-belle nacre *; une du Tage, de forme moins allongée, & deux de la Seine, oblongues, toutes trois dépouillées *; deux du * Ibid. Danube . jaune-verdâtre, rayonnées *; une de * Lift tab. la Marne, de même couleur, mais non rayonnée *; deux petites du lac de Genève, papyracées, de forme très - applatie, & à bords si- 7. litt. D. nueux; & une très-petite des fossés de Genève. de forme à-peu-près semblable, à stries trans-

versales onduleuses & égales.



SECTION TROISIEME

Coquilles terrestres.

Ces Coquilles ne formant qu'une seule classe composée des trois samilles suivantes, les Limaçons, les Vis & les Buccins, nous suivrons le même ordre que dans la Section précédente, sans entrer dans aucune sous-division.

974 Quatre Limaçons à bouche ronde, &

umbiliqués, peu communs: sçavoir, un blanc marbré de jaune - roux, à bande transversale blanche, croisée d'une autre longitudinale de même couleur, à tête élevée, à six orbes renssés, & à lévre extérieure bordée en dehors d'un gros anneau ou bourrelet *; un plus petit, qui en dissére d'ailleurs en ce que son sommer est moins élevé, que sa robe est blanche, à stries sines circulaires, & ornée dans le milieu d'une bande marron; un à-peu-près de même sorme, à robe bariolée en rézeau de blanc & de souci, à pas des orbes bordés d'une suite de petits quarrés blancs & orangés, à base blanche ter-

minée par une large bande orangé, & à lévres retroussées en dehors; & un à tête élevée, à bandes circulaires gris-bleuâtre, fauve & marron, à lévres saillantes & presque applaties.

975. Un Limaçon rare de la Chine, gris de lin, à bouche & pas des orbes bordés d'une petite zône blanche, & ceint dans le milieu du corps, d'une autre de même couleur qu'une ligne blanche bordée de rouge, traverse en forme de croix. M. d'Argenville a rangé cette Coquille parmi celles de mer *.

* Arg. pl. 6.

976. Six jolis Limaçons à bouche presque lett. B. ronde, & peu communs: sçavoir, un de la Chine, verd nué de violet, à pas des orbes couronnés de rayons blancs, dont plusieurs se prolongent sur le corps en zig-zags jaunes, & 3 deux petites bandes longitudinales de même couleur vers l'extrémité du premier orbe; & cinq d'Amérique, dont deux jonquille, à bouche & pas des orbes bordés de rouge & de blanc, & de plus ornés d'une petite bande longitudinale blanche vers le milieu du premier orbe*; un fauve, à bouche & pas des orbes bordés de brun, & orné dans le milieu du corps 55. f. 60. d'une perite zône blanche bordée de brun; & deux verd foncé, l'un desquels a la bouche & les pas des orbes bordés de jaune pâle.

977. Un gros Limaçon à bouche presque ronde, rare, à robe marron, imitant la cou-

Ee iij

leur & l'éclat de la sardoine, à quatre zones blanches dans le corps, dont la derniere se prolonge sur tout le bord de la spirale jusqu'à la

List, tab, clavicule, & à lévre extérieure en bourrelet *.

978. Un autre de l'Amérique méridionale, non moins rare, à robe marron, ornée vers le bas d'une large zône blanche, qui s'étrécissant à mesure qu'elle s'éleve davantage, se change à la naissance du premier orbe, en une simple ligne launâtre jusqu'à la clavicule qui en prend la couleur, à bouche rouge de corail clair, &

* séb1, pl. à lévre extérieure large & retroussée *.

979. Deux gros Limaçons à bouche presque ovale, peu communs, dont un a deux larges zônes dans le corps, l'inférieure rousse, & la supérieure fauve, qui se prolongent sur tous les orbes: l'autre à robe blanche, tous deux à clavicule brune, de forme large, umbiliqués &

Arg. pl. de l'espèce nommée Œil de bœuf *.

980. Deux grands Limaçons rares, à bos-Gualt. tab. 1.

che ovale, à zônes alternatives marron, & blanches nuées de bleu, à fix orbes peu élevés, dont le premier est très-bombé, à large & profond umbilic, & à lévres bordées d'o-

rangé *.

981. Six Limaçons de l'espéce des précédens, a. nº. 3 & 4. sçavoir, un grand couleur de noisette, à bouche bordée en dedans d'aurore vif, & en dehors de blanc, ainsi que l'intérieur de l'umbilic qui

est très-large, & à pas des orbes un peu concaves *; un verd clair, à quelques bandes lon- * Gualt. tab. gitudinales brunes; un rayé par zônes de verd 2. litt. T. clair & de marron; un noisette & un marron. à zônes brunes peu prononcées; & un fauve de diverses nuances, à deux zônes étroites brunes. dont la derniere se prolonge sur tous les orbes. & à umbilic moins grand que les précédens.

982. Douze Limaçons à bouche ovale : sçavoir, un verd clair, à deux doubles zônes brunes dans le bas du corps, à sommet plus élevé, mais du reste semblable à ceux de l'article précédent; deux de la côte Coromandel, peu communs, verd plus foncé, à très-petit umbilic, & conservant leurs opercules; six d'Amérique, à spirales roulées l'une sur l'autre comme dans les Planorbes, à un côté plus concave & umbiliqué, nommés Cornets de Saint-Hubert, dont deux rayés par zônes de blanc & de brun; deux d'olive & de marron, & deux de fauve clair & de marron *; & trois autres Cornets de Saint- * Arg. pl. 28. Hubert, très-petits, à sept orbes roulés dans f. 6. un même plan.

Rumph. tab, 27. litt. P.

983. Deux Limaçons rares, à bouche ovale comprimée, & dont le milieu du premier orbe forme un pli en vive arrête: sçavoir, un blancgrisâtre, à robe très-finement réticulée, à quatre orbes presque dans un même plan, à sommet applati & à base un peu convexe *; & un *Guair. tab.

gris-de-lin rayé de brun, à peu près de même forme, mais un peu plus convexe, à stries longitudinales obliques granuleuses & à lévre extérieure en bourreler.

984. Deux autres non moins rares & umbiliqués, l'un de forme large un peu applatie, à robe fauve clair, ornée par zônes de chevrons canelle & rouge-brun, & à bouche en demiovale, dont les lévres sont légérement retrous-36ba, pl. sées *, l'autre de forme plus élevée, à clavicule applatie, à robe fauve-roux, chargée de plis List. 126. 76. fins & onduleux blancs en forme de rides, à bouche ovale sinueuse, & à lévres très-saillantes en dehors.

> 985. Un Limaçon rare, blanc, à pente bouche demi-ronde s'ouvrant du côté où est placée la spirale, à lévre extérieure retroussée, armée de quatre dents, & intérieure de deux seulement, de forme convexe des deux côtés, & à spirale marquée d'un simple sillon orangé très-

Arg. pl. étroit *. . f. 13 & M.

il tab. 99. Mg. 334.

10. nº. 12 &

986. Un autre Limaçon rare, fauve-roux, Bonan. cl. 3. de forme applatie, à six orbes un peu renssés, dont le plus bas est marqué dans son milieu d'un pli en vive arrête, à base dont le centre est umbiliqué, & à bouche dont les deux lévres retroussées & sinueuses imitent affez les amfractuosités de l'oreille, & finissent par une es-

péce de goutiere qui se jette dans l'umbilic *, espéce nommée le Labyrinthe.

987. Idem.

988. Six jolis Limaçons peu communs: sçavoir, deux à bouche demi-ovale, de forme applatie, blancs bariolés de traits obliques fauves, à deux zônes marron, dont la plus élevée se prolonge sur toute la spirale, à lévres saillantes un peu finueuses, & umbiliqués *; un fauve à bouche demi-ronde, à fix orbes roulés l'un fur l'autre, s'enfonçant dans le milieu qui est umbiliqué d'un côté, & à lévres un peu retroussées, nommé le Cornet de chasseur *; un à bouche *Gualt. tab. demi-ovale, armée d'un côté d'une dent, à robe Rumph. tab. fauve, bordée le long de la spirale d'une zône 27. list. R. blanche, à tête un peu élevée, & à lévres blanches retroussées; un fauve orné sur le milieu du corps d'une zone orangé, à tête applatie, & à lévres très-peu saillantes en dehors; & un blanc à stries fines circulaires, & à tête médiocrement élevée.

989. Dix-huit Limaçons peu communs: sçavoir, deux blancs à bouche demi-ronde, à cinq orbes affaissés dans le milieu, à lévres saillantes, précédées d'un renflement transversal, & umbiliqués; un de Valence en Espagne, à bouche demi-ronde peu retroussée, blanc, à deux

zônes marron dans le bas du corps, bariolé dans le reste de rraits & de zônes fauves : deux

blancs à bouche demi-ronde comprimée, à six orbes applatis du côté de la clavicule qui est brune, renssés & umbiliqués de l'autre, & à pli en vive arrête sur le milieu du premier orbe*:

* LIR. tab. pli en vive arrête sur le milieu du premier orbe *; un petit à peu près de même sorme, mais à clavicule moins affaissée, à bouche demi-ovale, & à lévres sinueuses retroussées, dont l'intérieure sorme une espèce de dent; deux sauves de Geneve, à bouche sinueuse triangulaire, à sept

orbes affaissés du côté de la clavicule, & umbi* Gualt. tab. liqués de l'autre *; deux de l'espèce des deux
premiers de l'article précédent; & huit Lampes
antiques par pendans, dont deux fauve-roux

nuées & bordées de fauve clair, de forme renflée, à bouche sinueuse en forme d'oreille, à lévre intérieure garnie d'une grosse dent, &

List. tab. extérieure de quatre petites *; deux fauve-roux à lévre extérieure garnie seulement de deux

* Arg. pl. dents *; deux petites de Geneve, noisette, à 28. f. 9.
List. 121. 83. bouche sinueuse garnie de trois dents, imitant f. 87.
* Thid. 121. encore mieux l'oreille que les précédentes *; &

93. f. 93.

deux du Mexique de l'espèce qui rampe sur le Cedre, à bouche demi-ovale, à zônes alternatives blanches & brunes, à six orbes un peu élevés, dont le plus bas forme dans son milieu un

pli en vive arrête, & à lévres en bourrelet re* Ibid. tab. couvrant en partie l'umbilic *.

69. Guatre Limaçons à bouche demi-ovale, peu communs, dont deux fauves nués de blanc, à six orbes un peu renssés, à lévres saillantes en dehors, & recouvrant l'umbilic, à bouche placée dans l'un de droite à gauche, & de gauche à droite dans l'autre, formant ainsi l'Unique & la Contre-unique de cette espéce; & deux sauvebrun, remarquables par un ensoncement transversal au milieu du premier orbe, laissant un repli intérieur, & à bouche garnie d'une grosse dent.

991. Dix gros Limaçons d'Amérique, à bouche demi-ovale, & par pendans: sçavoir, deux blancs de forme bombée, marron soncé en dedans, & à lévre extérieure retroussée, nommés l'Oignon blanc*; deux blancs teints en dedans de fauve, & de bleu vers la clavicule, à six orbes très-renssés, & à tête un peu élevée; deux marron clair, à zônes brunes sines & nombreuses, & du reste semblables aux précédens*; * 1bid. tab. deux de l'espèce commune, blancs fasciés de 43. f. 40. deux de l'espèce commune, blancs fasciés de 43. f. 40. deux marron soncé, à six orbes applatis, Gualt. tab. 1. dont le premier a le milieu plié en vive arrête, litt. B. C. espèce rangée aussi parmi les Lampes antiques *.

992. Quinze Limaçons à bouche demi-ovale: Gualt. tab., fçavoir, un rare, blanc nué dans une large zône litt. I. d'orangé, de forme applatie, quoiqu'à orbes rensses, à lévres en bourrelet, garnies d'un côté d'une petite avance intérieure; un blanc teint

de fauve, de forme plus bombée, & à lévres en bourrelet, garnies d'un côté de quatre à cinq * Lift. ub. dents *; un blanc qui ne différe du précédent 94. fig. 95. qu'en ce que la bouche en est plus large & dépourvue de dents; deux blancs & un fauve. à * séba, pl. six orbes un peu affaissés & umbiliqués *; un Gualt. 12b.3. rare blanc de lait, à peu près de même forme. mais sans umbilic, à spirale bordée de bleu céleste, à bouche très-étroite, à lévre extérieure retroussée, échancrée, & sous laquelle on re-* seba, pl. marque deux dents *; un de l'espèce de celui 40. nº. 30. de l'article 978, mais dont la bouche est bordée de noir : un comme les deux premiers de l'article 988; un qui en différe en ce que le sommet en est moins affaissé; deux Lampes antiques de l'espéce des dernieres de l'article 991; trois des

la columelle & les spires intérieures.

993. Onze très-jolis Limaçons de la Chine, à bouche demi-ovale, à cinq orbes un peu ren-flés, & légérement umbiliqués, dont un blanc, quatre citron, & cinq de diverses nuances de noisette & de marron, tous ornés dans le milieu du corps d'une zône ou double zône d'autres couleurs tranchantes sur le sond, se prolon-

variétés décrites à l'article 989. Plus un Limacon coupé transversalement pour en faire voir

* Ibid. pl. geant jusqu'à la clavicule, & un blanc en en-39. n°. 1-8. gier *.

Gualt. tab.; 994. Idem, à de légeres différences près litt. D-E.

coquilles TERRESTRES. 445 dans les couleurs des zônes & du fond.

995. Un carton contenant soixante deux petites boëtes de Limaçons de jardins, prés, bruyeres & forêts de l'Europe & de l'Amérique, de diverses espéces, couleurs, formes & grandeurs, jusqu'à la derniere petitesse, avec les étiquettes des lieux d'où toutes ces Coquilles ont été prises . On y trouve les espéces nommées la Luisante, la Livrée 2, &c. &c.

mées la Luisante, la Livrée 2, &c. &c.

996. Sept Limaçons: sçavoir, deux trèsGualt. tab. 1,
beaux de la Chine, de l'espéce de ceux de l'arlint. C-Q.
libid. tab. 2,
ticle 993, dont un marron clair à large zône litt. A-F.
blanche se prolongeant sur toute la spirale, & 12 s. s. 4 & 2.
un blanc à zône étroite brune dans le milieu du
premier orbe, mais ne se prolongeant pas plus
loin; & cinq Limaçons-Sabots à bouche demiovale, dont deux gris-de-lin, à base & clavicule brunes, & à spirale bordée d'un lizeré de
même couleur 3; & trois ornés sur tous les orbes de zônes alternatives blanches & rougeGualt. tab. 4.
brun, plus ou moins larges, tous à sept orbes litt. L.
& à lévres relevées en tranchant.

997. Vingt-quatre Buccins; sçavoir, un rare à bouche ronde & petite, orné de zônes marron sur un sond jaune pâle, à six orbes renssés, séparés par des pas prosonds, de sorme essiée, approchante de celle des Vis, & à clavicule émoussée; un autre peu commun, à bouche ronde assez large, lie de vin soncé, à robe très-

* Lift. tab. finement réticulée, & umbiliqué *; douze pe-25. f. 23. tits couleur de chair vif, & du reste semblables

* Ibid. tab. au précédent *; neuf autres de même espèce. 26. f. 24 des environs de Geneve, blanc-grisatre, dont Gualt. tab.4. cinq avec leurs opercules; & une petite Unique litt. B. ou Bouche à gauche, blanche, ornée de deux zônes canelle sur le premier orbe, & de flammes longitudinales de même couleur sur les sui-

* Lift. tab. vans *.

33. f. 31.

998. Deux Buccins rares en pendant, à bouche presque ovale, blancs nués dans une large zône & par traits longitudinaux intertompus de fauve-roux, à lévres un peu retroussées, dont une Bouche à gauche & une Bouche à droi-

* Ibid. tab. te *. Les Hollandois ont nommé cette espèce le 35. f 34. Gualt. tab.5. Pavillon du Prince.

litt. O.

999. Idem, à cette différence près que la Contre-unique est toute blanche, & l'Unique foible en couleur.

1000. Deux Buccins de la forme des précédens, mais un peu moins allongés, dont une Unique jonquille vif dans le bas, s'éclaircissant vers le haut. & à bande longitudinale brune

* Lift, wh. fur le premier orbe seulement *: & un blanc à 54. f. 33. zônes gris-de-lin sur le premier orbe, dont la Gualt, tab. f. plus élevée se prolonge sur le suivant, & de Arg. pl. p. plus orné de deux bandes longitudinales brunes fur le premier & le second orbe.

1001. Trois Buccins, dont une Unique de

l'espéce de la précédente, citron vif dans le corps, s'éclaircissant vers le haut, mais dépourvue de bande brune; & deux blanc-grisâtre, de

forme un peu moins renssée & à neuf orbes.

1002. Quatre Buccins: sçavoir, deux Uniques, à robe blanc-sale nué de verdâtre, ornée dans le premier orbe de zônes jonquilles & bleues, stambée & tachetée par zônes de grisbleuâtre dans les suivans, jusqu'à la clavicule qui est rouge vis; & deux Contre-uniques à clavicule brune, fasciées dans les orbes suivans de blanc-sauve & bleuâtre, de gris-de-lin & de brun.

1003. Quatre Buccins peu communs: sçavoir, deux des montagnes d'Amboine, marron bariolé de blanc, à dix orbes se recouvrant l'un' l'autre, ressemblant pour la forme à une grosse Chryfalide un peu comprimée, à bouche demiovale très-étroite, armée de fept dents, & umbiliqués, espéce nommée Gueule de loup *; un grisatre flambé par bandes longitudinales de 9 lett. T. marron, de forme allongée, à longues lévres 27 litt. I retroussées en bourrelet, fléchies & sinueuses, litt. S. ayant de part & d'autre une avance en forme de dent, qui rendent la bouche femblable à une oreille *; & un de même espéce, entiérement * Lift. tale blanc & de forme plus raccourcie. Plus quatre 32. fig. 30. petites boëtes de Vis-Buccins, la premiere contenant une Unique de Valence en Espagne,

blanche, à bouche armée de deux dents sous la lévre extérieure, & d'une seulement sous l'intérieure; & une Contre-unique de même sor-

tient neuf petites Uniques de Geneve, blancgrisatre, à stries fines longitudinales, & à lévre

² Ibid tab. intérieure armée de deux dents ² : la troisieme ^{41. f. 39.}
Arg. pl. 28, en contient onze autres de forme plus effilée ³; f. 20.
Gualt. tab.4. & la quatrieme, quatorze autres Uniques des Bitt. C. mêmes lieux, de forme plus courte, ressem³ List. tab.
41. sig. altera. blante à celle des Enfans au maillot, & à bouArg. pl. 28.

f. 19. che garnie de trois dents 4.

40. fig 38.

1004. Sept Vis-Buccins d'Amérique, peu communes pour leur grosseur: sçavoir, cinq à huit orbes médiocrement bombés, à robe omée dans le corps de zônes alternatives plus ou moins larges blanches, gris-verdâtre, rouge & marron, & vers la tête de slammes longitudinales des mêmes couleurs, espéce nommée le

séba, pl. Pavillon d'Hollande; & deux en pendant,

39. n°. 62-74.

List. tab. 12. de même forme, cerclées dans toute leur robe

n°. 7.

Arg. pl. 11. de zônes inégales en largeur, blanches, pour
lett. M.

pre foncé, aurore, gris-de-lin & citron pâle,

à clavicule marron foncé, & de la variété nom-

6 Ibid. pl. mée le Ruban 6.

séba, pl. 40. 1005. Deux Rubans un peu moins grands, fig. 32. mais dont une Unique, & par cette raison trèsf. 10. rare.

1006. Deux grandes Vis-Buccins, dont une très-

très-rare & Unique, grise, à flammes longitudinales rousses, & à robe réticulée *; & une * List. tab, Contre-unique blanche peu commune, à stries 39 longitudinales très-fines, & à clavicule un peu chruse *.

6. litt. L

1007. Un carton contenant quarante-deux boëres de Vis-Buccins de forme très - variée : scavoir, une rare blanche papyracée, à stries longitudinales très-fines, de forme un peu bombée, à clavicule aiguë, à bouche demi-ovale, bordée de fauve, à lévres un peu retroussées, & umbiliquée; une qui ne différe de celle-ci qu'en ce que sa forme est plus pyramidale, & sa clavicule un peu affaissée; une blanc-grisatre à bouche semblable à celle des précédentes, mais de forme plus effilée; une fauve, à stries longitudinales, de la forme des Enfans au maillot, & à bouche garnie d'une seule dent *; un Enfant au maillot, à stries plus fines. de 4 litt. R. forme moins renslée & plus cylindrique que le précédent; une Vis-Buccin fasciée dans tous ses orbes de brun & de marron, de forme un peu bombée, à clavicule applatie, & à lévres faillantes en vive arrête; deux de forme plus effilée, blanches cerclées de lignes fauves, à lévre intérieure ou bas de la columelle convexe & cylindrique, strié transversalement, & laissant derriere un umbilic *; deux fasciées comme les précédentes, mais à bouche ovale simple, M.

Ff

Tome I.

Lin. 19h. fans stries & sans umbilic 1: une jaune-pâle pa-1.2. 1bid. f. 1. pyracée 2; deux blanches à bouche presque ronde. & légérement umbiliquées; deux de Valence en Espagne, dont une blanche veinée. & • пыл. г. г. l'autre blanche fasciée de fauve 3: dix Vis d'Aranjuez de différentes grandeurs, fauve clair ou 4 rold tab. grisatre, à clavicule tronquée 4; quatre petites 17. f. 22. Gualt. tab. 4. du même endroit, à coque mince & transpalitt. O. P. Q. rente, à tête effilée, terminée par une clavicule cad.desSc. an. arrondie en mammelon 5; une boëte de petites 1759, pl. 3. Vis blanches à une zône noire dans le bas 6; List. tab. une boëte d'autres de même espéce, mais tou-Mém. del'Ac. tes blanches; une de petites Vis fauves de Ge-List. tab: neve, ventrues, à six orbes & à bouche gamie 7 Gualt. 12b. de dents 7; une d'autres de même forme, mais * Lift. tab. plus effilée & à neuf orbes *; une d'autres en-20. fig. 16. core plus petites, lisses, fauves, à six orbes, Arg. pl. 18. nommées Grain d'orge 9; une d'autres à cinq f. 15. orbes, nommées le Grain d'avoine 10; une de 22. f. 19. très-petits Enfans au maillot; & cinq d'autres variétés, dont deuxinfiniment petites, trouvées dans les environs de Geneve. Plus, quatorze Rubans de couleurs très-variées, & une Gueule de loup.





TROISIEME PARTIE.

ZOOPHITES.

Quoiqu'A strictement parler, nous ne connoissions point de véritables Zoophites, c'est-à-dire, d'Animaux-plantes, nous nous servirons du premier de ces noms, consacré déja par l'usage, pour désigner une certaine classe d'animaux marins, qu'on ne peut regarder ni comme des Insectes, ni comme des Coquillages, ni comme des Poissons proprement dits, mais qui tiennent une espéce de milieu, & dont plusieurs n'ont qu'un sentiment de vie sort obscur.

Nous les rapporterons tous à deux familles, dont la premiere contiendra les Etoiles de mer, & la seconde les autres animaux mous, auxquels M. Linnæus a donné le nom de Mollusques.


PREMIERE FAMILLE.

' ETOILES DE MER.

Les dépouilles de ces animaux approchent à plusieurs égards de celles des Oursins; elles sont composées extérieurement d'un cuir calleux souvent hérissé de petites éminences osseuses qui le traversent, & en dedans d'un nombre prodigieux de vertébres & autres osselets articulés uniformément, soit ensemble, soit avec les éminences ofseuses de la peau.

Leur forme, presque toujours radieuse, leur a fait donner le nom d'Evoiles de mer. Elles sont à plus ou moins de rayons, chacun desquels est formé ou de deux suites de vertebres laissant entr'elles un canal plus ou moins large, ou d'une suite de vertebres presque rondes & percées routes dans le milieud'un petit trou qui communique des unes aux autres. C'est d'après ces caracteres généraux que nous en ferons avec M. Lincke * *V. son our deux Sections que nous nommerons lis marinis, Lipst 1733, infolio, folio,

- 1°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes fendus en dessous suivant leur longueur, & dont les unes ont moins de cinq rayons, les autres cinq, & les autres plus de cinq.
- 2°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes entiers, qui comprennent les Etoiles vermisormes, les Chevelues & les Meduses, que l'on nomme aussi Etoiles arborescentes ou Astrophytes.



GENRE PREMIER.

ETOILES A RAYONS FENDUS.

1. SEPT variétés d'Etoiles à quatre rayons, peu communes, & nommées Cruciformes: scavoir, une des côtes de Barbarie, à rayons de sept pouces de long chacun, à surface supérieure couverte de grains, qui vus à la loupe, font autant de petites houpes cylindriques serrées les unes contre les autres, & bordées de quarrés-longs en relief aussi granuleux : le milieu de chaque rayon s'éleve en forme de côte, & présente ainsi une seconde étoile; ce qui fait donner à cette espèce le nom d'Etoile étoilée : sa surface inférieure est recouverte d'un amas trèsnombreux de petites pointes; une d'Amérique, de moyenne grandeur, à rayons larges dans l'origine, & s'étrécissant vers le bout, à surfaces supérieure & inférieure chargées de tubercules ou mammelons garnis de piquans coniques plus ou moins gros, & à bords des rayons formés de mammelons granuleux, plus gros que les

*Linck. tab. autres, espèce nommée Falcisorme *; une des r. s. s. s. linck. tab. lindes, de moyenne grandeur, couverte en s. litt. D. séba, pl. 5. dessus d'espèces de pustules granuleuses, qui l'ont sait nommer Etoile à grains de petite vé-

role *; une d'Amérique, à rayons étroits ar- * Linek, tab. rondis, plus longs & plus effilés que dans la 1. n°. 1. précédente, contournés, & où l'on remarque à peine la fente longitudinale, qui est bordée de petits grains ovoïdes très-nombreux : les tubercules granuleux de sa surface lui ont fait donner le nom d'Etoile à grains de millet; une petite de nos mers, à surface supérieure réticulée & de l'espèce des Coriacées *; & deux * Ibid. tab; autres variétés de Coriacée, dont une des Indes. à rayons en forme de pétales, recourbés à l'extrémité, nommée de-là Pétaloide *; & une de * bid. tab. nos mers, hérissée de petites pointes coniques, & ayant un de ses rayons plus court que les. autres.

2. Une Etoile étoilée à einq rayons de sept pouces & demi de long chacun, parfaitement conservée, & des mêmes parages que la premiere de l'article précédent: son organisation est à-peu-près la même, mais elle en différe en ce que les bords du dessus y sont armés de piquans courts qui s'élevent de chaque quarré-long : ces piquans sont un peu courbés vers la pointe du rayon auquel ils appartiennent; le tranchant du pourtour de toute l'Etoile est aussi hérissé de pointes longues couchées dans son plan, & à distances égales les unes des autres, ce qui l'a se 6. n° 6. fait nommer Pedinée *.

Séba, pl. 7.

Aldrov. de in-3. Deux grandes Etoiles étoilées à cinq fea. 1. 7. p. Ff iv

rayons; l'une ne différe de la premiere de l'article premier, que par le nombre de ses rayons, l'autre est de l'espéce de la précédente.

4. Huit Etoiles à cinq rayons: sçavoir, une de nos mers, très-grande & peu commune, à rayons partant d'un disque qui fait donner aux Etoiles où on le remarque, le nom de Soleil, revêsus chacun de trois côtes longitudinales épineuses, & de stries transversales, qui s'étendent des épines d'une côte aux correspondantes de

* Hold tab. que par le nombre de leurs rayons *, qui d'aila8. n°. 47. Rumph. tab. leurs sont inégaux ; cette derniere circonstan-15. litt. E. ce les fait nommer Cometes digitées miliaires ;

ce les fait nommer Cometes digitées miliaires; une petite de nos mers, à rayons inégaux trèshérissés d'épines, nommée Comete épineuse; deux des mêmes parages, à rayons en some de pétales, aigus à l'extrémité, hérissés en dessus de petites pointes cylindriques, & qu'on peut

*Linex. tab. nommer Pétaloide veluë *; une de l'espèce de , & 10. n°. 19. celles-ci, mais dont les rayons retroussés en faisceau & en forme de tulipe, laissent mieux

voir la structure de la sace inférieure; à unsquelette d'une semblable, montrant en dessus une séba, pl. espèce d'ouvrage en filigrane très - curieux*,

que des fourmis auxquelles on a laissé manger le cuir & le dedans, n'ont point attaqué. 5. Une grande Eroile des Indes, à cinq rayons pyramidaux, de forme renssée & trèsélevée en dessus, un peu concave en dessous, ornée d'un rézeau, à mailles triangulaires, sur chaque jointure desquelles s'éleve un denticule conique, & bordée dans son contour de gros mammelons armés chacun d'un denticule semblable: on nomme cette espèce gros Pâté réviculé*.

6. Un gros Pâté réticulé d'Amérique, diffé-71.

rent de l'espèce précédente en ce qu'il est moins n°.1.

convexe en dessus, plat en dessous, & que les denticules du rézeau y sont plus nombreux,

& disposés d'une maniere moins réguliere *.

• Thid. pl. 8.

7. Quatre Etoiles à cinq rayons; sçavoir, no. 1.

deux Pâtés réticulés des Indes, peu communs,
mais un peu dégradés; un à sommet pentagone dont chaque angle est terminé par un gros
tubercule; ce qui a fait donner à cette espéce le
nom de Fort pentagone*; & un bordé dans son *Linck. tabé
contour & sur le milieu de chaque rayon, de 26. no. 41.

gros tubercules lenticulaires, à robe semée de
tubercules semblables, mais moins grands &
très-serrés dans la partie insérieure *; les rayons *Séha, pl.
de ces deux espéces d'Etoiles se terminent en 6. no. 11.

pointes émoussées; un Pâté réticulé d'Amérique,
de l'espéce de celui de l'article cinquieme, mais
moins grand, & à sommet plus ensoncé; & une
Etoile des Indes, à rayons pyramidaux trian-

ho. 5 & 6.

8. a°. 10.

850 n°. 59.

34. nº. 57.

8. n°. 3.

gulaires, bordés tant dans leur milieu que dans leur contour, de piquans assez longs, qui peuvent faire nommer cette espéce Pyramidale pedinėe.

8. Seize Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une pentagone peu commune, bordée en dessus & en dessous de gros tubercules, & ornée en dessus seulement de cinq compartimens de petits tubercules cylindriques, espéce nommée petit *Linck. pl. Pâté *: un Pâté réticulé de moyenne grandeur, 33. n°. 37. Séba, pl. 6. à fommet circulaire enfoncé, & à denticules n°. 9 & 10. très-nombreux; trois petites réciculées lentigineuses, de forme un peu applatie, à sommet * Ibid. pl. s. aussi enfoncé *; deux Digitées à grains depetite vérole, qui ne différent de celles de même nom de l'article premier, que par le rayon qu'elles *Linck.tab. ont de plus *; une Comete digitée miliaire des Indes; cinq Etoiles coriacées de nos mers, dont *Ibid. tab. trois réticulées *; une hérissée de petites pointes * Ibid. tab. coniques *, ayant un de ses rayons plus court que les autres; & une platte à rayons émoufsés, & à cavité dans le milieu de sa partie su-* Ibid. ub. périeure *; une perite peu commune, convexe en dessus, concave en dessous, & dont la surface paroît comme chagrinée: elle est ornée à son sommet d'une perite Etoile à cinq rayons, dont les angles saillans répondent aux angles * Ibid. tab. rentrans de la grande *; une à-peu-près sem-

* Séba, pl. blable de l'Isse de Sainte-Helene *; & une

qui n'en dissére que par sa forme applatie.

9. Treize autres : sçavoir, une Etoilée rare, aussi mince que le carton le plus fin, dont les rayons grêles sont comme engagés dans une membrane granuleuse, qui lui a fait donner le nom d'Etoile en patte d'oye *; deux perites à * Linck. tab. grains de petite vérole, dont une digitée ou à Aldrov. l. 7. rayons arrondis, & l'autre à rayons applatis & deinf. cap. 18. triangulaires; une peu commune, à corps plus petit & plus élevé, à rayons plus étroits & moins plats que la précédente, & à robe semée de tubercules à-peu-près sphériques; trois de moyenne grandeur de la Méditerranée, étoilées & peclinées*, dont une à sommet élevé en *Linck. tab. demi-sphere, & à verrue élevée *; une à cinq *Lochner rabosses aux origines des arrêtes longitudinales leian. p. 76. formant la seconde étoile, & à dents de peigne tab. 22. relevées toutes en en-haut, & la troisseme à sommet & verrue groupés ensemble en bosse irréguliere; une petite de Curação, à dessus plat & granuleux, dans le milieu duquel on observe une petite cavité forée au centre, & à bords canelés transversalement *; deux Digitées réticuiles de la Méditerranée, à rayons longs, partant 4.10.14 d'un tronc assez petit *; deux Pâtés réticulés, * Ibid. tab. comme le second de l'article précédent, & un 3 to 10. 10. 16. squelette d'Etoile de l'espéce de celui par où finit l'article quatre.

10. Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une

Digitée miliaire de l'Isle de France ; deux Coriacées affez grandés, dont une réticulée des mers de Hollande, & l'autre des mers d'Irlande, à rayons plats & rabotteux, chargés en dessus d'une côte longitudinale bien prononcée, &

36. nº. 61.

*Linck. tab. nommée la Jaune vulgaire de Luid *; deux Pâtés réticulés de moyenne grandeur, dont un à sommet enfoncé. & l'autre à tronc & lobes applatis; deux Soleils, dont un à pointes & treillis de moyenne grandeur, à disque du milieu un peu enfoncé, & lobes plus larges à proportion que dans celui de l'article quatre; un à * Ibid. tab. rayons applatis, nommé le Soleil plat coriaci*;

* Ibid. tab. & une pedinée de moyenne grandeur *. . nº. 13.

11. Une grande Etoile pentagone de l'îsle de France, qui est une variété rare de l'espèce des Pâtés, que nous n'avons trouvé dessinée dans aucun Auteur : elle forme un pentagone régulier de sept pouces de longueur fur un pouce d'épaisseur, chargé en dessus de petits denticules coniques clair semés sur une espèce de rézeau, & en dessous d'un compartiment régulier de petits tubercules oblongs, disposés par groupes de cinq à six ensemble, & parallelement aux deux rainures entre lesquelles ils se trouvent, imitant par-là un ouvrage en mosaïque des plus élégans: les bords en sont très - finement granulés, & coupés dans toute leur largeur par les cinq rainures. Plus, un Carton contenant dixhuit petites boëtes d'osselets, vertebres, denticules, &c. provenant d'une Etoile de cette espèce.

d'un pied de long, à quatre grands rayons triangulaires simples, & un cinquieme formant vers son milieu une fourche, & se divisant ainsi en deux plus petits, à la maniere d'un des rayons du Soleil représenté dans la pl. 40, n°. 70 de Lincke: cette espèce peu commune est du genre des Pedinles, & ne dissère de celle de l'article second de notre Catalogue, que par la bisurcation d'un de ses rayons: elle peut se rapporter à celle dont parle Séba*.

13. Une autre de même espéce, un peu moins grande, & semblable, à cela près que la fourche du rayon double, ne commence qu'à une plus grande distance du centre, que l'angle de cette sourche est plus aigu, & les branches qu'elle sorme, plus petites.

14 Deux Etoiles peu communes: sçavoir, un gros Paté réciculé à six rayons, dont un plus petit, & moins écarté de ses voisins que les autres, & paroissant naître du dessous en forme de petite queue: il est néanmoins garni de sa rainure longitudinale, partant du centre comme celle des autres; & une Etoile en patte d'oye, qui ne différe de celle de l'article 9, qu'en ce qu'elle est à six rayons, engagés dans

* Séba, pl. 8. n°. 9. une membrane encore plus mince, formant un hexagone finueux.

- 15. Une Etoile rare de l'Isle de France, de forme hexagone réguliere, & qui ne dissére de celle de l'article 11, que par le lobe qu'elle a de plus.
- 16. Trois Etoiles: sçavoir, une Digitée miliaire à six rayons d'inégale grandeur, dont un très-court; une grande Coriacée à sept rayons triangulaires applatis & épineux: c'est le Soleil

* Aldrov. de digité d'Aldrovande *; & une Coriacée à large inset. 1. 7. p. corps circulaire réticulé & hérissé de piquans 755.
Linek. tab. 34 mousses, d'où partent douze rayons semblables a. . 52. & courts en dessus, mais plus longs, & naissans d'un cercle plus étroit en dessous, espèce

* Ibid. tab. nommée Tournefol à douze rayons *.

r7. n°. 18. Séba, pl. 8. 17. Idem, à cette différence près que l'Etoile n°. 5. Aldrov. ibid. à sept rayons est encore plus grande, & à bords P. 757. pectinés.

18. Un rare & beau Tournefol de sept pouces de diametre, à trente-sept rayons en sorme de doigts serrés les uns contre les autres jusqu'à quinze lignes ou environ de distance de la circonférence, à corps rond & élevé, hérissé de petites houpes cylindriques blanchâtres, qui se partagent en trois rangs longitudinaux sur chacun des rayons: cette Etoile qui est de la plus parsaite conservation, vient du beau Cabinet de seue Madame de Boisjourdain, qui l'a fait mon-

463

ter sous une cloche de crystal, dont le pied est en cuivre, & le sond garni d'une glace, au moyen de laquelle on voit très - distinctement la surface insérieure de ce curieux morceau.

19. Deux autres Tournesols, dont un à treize rayons en forme de doigts velus & assezlongs *, *Linck. tab. & un qui ne dissére du précédent, qu'en ce qu'il est à trente-huit rayons, & un peu dégradé.



GENRE SECOND.

ETOILES A RAYONS ENTIERS.

rayons: sçavoir, quatre à queue de lézard, ainsi nommées de la ressemblance de leurs rayons à la queue de cet animal: ces rayons arrondis en dessus, plats en dessous, sont composés de vertebres articulées ensemble comme par nœuds, & sortent d'un corps lenticulaire applati, trèsremarquable en ce qu'il est chargé d'espéces de petites écailles, dont celles qui se trouvent placées deux à deux à la naissance de chaque rayon, imitent parsairement les aîles d'une mouche qui * Linck, tab. auroit la tête tournée vers le centre de l'étoile *;

mais différens en ce qu'ils sont chargés de quatte rangées longitudinales de pointes longues plus

* linck ab autoit la tete toutine vers le centre de l'étoite ;

2. n°. 4.

Mém. dell'Ac. une qui différe des précédentes en ce que le

1-12. p. 132. corps en est pentagone , que les rayons en sont
pl. 7. f. 5.

ronds, & que les cinq fentes de la bouche pa*Linck.tab. roissent à peine *; une de même espéce, bariolée par zônes, mais mutilée d'un de ses
rayons; quatre de l'Isse de France, noirâtres,
à corps rond granuleux, d'où partent des
rayons écailleux comme ceux des précédentes,

ou

ou moins fines: espèce nommée Scolopendroïde granuleuse *; quatre de l'Amérique, qui ne dif- *Linck. tab; sérent des précédentes qu'en ce que le tronc en est pentagone, & plus petit à proportion *; & * 1bid. tab; une autre Scolopendroïde rare, à rayons chargés de piquans blancs, fins, transparens & granuleux, forés dans toute leur longueur *. * tbid. tab;

21. Trois Etoiles chevelues: sçavoir, deux 34-n. 36. petites à dix rayons, naissans deux à deux de eing tiges courtes, composés en dessus de piéces en forme d'anneaux, articulées ensemble. alternativement larges d'un côté, & étroites de l'autre, creusés en dessous en forme de gouttiere, & bordés de chaque côté de filets ou pentes pattes alternes aussi articulées : les cinq tiges principales fortent d'un petit tronc pointillé, arrondi en dessus en forme de demi-sphere, plat en deffous, & ne montrant aucun vestige de bouche : espèce nommée par Luid Décempede de Cornouaille, & par Linck Rosacée *; & une grande de dix-sept rayons organisés comme 37. 20. 66. ceux des précédentes, l'un desquels manque: les seize restans naissent de cinq tiges fort courtes, qui sortent elles - mêmes d'un petit tronc cylindrique, foré dans son milieu, du haut duquel partent en forme de verticille, d'autres rayons courts & déliés, posés dans un plan párallele aux grands: chacune des cinq tiges principales se d'abord en deux : de celles-

Tome I.

ci, sept se subdivisent en autant de rayons, & trois restent simples, ce qui donne le nombre des dix-sept rayons que nous avons dit devoir se trouver dans cette Etoile : cette espèce, qui a beaucoup de ressemblance avec celle que iack tab. Lincke nomme Tête de Méduse brune *. & la

662, pl. Lune-marine de Séba *, pourroir bien n'être, ainsi que la premiere de cet article, vu le défaut de bouche qu'on y remarque, que l'extrémité d'une tige d'Etoile arborescente, différente cependant de celles qui sont connues sous le nom de Méduses, ainsi que l'a conjecturé M. Guettard, en parlant du Palmier marin.

2.2. Un rayon d'Etoile arborescente connu sous le nom de Palmier marin, portant environ dix-sept pouces de haut, & renfermé dans une case de verre. Ce morceau unique dans son espéce, est extrêmement précieux par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Astéries, des Encrinites & des Entroques : il nous vient auffi du Cabinet de feue Madame de Boisiourdain. qui l'avoit reçu de la Martinique où il avoit été porté par un Officier qui venoit des Indes, & qui ignoroit dans quelles mers cet animal avoit été pêché : quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il fait époque dans l'Histoire Naturelle, depuis le scavant & curieux Mémoire que M. Guettard a donné à son sujet. Nous sentant incapables de rien ajouter à l'exacte description quen a donnée tet habile Naturaliste, nous y renvoyons nos lecteurs *.

23. Une tres-belle Tète de Médufe de la Nou-l'Ac.R. des Sc. velle-Espagne, & parfaitement conservée, dont 224. & suivle corps a près de deux pouces de diametre : pl. 8.9. & 102 l'origine de chacun des cinq gros rayons est chargée en dessus de cinq grosses côtes longitudinales épineuses, & marquée en dessous de trois rangées de points : l'extrémité de ces cinq rayons ou troncs est percée latéralement de deux trous, à l'endroit où se sait la premiere division en deux groffes branches; qui se subdivisent bientôt après elles-mêmes en deux autres, & ainsi de suste, jusqu'à un nombre prodigieux de ramifications toutes semblables, dont les dernieres sont recourbées en forme de cheveux frisés, & donneroient à l'Etoile entière, si elles étoient développées, une extension de près d'un pied & demi : on nomme cette espéce Astrophite ou Méduse à côtes *.

24. Une autre Méduse portée sur un pied de 29 30.31. bois des Indes, & renfermée sous une cloche 16. litt. A. B. de verre: elle différe de la précédente en ce no. 1. que son corps a près de trois pouces de diametre, & se termine en une espéce d'écusson d'un pourtour très-gracieux, qui a fait donner à certe espèce le nom de Méduse à écusson *: *Linck. tab. les branches & les ramifications de celles-ci se 48 & 49. recourbent en dessous, imitant une rose de Jé-no, 12 114

richo, ou un sphéroïde applati de près de huit pouces de diametre sur quatre pouces & demi de haut: ces branches sont armées en dessous de deux rangées longitudinales de petites stries transversales, sormées chacune de quatre petits tubercules aigus, & assez ressemblantes à des pattes de chenille.



SECONDE FAMILLE

MOLLUSQUES,

25. VINGT-UN Mollusques desséchés : sçavoir, deux Polypes de la mer des Indes, l'un mâle, l'autre fémelle, une Séche, un Calemar de la grande espèce, une Holoturie ou Verge marine, deux Concombres marins, cinq Orties de mer, six Plumes marines ou Verges ailées, dont trois variétés; une quatrieme variété de Plume - marine semblable à une large seuille de roleau, espéce que Séba dit être fort rare *, & *Séba, som. deux Mains de mer.

26. Vingt-cinq autres Mollusques dans l'esprit-de-vin: sçavoir, dix Calemars de la petito espéce, une Velette de la Méditerranée, deux Anemones de mer, quatre Chenilles ou Taupes marines, dont une des parages de Hollande, remarquable par ses poils en forme de pinceaux jouant l'opale *, & trois de la Méditerranée, l'une desquelles adhère à une Scolopendre ou Pinceau de mer, & à des Corallines; une Pomme-folle de mer; une Ortie de mer, des Concombres & des Raifins de mer; une Holoturie, deux Séches, & trois Poumons marins,

Gg iii



QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES.

C e sont des animaux couverts d'une proûte assez dure, mais molle en comparaison des coquilles ou écailles pierreuses des Testacées. On les divise ordinairement en trois genres, dont le premier comprend ceux qui ont le corps allongé, tels que les Ecrevisses, les Langoustes, &c. Le second renserme ceux dont le corps est large & évasé, tels que les Crabes; & le troisieme les Crustaçées à corps arrondi, ou les Cancres.



GENRE PREMIER.

CRUSTACÉES A CORPS ALLONGÉ,

1. UNE Langouste de la mer des Indes 1, 1 Rumph. desséchée & parfaitement conservée.

2. Une grande Squille des Indes, nommée par Rumphius Squille large ou Cancre-ours², ² Hold. tab. & une très-grosse Langouste de nos mers.

3. Huit Crustacées: sçavoir, une Ecrévisse de mer d'Amérique³, une de Norwege ⁴, une ³-Séba, tomis Squille sabloneuse de nos mers, de l'espéce appellée Mante⁵; l'Ecrevisse nommée Lion de ³-Sibid. planer par Rondelet⁶; un petit Cancre-ours, & ²⁰-N⁰-22. (a lbid. planer par Rondelet⁶; un petit Cancre-ours, & ²⁰-N⁰-22. (a lbid. planer Chevrette de nos mers ⁷; une Chevrette du 19. n°. 19 & (a lbid. planer) détroit de Davis ⁸, & une Langouste des Indes, ⁷-7 bid. planer par Rondelet ⁸, & une Langouste des Indes, ⁹-7 bid. planer par Rondelet ⁹-1 bid. planer

4. Les mêmes Crustacées de l'article précédent, à l'exception du second & du dernier, qui sont remplacés par une petite Ecrevisse de mer d'Amérique; & une grosse Ecrevisse d'eaux douce.



GENRE SECOND.

CRUSTACÉES A CORPS LARGE ET ÉVASÉ.

5. On rare & beau Crabe d'Amérique, verdâtre: ses pieds, ses deux longs bras, & le contour de sa coque sont hérissés de pointes, mais ses pinces sont lisses, & au lieu de se terminer en pointe comme dans les autres espèces, leur extrémité est arrondie, un peu concave & dentelée: la partie supérieure de sa coque est couverte de petits mammelons sort serrés, la plûpart peu élevés,

6. Deux Crabes rares, l'un de la côte Coromandel, ayant sur le dos une croix très-bien faite, avec deux personnages de chaque côté. Ces Crabes sont rares même dans le pays: on

* China il- peut voir dans le Pere Kirker *, l'origine merlustrata. P 35. veilleuse qu'il attribue à la croix dont ils sont décorés: l'autre est d'Amérique, à larges taches rouges, & de l'espèce de celui qui est repré-

* séba, tom. fenté dans Séba *.

7. Quatre aurres Crabes: sçavoir, deux Saxatiles d'Amérique, dont un rouge tacheté de * Ibid. pl. jaune pâle, à bras gros & courts *: l'autre à

* Ibid. pl. jaune pâle, à bras gros & courts *; l'autre à coque bordée vers la tête de piquans applatis en

forme de petites feuilles dentelées, à jambes velues, & à bras épineux; & deux de nos mers, dont un à pinces en crête de coq, nommé delà Coq de mer 1; & un Poupart, dont le dos est 156ba, tom, chargé d'une touffe de Coralline, de l'espèce 1 pl. 20. nº. nommée Queue d'écureuil, & de quelques Rumph. tab. Glands de mer.

11. nv. 2 & 3,

- 8. Sept Crabes: sçavoir, un des Indes, peu commun, hérissé d'épines & de tubercules qui le rendent fort hideux 2; le Sillonné de Rum- 21bid. tab. 9. phius 3; deux Crabes velus 4; l'un mâle, l'autre 11 bid. tab. 6. femelle; le premier est presque totalement re- litt. O. couvert par un alcyon de substance songueuse 11. nº. 1. & coriacée; deux Coqs de mer, l'un mâle, l'autre femelle; & un d'Amérique, de l'espèce du second de l'article précédent, remarquable par une cicatrice qu'il a sur le dos, & par une pince naissante qui remplace celle qui lui a été enlevée par quelque accident.
- o. Vingt-deux petits Crabes, formant quatorze variétés, entr'autres un Crabe de la Chine, à rides granuleuses, très-rare. Plus, la derniere articulation d'une des jambes postérieures d'un Crabe de Sicile, garnie de son ongle, & reconverte de longs poils soyeux couleur d'or . 3. pl. 18. nº.



GENRE TROISIEME.

CRUSTACÉES A CORPS ARRONDI.

*Rumph. 10. Un Cancre des Moluques * parfairement tab. 12. litt. conservé dans une boëte vitrée.

11. Un grand & très-beau Cancre squinade * Séba, pl. de la Méditerranée *, couronné d'un groupe al. n°. 2 & 3. considérable de Glands de mer.

considérable de Glands de mer,

12. Vingt-deux Cancres de moyenne grandeur & petits: sçavoir, quatre variétés de Cancres squinades, dont un à longs bras; une Arai* Ibid. pl. gnée de mer, à coque lisse & à bouche pointue*;

* Ibid. pl. une à coque triangulaire *, & trois à coque graloid. pl. nuleuse *; deux variétés de Cancres velus; sept

19. n°. 10 & autres petits Cancres, un pou de mer, & un
Bernard l'hermite dans un burgau.





CINQUIEME PARTIE.

POISSONS.

I. Un Chien de mer de cinq pieds de longueur; & un gros Poisson arme ou Porc-épic de mer desséchés & bourrés.

2. Deux Porc-épics de mer : le corps de l'un est rond comme un ballon, celui de l'autre est de forme ovoïde.

3. Trois gros Poissons desséchés: scavoir un Diable de mer *: l'Orbis à tête de liévre de Grew *, & un Porc-épic de mer.

* Jonst. tab; 47. f. 4 & s. Grew. Muf. p. 108. tab. 7.

4. Trois Poissons desséchés, l'un peu commun, est la petite Licorne de mer du Brésil *; les deux *[bid. p. 104] autres sont deux variétés de Porc-marin, dont une de la Méditerranée *, & l'autre des Antilles, à grandes taches blanches sous le ventre. Hill. a

5. Vingt-deux autres Poissons desséchés: sça-Grew. Mus. p. voir, cinq variétés de Poissons-coffre, dont trois triangulaires & deux quadrangulaires; deux petits Poissons - armés, l'un quadrangulaire, l'autre sphérique; la Pastenaque nommée l'Aigle; deux Rémores ou Sucets; une Hirondelle de mer; deux variétés de Trompette; un Hippocampe ou petit Cheval marin; un Serpent marin, un Humantin, un Rouget, un Malarmat, un Balisse Scolopax, un Rana Piscatrix. Plus, une petite Raye, ajustée en some de Basilio.

6. Quarante - quatre petits Poissons, les uns desséchés, les autres dans l'esprit-de-vin, tels que Patssons dorés de la Chine, Rémores, Scorpions-marins, Poissons-volans, plusieurs variétés de Balistes, &c. Plus, un Basilic sactice.

7. Une Défense de Narwal, de près de sept pieds de longueur.

8. Un Membre de Baleine, de six pieds de

longueur.

9 Une très-belle Défense de Poisson-scie, de quatre pieds quatre pouces de longueur, & une Vertébre de Baleine.

10. Une Gueule de Lamie ou grand Chien de mer; une Tête de Dauphin, & deux Défenses, l'une de Scie, l'autre d'Espadon.

11. Les Machoires de six Poissons: sçavoir, celles de la Zygéne ou Marteau, celles du Requin, du Loup - morin, du Dauphin, de la Bécune, de l'Espadon avec sa Désense, & une Désense du Poisson Scie.

12. Sept parties osseuses de dissérens Poissons; sçavoir, une prétendue Main de Syrens, qui n'est autre chose qu'une nageoire de Baleine; un os de la tête de la Baleine, nommé l'Os
de l'ouie; le Membre d'une l'ache-marine: il
est de nature osseuse, & long de dix-neus pouces. Bartholin en fait grand cas pour certaines
maladies, étant pris en poudre*; la Queue de
quelque long Poisson plat, qui paroît être du tur. II.
genre des Murênes, ayant trois pieds & demi
de longueur; une Vertébre de Baleine, une
Tête de Dauphin, & une Machoire de Requin.

13. Trente autres parties détachées de différens poissons: sçavoir, des Machoires de Raye, de jeunes Requins, de Dauphins, &c. des Dents de Cachalot, les Vertébres d'un autre poisson, des Ovaires de Rayes, des Fanons de Baleine, un lambeau de la peau de la grande Aiguille de mer, & divers Os de poissons, entr'autres un peu commun, que l'on croyoit autrefois provenir de la Rémore*.

14. Le Palais d'une espèce de Raye de la P. 270. Chine, composé d'osselets de diverses formes, les uns épineux, les autres granuleux, & contourné de maniere à représenter deux espèces de Buccins: ce morceau est rare & curieux.



Barthol.
Hift. ana.Centur. II.

*Mul.Wom



SIXIEME PARTIE.

AMPHIBIES.

t. Un grand Serpent d'Amérique, à écailles larges, variées de blanc, de brun, & de noir il est, ainsi que tous les suivans, dans l'esprit-

* Séba, tom. de-vin *.

2. pl. 75. п°.

- 2. Deux Serpenes-javelots des Indes, à corps grêle d'environ trois pieds de longueur: on les nomme dans le pays Cobra verde, à cause de leur belle couleur verte plus soncée sur le dos que sous le ventre: ces deux nuances sont séparées dans l'un par deux raies longitudinales blanches qui régnent depuis la tête jusqu'à environ six pouces de l'extrémité de la queue: l'autre à quelques raies semblables sous le ventre.
- 3. Deux Serpens, dont un des Indes, verd taché de noir, à deux raies blanches sous le ventre, & un de Surinam, cerclé de bandes noires & grises d'inégale grandeur.
 - 4. Deux autres Serpens, dont un cerclé de

larges bandes noires & blanches, nommé Serpent d'Esculape *; & un de l'espèce du premier *séba, tors de l'article précédent.

5. Cinq Serpens, dont un femelle du Cap-Verd, un d'Amérique, un de Madagascar, un du Japon, & un du pays.

6. Six autres: sçavoir, deux des Indes, deux d'Amérique, dont un bleuâtre, orné sur le dos d'une suite de taches noires disposées par ondes, &c de deux suites latérales de taches plus petites, l'autre est cerclé de bandes noires &c grises; un orné de bandes longitudinales de diverses couleurs, & un Serpent aveugle de notre pays.

7. Deux Amphisbenes ou Doubles-Marcheurs, dont un de Ceylan, couvert de petites écailles rousses, & à queue presque d'égale grosseur avec la tête, & l'autre d'Amérique, orné sur le dos d'une large bande onduleuse noire, marbré sur les côtés de noir & de bleuâtre. Son corps est presque d'une égale grosseur jusqu'à un pouce de distance de la queue qui finit en pointe obtuse.

8. Quatre Serpens d'Amérique, dont un Cazcilia dépourvu d'écailles, & à petits anneaux marquetés de brun & de blanc *; un ceint de * séba, pla bandes alternatives, dont les unes sont entièretement noires, tandis que les autres sont bleuâtres sur le dos, jaunâtres sous le ventre: il est rare & remarquable en ce que sa queue est apr platie; & deux à queue pointue, ceints d'anneaux blancs & rougeâtres. Plus, une queue de Serpent-sonnette, & deux petits Orverts de notre pays.

9. Deux Viperes en pendant, l'une mâle,

¹ Aldrov. de l'autre femelle ¹. ferp. lib. 1. p.
115 & 116.

10. Un Serpe

10. Un Serpent à deux têtes, très-rare. Ce monstre différe de ceux qui sont représentés

² Ibid. p. 60. dans Aldrovande ², Jonfton ³ & Valentin ⁴,

⁵ De ferpeatib. tab. 1.

⁶ Mus. mufeor. tab. 33.

leur origine, & naissent ensemble du même
feor. tab. 33.

trong (ans. former une bisurcation, comme

tronc, sans former une bisurcation, comme celles dont parlent ces Auteurs. Il peut être comparé à celui dont on trouve la figure dans l'Histoire Naturelle des Oiseaux de Georges

4e. Partie, Edwards 5.

pl. 207.

nent conservé dans l'esprit-de-vin : ses asses, couvertes ainsi que le corps, de petites écailles marbrées de taches brunes, noires & blanches, sont dans la position où il les met pour voler il a sous le cou une poche cartilagineuse demédiocre grandeur. On le nomme aussi Dragon

6 Séba, tom. aîlé 6.

^{2.} pl. 86. no.

1 2. Un Lézard volant d'une autre espèce,

Valent. Hist. desséché. Celui-ci est d'Amérique, & ales aîles
simpl. reform.
lib. 3. cap. 38. moins grandes que le précédent, mais sa poche
est plus longue: ses aîles sont de couleur grise,

dépourvues

dépourvues d'écailles, & membraneuses comme les nageoires des poissons . Plus, deux Scincs d'Afrique, auffi desséchés.

I Séba, tom. 1 pl. 102. n.

13. Un Crocodile de Siam, d'environ cinq Planches enlu-minées de M. pieds de longueur, bourré: il est de l'espèce de d'Aubenton, celui que nous citons 2.

pl. 46.

14. Un autre de même espèce, un peu moins l'Acad. des Sc. grand.

² Mém. de tom. 3. part. 2. pl. 64.

- 15. Un jeune Crocodile de Ceylan, ; & un Caméléon de la côte Coromandel : tous 1. pl. 104. nº. deux dans l'esprit-de-vin, ainsi que les suivans.
- 16. Un jeune Crocodile d'Amérique, & un Lézard des Indes, à dos épineux, nommé dans Séba Galéotes 4. Plus, un œuf de Crocodile, & un Scinc defféché.

93. nº.

17. Une Salamandre aquatique, différente de celle de Séba 5, en ce que sa queue est moins longue, & que les espéces d'aîlerons qu'on y 2. pl. 103. nº. remarque, se prolongent des deux côtés du ventre & des cuisses; un jeune Crocodile, de l'espèce de celui de l'article quinzieme, & deux Scincs.

18. Deux Lézards d'une grande beauté, l'un de S. Domingue 6, & l'autre d'Amboine 7, pa- 6 Ibid, tom. 1. pl. 100. f. 3. reils à ceux que nous citons. Ibid. pl,

19. Vingt-deux petits bocaux, contenant les 94. f. 3. Reptiles suivans: sçavoir, une Salamandre terrestre; une Salamandre à queue courte; une dépouille de Salamandre, un Lézard Galéotes,

Tome I.

Hh

* séta, tom. 1. deux petits Caméléons *; un Lézard à queue pl.82. n°.45. écailleuse hérissée de pointes *: deux à queue platte; deux à queue semblable, avec une crête dentelée le long du dos; & dix petits Lézards d'Amérique & de notre pays, de couleurs &

marbrures fort variées. Plus, une Grenouille * Ibid. tom. 2. de buisson. d'Afrique *.

* Ibid. tom. 2. de buillon, d'Afrique * pl. 37. n°. 3.

Trois grands Lézards bourrés: sçavoir, un Iguana d'Amérique, de l'espèce nommée Sé
* zoid. tom. nembi *; le Lézard Téjuguacu, dont le corps

z. pl. 97. f. 3.

* 1b. tom. 2. est parsenné de taches en forme d'yeux *; & une

pl. 105. n°. 1. autre variété de Tejuguacu, nommée Tecui-

* 1b. tom. 1. xim *. Plus, une belle & très-groffe Grenotille * 10. 10 de Virginie, remarquable par une large bande

*Ibid.pl.73. longitudinale sur le milieu du dos *.

21. Une Tortue de mer, connue en Amérique sous le nom de Carret, ouverte & dessechée, adhérente à son écaille, dont les pièces

*Ibid.pl.20. sont en recouvrement les unes sur les autres *:
elle a vingt-deux pouces de long de l'extrémité
de la tête à celle de la queue. Plus, une Carapace de Tortue de terre d'un brun obscur, &

* Mêm. de de seize pouces de longueur *.

l'Ac. tom. 3.
Part. 2. pl. 3.

de l'espèce du Carret, l'autre nommée Caouanne: elles ont environ un pied de longueur. Plus, le squelette de la tête d'une grosse Tortue; & un bocal contenant quatre petites Tortues de mer; des Indes, dans l'esprit-de-vin: celles-ti

sont en dessus d'un brun très - obscur, à l'exception du cou & des bords qui sont ceints d'une petite bande jaune *.

* Séba , tom.

23. Cinq Carapaces de Tortue: sçavoir, une 1. pl. 79. n°.5. de Tortue de terre du Brésil, sormée de larges écailles rhomboidales dont le centre est pointillé *; une de même espèce, mais moins gran- *Ibid. pl. 80. de; une autre variété, dont le contour est orné n°. 2. de triangles alternatifs noirs & blancs *; & deux * Grew. mus. de Tortue de mer, l'une de Carret, l'autre de reg. soc. tab. 30. Caouanne.

24. Six autres Carapaces de Tortue de terre: sçavoir, une à écailles héxagones brunes relevées en bosse, du centre de chacune desquelles partent neuf à dix bandes jaunes en forme de rayons *; une à-peu-près semblable, mais à *séba, tom. écailles moins convexes; une à écailles brunes 1.pl.30.n°.3. pointillées de traits jaunes; & trois de l'espèce des premieres de l'article précédent, dont une avec une Tortue artificielle.

25. Quatre petites Tortues, dont trois des Indes, de l'espéce des dernieres de l'article vingt-deux; une Tortue de terre de nos climats, à écailles brunes pointillées de jaune. Plus, quatre petites Carapaces de desseins variés & fort jolis*.

* Ibid. n°. 4.





SEPTIEME PARTIE.

INSECTES.

* Séba, tom. I. Un grand Scorpion des Indes *; & un * Ib. tom. 1. grand Millepieds oriental * dans l'esprit-de-vin.

2. Quatre variétés de Millepieds dans l'espritde-vin, & un Scorpion desséché, moins grand que le précédent. Plus, une Scolopendre de

* 1b. tom. 1. mer sur une branche de Sargazzo *.

pl. 81. 11. 7.

3. Deux très-grosses Araignées dans l'esprit-

de-vin, dont une de Ceylan, ayant sur le dos

*Ib. pl. 69. comme un bouclier *: l'autre est une Tarentule
n°. 1. d'Italie. Plus, six petites boëtes vitrées, contenant autant de variétés d'Araignées, dont une

*Ib. tom. 2. très-grosse d'Amérique *; & un nid d'Araignée
pl. 41. lett. C. très-singulier en ce qu'il est pratiqué dans un
morceau de terre, & que son couvercle assez
épais, ferme par une espéce de ressort : il a été
trouvé dans les avenues d'Araniuez.

4. Dix petits Bocaux contenant divers insestes dans l'esprit-de-vin: sçavoir, deux de Vers palmistes, cinq de Chenilles, un de Cloportes, un de Chenilles à tiges, un de Chrysalides, & une Courtilliere ou Taupe-grillon.

5. Dix-huit petites Boëtes vitrées : sçavoir, trois de Millepieds, une de Cloportes, trois de Punaises terrestres & aquatiques, cinq de Teignes aquatiques, avec leurs étuis formés, les uns de grains de sable, les autres de petits brins de bois, de fragmens de Coquilles, de planorbes, &c. deux de Fourmis, les unes aîlees de Cayenne, les autres sans aîles; une de rouleaux de feuilles de Rosier, formés en terre par une Mouche à scie; une de petites coques faites par des Vers mangeurs de Chenille; une Blatte. un Kakerlac, & une Chrysalide. Plus, deux Cocons de Chenilles des Indes, dont un tiffu de fils couleur d'or, & l'autre composé d'un grand nombre de cellules.

6. Vingt autres Boëtes semblables, contenant autant de variétés de Mouches, les unes à deux aîles, les autres à quatre aîles, telles qu'Abeilles, Guêpes, Frêlons, Ichneumons, Cousins, Ephémeres, &c. Plus, un Guêpier de Cayenne, & deux Gâteaux de Frêlons.

7. Quinze autres Boëtes : sçavoir, douze de Demoiselles, très-variées, dont trois d'Espagne, & les autres de France; & trois de Cigales de différentes groffeurs.

enluminées de

8. Deux Mantes peu communes, l'une est la M. d'Auben-Fraize de S. Domingue : l'autre est nommée f. 2. Roësel. Lole Spectre 2. cust. tab. 7.

9. Deux autres Mantes des Indes, dont une 19. f. 9. Hh iii

très-singuliere, en ce qu'elle a six aîles, dont les extérieures sont de même nature que les interieures, & ne peuvent servir de fourreaux à celles-ci, comme dans les autres Sauterelles

* Séba, tom. <u>aîlées</u> *. 4. pl. 73. n°.

- 10. Une Feuille ambulante d'une espèce *Rossel. Lo-rare *, & trois Sauterelles aîlées des Indes, cust. tab. 17. dont deux variétés.
 - 11. Vingt deux petites Boëtes vitrées : sçavoir, neuf de Sauterelles, formant aurant de variétés, deux de Courtillieres, une de Tipules, une de Scorpions aquatiques; une de Punaises aîlées, & huit de Galles de chêne, d'orme, de hêtre, de genêt, d'églantier, &c.
 - 12. Trois beaux Scarabées: sçavoir, le Taureau volant, le Rhinoceros de Cayenne, & un Cerf-volant.
- 1 3. Huit Scarabées étrangers, peu communs: * Pl. enlum. scavoir, un grand Arlequin de Cayenne *, un de M. d'Au- Bupreste doré, deux autres Buprestes en pendant, deux variétés de Capricornes, un Rhinoceros. & un Cerf-volant femelle.
 - 14. Huit autres Scarabées: scavoir, un Arlequin de Cayenne, de moyenne grandeur; quatre Buprestes des Indes, dont un entiérement doré, un qui est, de plus, remarquable par deux taches couleur de paille, presque rondes sur le milieu de chaque élitre; & deux à élitres

rouges & corselet doré; deux variétés de Capricornes, & deux de Rhinoceros.

15. Quatorze perites Boëtes vitrées, contenant quatre variétés de Scarabées porcs ou à trompe, entr'autres le Scarabée palmiste de Mademoiselle Mérian *; trois variétés de Capricornes; deux variétés de Buprestes, des Hanne-48.

tons, des Ditiques, & autres Scarabées de displ.95. n°. 3. férentes espéces.

- 16. Dix-huit autres Boëtes contenant autant de variétés de Scarabées, tels que Buprestes, Scarabées pillulaires ou Escarbots, Chrysomeles, Staphilins, Grillons, Proscarabées, Taupins, Dermestes, &c.
- 17. Dix-huit autres Boëtes de Scarabées, dont une de Scarabées voraces des Isses, une de petits Scarabées gris à trompe; plusieurs variétés de Cantharides, des Escarbots, des Hannetons, des Staphilins, &c.
- 18. Vingt-autres Boëtes, dont une de Pucerons, & les autres de petits Scarabées, entr'autres quatre variétés de Coccinelles, des Charensons du bled, de petits Scarabées du seigle fauvage, des Cantharides, &c.
- 19. Une belle Phalene de la Chine, dont les aîles ont huit pouces d'envergure : sur le milieu de chacune est une espéce de vitrage triangulaire, bordé de noir sur un fond

Hh iv

rouge, qui la peut faire nommer la Vierée de La Chine.

- 20. Le beau Papillon de la riviere des Amazones: ses aîles sont d'un bleu lustré des plus viss.
- 21. Deux grands Papillons d'Amérique: les aîles de l'un font bleu d'azur, avec une large bordure brune, & deux rangs de taches blanches: celles de l'autre n'ont qu'une simple écharpe bleue sur un fond rembruni: les aîles de ces deux Papillons sont oculées en dessous.
- 22. Six Boëtes vitrées contenant autant de variétés de Papillons: sçavoir, le grand Paon de nuit, le Sphinx du Troesne, le Tabacd'Espagne, la Belle-dame, la grande Tortue & le Vulcain.
- 23. Douze Boëtes de Papillons: sçavoir, cinq variétés tant des Indes que d'Amérique, & sept de France, dont le Papillon à queue du fenouil, le petit Paon du jour, le Morio, &c.
- 24. Quinze autres Boëtes: sçavoir, trois de Papillons étrangers, dont une Phalêne couleur de rose, à bandes blanches pointillées de noir, de S. Domingue; sept de Papillons diurnes, & cinq de Phalênes de France. Les noms des Papillons sont sur chaque boëte.
- 25. Dix-huit Boëtes de Papillons: sçavoir, six de Papillons étrangers, dont le Verd doré,

le Nacré, le Paon du jour de la Martinique, & deux Papillons porte-queue des Indes, & douze de Papillons & Phalênes de France, dont le Souci, le Silene, la petite Tortue, l'Ecaille maştre, le Ptérophore, &c.

26. Seize Boëtes de Papillons diurnes de France & d'Espagne, formant autant de variétés, dont le Porte-queue à deux bandes blanches, le petit Nacré, le Gamma ou Robert le Djable, le Deuil, le Demi-deuil, le Gazé, l'Aurore mâle, &c.

27. Seize autres Boëtes de Papillons diurnes de France, dont l'Aurore femelle, le Sauire, le Bronzé, l'Argus bleu, l'Argus brun, l'Argus vert ou l'Argus aveugle, le demi - Argus, &c.

28. Dix-huit Boëtes de Phalenes de France: sçavoir, la Minime à bandes, la Likenée rouge, la Phalene-chouette, la Feuille morte, le Volant doré, le Lamda, le Zig-zag, &c.

29- Vingt autres de Phalênes plus petites, telles que la *Phalêne-Carmin du Seneçon*, la *Chappe verte*, &c. tous ces Insectes sont bien conservés.





HUITIEME PARTIE.

OISEAUX.

* Edwards, I. N Lorri perruche des Indes orientales *, Hist. nat. des très-bien conservé, & monté sur un peut pied de bois.


- *1b. pl. 173. 2. Un Lorri écarlatte à longue queue *, monté pareillement.
 - 3. Une rare & belle Grive des Indes, à tête noire ornée de deux bandes jaunes, à gorge jaune & collier bleu turquin : ses aîles sont maurdoré, bordées de noir & de blanc; le ventre & la poitrine rayés de jaune & de bleu obscur, & la queue de même couleur que le collier.
- * 1b. pl. 149. 4. Un Paille-en-cul* de l'Isle de France, & un Damier ou Pierrot tacheté du Cap de Bonne-* 1b. pl. 20. Espérance *.
 - 5. Un Fou de l'Ascension, & un Damier.
 - 6. Un Moineau de Bengale, & un Martin-pécheur du Pérou.
 - 7. Un Tangora du Pérou, à tête & ventre

jaune, & la petite Perruche du Pérou, à tête bleue & gorge rouge.

- 8. Deux Colibris & deux Gerdinaux, l'un mâle, l'autre femelle.
- 9. Neuf Becs d'oiseaux étrangers : sçavoir, deux peu communs du Colao, espéce de Corbeau cornu d'Amérique, nommé aussi Rhinoceros, ou Oiseau trompette, & des deux variétés gravées d. ns Wilingbi *; un de Casouar; un d'une espèce de Grue du Brésil, nommée Jabitu *; un de Toucan, un de Pelican, un de Phanicoptere ou Becharu, un d'Espatule, & un 47. de Lancette; un squelette de Canard, trois variétés de Nids d'oiseaux, dont un Nid penfile des Indes, fait en forme de chausse d'Hypocrate, & ayant près de trois pieds de longueur; un de Colibri, deux d'Alcyons, l'un dans son état naturel, l'autre nettoyé de ses plumes, & tel que les Chinois l'emploient dans leurs ragouts les plus exquis. Plus quatre Œufs, dont deux verds & un bleu.
- 10. La peau & le bec d'un Toucan, & plufieurs gorges de petits Oiseaux d'un joli plumage. Ces dernieres sont encadrées, & sous verre.
 - 11. Deux Œuss d'Autruche en pendant.







NEUVIEME PARTIE.

QUADRUPEDES.

- 1. DEUX premieres dents molaires d'Eléphant, l'une de treize pouces de longueur sur six de hauteur, & trois & demi de largeur; l'autre un peu moins grande.
- 2. Deux autres dents molaires d'Eléphane, dont une premiere à peu près de la grandeur des précédentes, tenant encore à une portion de la machoire, & usée dans sa partie supérieure par le frottement de la mastication; & une seconde de sept pouces de longueur sur autant de hauteur, & près de trois pouces de largeur, sciée en deux, & polie-pour montrer l'organisation des plaques verticales & transversales. Plus un tronçon de désense de cinq pouces & demi de longueur sur trois de diametre.
- 3. Une Corne de Rhinoceros, de deux pieds trois pouces de hauteur sur sept de largeur à sa base: elle est un peu comprimée, fort recour-

bée en arriere, & de couleur brune obscure dans toute sa longueur.

- 4. Une autre de deux pieds huit pouces & demi de hauteur sur près de huit pouces de largeur à sa base, de sorme à peu près semblable à la précédente, mais dissérente en ce qu'elle a un sillon longitudinal sur sa partie possérieure, assez prosond vers le bas, diminuant insensiblement & disparoissant tout-à-sait vers la moitié de sa hauteur: elle est couverte vers le bas de sibres saillantes, courtes & très-dures, semblables aux soies d'une brosse.
- 5. Une Corne de Rhinoceros de deux pieds cinq pouces de haut sur quatre pouces & demi de diametre à sa base qui est presque ronde. Cette Corne dissére des précédentes, en ce qu'elle est plus essiée, presque droite dans les deux tiers de sa hauteur, & se recourbant enfuite en arrière. Elle est aussi couverte de sibres & un peu gercée vers le bas, mais lisse dans le reste.
- 6. Une autre rare, en ce qu'elle est double. L'antérieure est haute de deux pieds deux pouces, & latéralement comprimée à mesure qu'elle s'éleve. La seconde n'a que dix pouces de hauteur: sa forme est conique, aussi comprimée par les côtés, ce qui lui donne la figure d'un coin. Ces deux Cornes, presque contiguës par la base, adhérent ensemble à une portion

QUADRUPEDES. 494

de la peau. La grande Corne a six pouces de diametre à sa base qui est presque ronde. La base ovale de la petite a fix pouces dans fon plus grand diametre, sur quatre dans son petit: & la base commune, formée par le contour de la peau, est de treize pouces & demi de long sur sept de large. Toutes deux sont de couleur

Transad. brune 1. phil. nº. 470. pl. 111. f. 6

7. Quatre Cornes de Rhinoceros: scavoir, une de près de deux pieds de longueur, quoique la base en ait été coupée ; une Corne naissante de six pouces & demi de haut, à base sort concave & polie; & deux autres petites Cornes naissantes que nous avons reçues adhérentes à la même peau, mais qu'un accident a détachées. L'une porte cinq pouces de haut, & l'autre deux seulement. Plus un tronçon de queue de Rhinoceros.

8. Une tête d'Hippoposame, garnie de ses Grew. mus. dents; elle porte deux pieds de longueur2. regal, foc. tab.

9. Une autre un peu moins grande.

10. Une grande tête de Vache-marine, avec ses défenses.

11. Une autre moins grande.

12. Une tête de Lion 3, & une d'une espèce ' Hift. de l'Acaid. tom: 3. de Sanglier des Moluques, nommé Babypars. t. pl. 2. lett. A-F. Roëfa 4 ou Baby-Rousse 5.

4 Séba, tom. z. pl. 50. f. 3.

reg. foc. tab.i.

13. Idem. 1 Grew. muf.

14. Une tête de Tigre ; deux de Renard de

Sénégal, & douze Défenses par pendans, dont deux de la Vache-marine de dix-huit pouces de long, six d'Hippopotame de dissérentes grosseur & longueur, deux de Phocas ou Loup-marin, & deux de Sanglier. Plus un morceau de peau de Sanglier avec son poil.

15. Un bois de Cerf à feize andouillers sur chaque perche, dont une à deux pieds neuf pouces de longueur, & l'autre un peu plus.

- 16. Un Refait de Cerf à huit andouillers, quatre sur chaque perche, revêtu de son écorce tuberculeuse, crevassée, & de la dureté du cuir. Il a dix-neus pouces de hauteur, & près de dix pouces de circonsérence au-dessus des meules *; *Busson.Elist. & la moitié d'un bois de cerf monstrueux, pré-Cab. du Roi. cisément semblable, tant pour la forme que pour tom. 6. Ph. 24 les dimensions, à celui dont il est parlé dans la Description du Cabinet du Roi, sous le N°. 588 *.
- 17. Un très-beau bois d'Elan à dix sept an-21, s. 2. douillers, huit d'un côté, & neuf de l'autre, portant plus de deux pieds de hauteur, sur deux pieds dix pouces d'ouverture.
- 18. Un autre à peu près de même grandeur, mais à vingt andouillers, dix de chaque côté.
- 19. Un bois de Rhenne à vingt-huit andouillers, quatorze de chaque côté; sa hauteur passe trois pieds, & chaque perche se divise en trois branches palmées, d'où naissent plus ou moins

d'andouillers; & un bois de Daim de vingtdeux pouces de longueur.

20. Cinq bois de jeunes Cerfs, dont un tenant à la tête. & les autres à des portions de l'os du front: l'un de ceux-ci n'a point encore d'andouillers. Plus la moitié d'un petit bois de Cerf, bizarre en ce qu'il fort trois andouillers presque immédiatement au-dessus de la meule, & que la perche fait un coude en cet endroit; la partie palmée d'un Bois d'Elan, tailée en cœur, un pied d'Elan avec son ongle; & une moitié de bois d'Elan, sur les deux côtés de laquelle on a gravé une chasse.

21. Trois paires de Cornes: sçavoir celles d'un Buffle du Cap de Bonne-Espérance, te-Buff. Hift. nant à l'os frontal *; celles d'un Bouc, & celles gén. & part. d'un Bouquetin, adhérentes à la tête de ces

Roi, tom 11. animaux. pl. 41. f. 4 &

22. Trois autres paires de Cornes : sçavoir, celles d'une espèce de Bœuf sauvage, nommé Bison: les autres sont de Chamois. Elles sont toutes montées sur des têtes postiches, sculptées en bois.

23. Deux Cornes rares, l'une d'un Bœuf sauvage de Buenos-Ayres: cette Corne, qui est d'une grosseur remarquable, a deux pieds neuf pouces de longueur sur six pouces de diametre à sa base. Celles de cette espéce sont sort recherchées au Pérou, où l'on s'en sert en forme

forme d'outres pour porter le vin dans les voyages. L'autre d'un animal des Indes qui nous est inconnu, a deux pieds dix pouces de longueur sur quatre pouces de diametre à sa base. Elle est poire, presque droite & relevée jusqu'aux deux tiers de sa hauteur de deux plis en spirale, dons un très-faillant. Le reste, jusqu'à sa pointe, est lisse & un peu recourbé.

24. Deux paires de Cornes: scavoir, une paire de l'espèce de la derniere d cédent, & une qui en différe en ce corpes en sont moins grandes, plus droites, & leur spirale du bas moins saillante. Plus une Corne de Bouquesin, & une de trois pieds quatre pouces de long, courbée en arriere, & comprimée latéralement comme celles du Bouquetin, mais différente en ce qu'elle est comme garnie d'anneaux un peu onduleux jusqu'à huit pouces de distance de sa pointe.

25. Quatre Cornes de Gazelles des Indes, dont deux un peu courbes de deux pieds dix pouces de longueur, & deux droites un peu moins grandes: les unes & les autres sont garnies-d'anneaux depuis la bale julqu'à la moitié de Leur longueur, ou environ.

26. Seize autres Cornes: sçavoir, deux de la Gazelle des Indes, l'une courbe, l'autre droite; deux de la Gazelle d'Afrique, annuleuses presque jusqu'au sommet, & courbées en arc vers je

Tome I.

haut ; quatre de la Gazelle du Bézoard, dont une paire adhére à une portion de l'os frontal; deux d'une Gazelle d'Arabie, adhérentes à la tête entiere de l'animal; deux petites de Chamois; deux de Bison, & deux d'un animal des Indes : ces dernieres sont contournées en spirale, & adhérent, ainsi que les quarre précédentes, à des portions de l'os frontal.

27. Un Pangolin ou Diable de Java, detrois

* Buff. tom. pieds de ingueur *.

28. Un Tatou ou Armadille de Cayenne, de to. pl. 34deux pieds trois pouces de long, & de l'espèce Seba, tom. 1. mi. 54. f t.

*Buff. tom. nommée Cachicame ou Tatou à neuf bandes *; & deux peaux , l'une d'Hermine , l'autre d'Easto. pl. 37. Sésa, tom. 1. pl. 29. f. 1. reuil des Indes.

29. Un Cachicame femelle, moins grand que le précédent, & parfaitement conservé dans l'esprit-de-vine Plus, un Fœtus de Cachicame dans la même liqueur.

30. Un Philandre d'Amérique, ou Marmose femelle, avec douze de ses petits, adhérens à

* Buff. tom. ses mammelles *: tous sont très-bien conserves dans l'esprit-de-vin. 10. pl. 53.

Séba, tom. 1. 31. Une Rougette ou Chien - volant à con pl. 31. f. 2. Merian miec. furin. pl. 66. rouge de l'Isle de Sainte-Hélene, dans l'esprit-

* Buff. tom. de-vin *. 10. pl. 17.

32. Le Squelette & la peau séparée d'un Hirisson, garnie de ses piquans; une jambe du Chevrotain des Indes : elle est de la groffeut d'une plume à écrire. Plus, quatre Squelettes, dont un de Taupe, un de Rat, un de Souris, & un de Chat monstructux nouveau né. Ce dernier, outre les quatre pattes qui y sont dans leur position naturelle, en offre encore quatre autres, deux desquelles sont placées au dessous de la premiere vertebre du cou, & deux sous le fternum.

33. Un Chat monstrueux nouveau né, dans l'esprit de vin : il est composé de deux corps joints par la poitrine, de maniere que chacun a quatre jambes & une queue, quoiqu'il n'y aft. qu'un cou & qu'une tête pour les deux. Cette tête n'a rien de monstrueux que sa position par rapport aux deux corps, le museau se trouvant placé entre l'épaule droite de l'un & l'épaule gauche de l'autre.

34. Un Cochon monstrueux nouveau né aussi dans l'esprit-de-vin : il n'a qu'un œil au milieu du front, trois dents incisives à la machoire supérieure, & il est privé de mâchoire inferieure.





DIXIEME PARTIE.

L'HOMME.

PIÉCES D'ANATOMIE.

r. Le Squelette d'une tôte humaine dans une boëte vitrée: cette tête est parsaitement conservée, & a toutes ses dents; elle a été coupée en dissérent sens, & montée avec des vis & charnieres d'argent, pour en saire la démonstration. On trouve dans la même boëte l'explication détaillée de ce qu'on doit observer dans l'intérieur de la tête par les diverses coupes qu'on y a pratiquées.

2. Les Tégumens d'une tête humaine injectés & féchés: il est aisé de remarquer les plus petites ramifications artérielles, & on y a conservé les parties externes des oreilles, les cils

& les sourcils.

3. Un Cœur humain in ecté, & une Ratte préparée.

4. Un Fœtus mâle, d'environ dix pouces de hauteur, dans l'esprit-de-vin.

- Un Fœtus mâle de Négrefle un peu moine grand.
- 6. Deux Foetus, l'un mâle de quatre pouces de hauteur, l'autre femelle à peu-près de même grandeur, tous deux dans l'esprit-de-vin; le premier est de trois mois.
- 7. Deux Squelettes de fœtus de près de trois pouces de hauteur. Plus, deux Fœtus, l'un d'un pouce & demi, l'autre un peu moins grand; & un Embrion de six lignes, n'ayant ençore aucune de ses parties bien distinctes. Ces trois derniers sont dans l'esprit-de-vin.
- 8. Une tête & un pied gauche de Momie d'Egypte.

おるないなるなるのできることのの

BÉZOARDS, CALCULS, &c.

1. Un Bézoard de Rhinoceros, de forme ovoide un peu applatie, ayant près de deux pouces & demi dans son plus grand diametre, sur environ deux pouces dans le petit. Sa surface est presque entiérement recouverte de protubérances tortueuses comme les replis du cerveau humain. Personne n'ignore la rareté de ce Bézoard.

2. Un Bézord de Porc ou Piedra del Porco, Ii jij de près de deux pouces de diametre, monté en vermeil.

- 3. Un Bézoard oriental monté en or.
- 4. Un Bézoard de Cerf du Pérou, de deux pouces de diametre, monté en or dans le pays: cette monture est enrichie de quatre grosses perles & de neuf émérandes.
- 5. Un Bézoard d'Eléphant, de forme sphéroidale un peu comprimée, pesant près de deux livres & demie.
- 6. Un Bézoard de Porc-épic fauvage, & un Bézoard oriental de Bornéo.
- 7. Quatre Bézoards orientaux, dont deux de Singe.
- Bézoard verd de la côte Coromandel, & un blanc de Guinée, coupé en deux, pour en faire voir les couches & le noyau intérieur.
- 9. Quatre Bézoards, dont un de Pore-épic, un de la Vigogue du Pérou, & deux orientaux.
- · 10. Deux gros Bézoards, l'un de Cayman des Indes, l'autre d'un animal du Paraguai, nommé Anta.
- 11. Un gros Bézoard de la côte Coromandel; & deux Pierres rares: l'une est de la vessicule du fiel de la plus grande espèce de Torque de terre de l'Isse de Bourbon: esse est de

forme sphéroidale irréguliere, épaisse de trois pouces dans son plus grand diametre, & fort légere rélativement à sa grosseur: l'autre Pierre, qui est d'un blanc-jaunâtre, & fort pesante, se trouve dans le poisson Belluga, espéce d'Esturgeon du sleuve Wolga, dont on fait la colle de poisson. M. Collinson a donné, dans les Transactions philosophiques *, un Mémoire sur cette sorte de Bézoard-

* Phil. tranfact Angi.vol. 44. n°. 483.

- voide un peu comprimée, pesant onze onces; l'autre aussi de forme ovoïde, mais dont l'applatissement se trouve en trois endraits également éloignés les uns des autres, de maniere que l'ovoïde a trois faces dont les plans sont paralleles à son grand diametre, & trois côtes arrondies.
- 13. Quatre Bézoards de moyenne grosseur : sçavoir, un de l'Abyssinie, coupé en deux, & dont le centre est occupé par une petite pelotte silamenteuse; un de la côte Coromandel; & deux orientaux, l'un desquels a la forme d'une amande, & en contient essectivement une, dont l'enveloppe desséchée est un peu entr'ouverte.
- 14. Trois Bézoards, dont un de Tenasserim, un de Cayman du Pérou, & un Bézoard blanc de Guinée, coupé en deux pour montrer ses

- 504 CALCULS ET BEZOARDS.
 couches concentriques, & le noyau qui hai sere
 de base.
- 15. Quatre autres: sçavoir, deux du Pérou, thort un de Sanglier, & un casse en deux parties, duquel le noyau paroît frie sum fruit; un Bézoard de Cochon, & un Bézoard artificiel doré, ou Pierre de Goa.
 - 16. Un Bézoard oriental, & trois du Pérou.
- 17. Quatre autres Bézoards, dont un oriental, un de la côté Coromandel, un du Pérou, & un artificiel.
- 18. Huit Bézoards tant orientaux qu'occidentaux, dont un de Sanglier des Indes, &c. Plus trois prétendues Pierres de Serpents, dont une très-groffe: on croyoit autrefois que ces pierres se trouvoient dans la tête d'une espèce de Serpent à lunettes des Indes orientales, nommé par les Portugais Cobra de Capelo; mais on est revenu de cette erreur. Un Brame nous a affurés dans le pays que cette pierre n'étoit autre chose qu'un morceau de come de Cerf, taillé & calciné ensuite comme nous le voyons: il s'en fait un grand débit à la côte Coromandel, où l'on croit cette pierre un reméde souverain contre la morsure des Couleuvres Capeles, & la piqure des Scorpions,
- 19. Douze Bézoards, dont un de Chien, & les autres des Indes ou de l'Amérique; plusieurs

rbelquels ont été usés ou cassés pour en voir l'intérieur. Plus, dix Noyaux de Bézoards orientaux, & les fragmens den Bézoard occidental.

- 10. Sept autres Bézoards, dont trois Hippolithes, on Bézoards de Chevaux.
- 11. Sept Egagropiles on Bézoards de Poils. dont deux de forme sphéroïdale, un de sorme ovoide, & un cylindrique, revêtus d'une croûte mince & luifante: deux de Mouton, revêrus d'une croûte noire, & un formé de Poils roux affez longs & fans croûte. Plus, cinq Pierres du fiel des bœufs de Coromandel, & des Pierres du Castoreum. Ces Pierres sont celles que M. Geoffroy trouva dans les poches d'un Castor, & dont il donna la description à l'Académie des Sciences, dans la seconde partie de son Mémoire sur les Bézoards *. Elles ont paffé dans notre Cabinet avec la suite entiere l'Acad. des Sc. des autres Bézoards que M. M. Geoffroy pere 106 & 207. & fils avoient rassemblés : c'est cette même suite qui étoit sans contredit une des plus complettes que l'on pût voir en ce genre, que nous présentons aujourd'hui, augmentée de plusieurs autres Bézoards, particuliérement de ceux d'Amérique qui nous ont été envoyés du Pérou.

22. Deux Pietres humaines d'une groffeur extraordinaire: elles sont du genre de celles que l'on nomme Murales, de forme ovoide appla-

tie, & pefent l'une dix onces & demie, l'attere fix onces & cinq gros.

- 23. Huit Pierres humaines, la plûpart de la vessie, & très grosses, les unes de substance plâtreuse & friable, les autres compactes, dures & fort rabotteuses. Plus, une noirâtre dont le noyau joue en dedans, comme aux Pierres d'aigle, lorsqu'on la secoue.
- 24. Douze autres Pierres de vessies humaines, remarquables les unes par leur grosseur, les autres par leur forme & la substance qui les compose: il y en a entr'autres trois assez grosses qui furent tirées du Pere Ange de Tréport après sa mort.
- 25. Douze Boëtes contenant plusieurs Calculs & Pierres humaines tant de la vessie que de la vessicule du fiel, avec une vésicule séchée, remplie de ces Pierres; un Spongia Veneris, & une suite de Graviers rendus par plusieurs personnes, à la suite de l'usage des pillules Angloises.
- 26. Vingt & une petites Boëtes qui contiennent une suite de Perles très-intéressante: sçavoir, deux Perles orientales rondes de la plus belle eau; une Boëte de Semences de Perles orientales; une de Perles occidentales du Pérou, aussi d'une belle eau; une de Perles d'Asrique plombées; trois de Perles d'Ecosse, les unes

blanc-mat, les autres grises, & les autres onices; une de Perles gris de lin, une de Perles en poire blanc de lait, une de Perles hémisphériques, deux de Perles baroques, cinq de Perles de la Pinne-marine, dont une de rondes, rouge de Corail; une de Perles en poire de même couleur, une de grises, une de grises-verdatres, & une groffe en poire, noire à zônes verdâtres; deux dont on a enlevé une partie de la couche extérieure, pour voir les intérieures; deux Loupes de Perles, dont une très-singuliere en ce qu'elle est semblable au gros mordant d'un Crabe: peut-être même en est-ce un, qui ayant été renfermé dans l'Huitre par quelque accident, aura été entiérement recouvert tant en dedans qu'en dehors, de la liqueur nacrée qui transsudoit du corps de l'animal; & une Coque de Perles.

27. Vingt & une boëtes de Perles de toutes les variétés de l'article précédent.

28. Un morceau d'Ambre-gris du poids de fix onces (*).

C 1. P. 128.

^(*) Nous rangeons ici l'Ambre-gris, non comme un Bézoard, mais à cause de son origine qui est probable-ment dûe au regne animal. Il est constant, par le rapport de plusieurs Voyageurs instruits & bons Naturalistes, tels que Kempser , Anderson , &c. que l'Am. Amorn. exe-bre-gris se trouve tout formé dans les intestins de quel-Hist. de ques Cétacées. Nous avons eu plus d'une fois occasion de l'Islande & du nous assurer nous-mêmes que les prétendus becs d'oiseaux Groënland,

GALEULS ET BEZOARDS

29. Deux autres qui pelent ensemble environ trois oncesa

· 30. Trois Veffies de Muse du Tonquin, dans une boëte de plomb.

que l'on y trouve presque toujours, & souvent même en grande quantité, ne lont que des Bets de Serke on du Polype, animaux qui servent souvent de proie à œux qui produilent l'Ambre-gris. Si cette substance a donc été mile par la pliparriles Naturaliftes & des Chymiftes su nombre des Bitumes, c'est, comme le remarque très bien M. Macquer *, » plutôt d'après les propriétés Diction. de » & à caule des principes qu'elle fournit torfqu'on la » distille, que, par une connoissance certaine de son » origine; car on ne connoît point d'Ambre-gris vérie

Chym. au mot Ambre.

tablement fossile.





ONZIEME PARTIE.

VEGETAUX

- 1. CINQUANTE morceaux de Bols d'Europe &t des deux Indes, dont quarante-quatre
 échantillons en petites tablettes polles &t étiquettées. Plus un morceau de Bois rouge du
 Japon, & deux Bâtons des Indes, curieux par
 les nodolités & subsrcules dont ils sont revêtus
 dans toute leur longueur.
- 2. Deux morceaux de Bois, curieux: dans l'un, qui se sépare en deux, se trouve une espéce de Croix de Malte qui y a été comme imprimée par la nature; l'autre est une soupe d'arbre, creuse & mammelonée en dedans; mais dont l'extérieur est comme ciselé, à cause des sibres sans nombre qui y serpentent par ondes ou en forme de tourbillons.
- 3. Cinq morceaux; sçavoir, un très-beau Bâton noueux des Indes, de cinq pieds de hauzeur, & quatre variétés de cannes, dont une à fucre, une de Bambou, &c.

4. Deux morceaux curieux : l'un est le fameux Boramerr ou Agneau de Scotte, que l'on 2 cru long-temps être un animal-plante, mais qui n'est dans le vrai que le collet d'une racine de fougere revêtu d'un duvet jaune rougeatre, & dont on a eu soin de retrancher les pentes ratines; tandis qu'avec les bouts des tiges, on a formé les prétendues pattes de cet Agneau. Cette espèce de sougere croît proche de Samara sur le Wolga : l'autre est un morceau de Bois rongé par les fourmis blanches connues aux Indes orientales sous le nom de Carias, & au Pérou fous celui de Comegen. On voit à la base de ce morceau, les trous par où se sont introduits ces insectes destructeurs. L'intérieur est évuidé presque en entier, & ne montre plus que des cloisons délicates paralleles les unes aux autres, striées suivant leur longueur, & qui ne tiennent ensemble que par des jambages latéraux & paralleles à la base, que ces insectes y ont laissés de distance en distance.

5. Différentes parties de végétaux; telles que racines, écorces, &c. entr'autres, une racine de la Chine qui imite un quadrupede; une qui représente la tête d'un oiseau à long bec; une racine de Manglier sur un granite; un agaric à longue tige; canelle blanche, canelle de la Province de Quito, avec la steur

de l'arbre qui la produit; écorce de l'arbre du giroste de Maragnon; autre d'un arbre des Isles Malouines, laquelle réunit le goût de toutes les épices; écorce du Simarouba; écorce de l'arbre Aquila de la Havanne, dont on fait de la dentelle; avec un morceau de cette dentelle; deux bougies, l'une jaune, l'autre verte, faites de la cire de l'arbre de cire de la Louisiane, cire végétale de la Chine, &cc. en tout vingt-six morceaux.

6. Deux Cocos remplis: l'un de Baume de Tolu, l'autre de Baume du Pérou; plus une phiole de véritable Baume de la Meque.

7. Une suite de Baumes, gommes, résines, &c. tels que Baume de Sainte-Marie, Baume de Tolu, Gomme Copal, Laque en bâtons, Sang-dragon, Gomme Elemi, Oliban, Benjoin, Résine du pin, un morceau du bois qui donne la gomme Caragne, dans lequel on voit beaucoup de cette résine, &c. en tout trente morceaux, dont quelques-uns renserment des insectes.

8. Un Herbier contenant deux cent soixantedix plantes tant terrestres que marines. La collection des algues, fucus, mousses marines, est sur-tout intéressante par le nombre & la variété des espéces qu'elle réunit. Plus cinq Egagropiles de mer, composées de sibres végétales, entrelacées ensemble à peu près comme dans les Bézoards de poils. Deux sont ovoidez, une sphézique, & deux très grandes, caverneuses semblables pour la forme à certains Aleyons.

9. Un très-grand Coco demer des Maldives, il est sormé comme de deux lobes evoudes qui se réunissent par le milieu, de maniere à représenter une paire de sesses se les parties naturelles de la semme. Ces Cocos se trouvent sur le rivage des Isles Maldives, où ils sont jettés par les slots, sans que l'on sçache quelle est leur origine. Ils sont très-recherchés des Indiens, qui les regardent comme un reméde universel, & qui les payent au poids de l'or.

10. Six fruits des Indes & de l'Amérique; scavoir, deux grandes Calebasses, un Paia de singe, fruit du Baobab, arbre du Sénégal; trois grands Cocos revêtus de leur écorce, dont un entier, un coupé suivant sa longueur, & un coupé transversalement pour saire voir l'épaisseur & la nature de l'enveloppe extérieure. Plus un Coco des montagnes d'Andos au Pérou, avec son couvercle, & un faisceau de branches à fruit du Palmisse.

11. Vingt - deux variétés de Cocos de moyenne grandeur, & petits, tant de terre que de mer: il y en a des Indes orientales, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Choco au Pérou, &c. & plusieurs noix d'Areque, dont une avec son enveloppe.

12. Un tiroir contenant divers fruits d'Europe & des deux Indes, tels que Cocos, Pommes de Pin, de Cedre, de Cyprès, Coloquintes, Calebasses, Courbaris, Huras, Pain de singe, Figue banane, Coton du fromager avec son enveloppe, seuilles de Coca, que les Amériquains mangent, comme les Indiens le Bétel, &c. en tout soixante morceaux.

13. Trois cent variétés de graines, siliques, amandes, noyaux, &c. d'Europe & des Indes. Plus vingt quatre échantissons de Thé, avec les dissérentes préparations de cette seuille; ce qui forme une suite complette de tous les états par où elle passe avant de nous être apportée.

14. Un bocal & un flacon qui contiennent, l'un deux fruits de Muscade entiers, l'autre une Ate ou Pomme de Canelle d'Amérique; cette derniere, qui avoit été mise petite dans la liqueur, y a pris tout son accroissement, comme il est aisé d'en juger par son diamètre, qui est du double plus grand que le goulot du flacon qui la renserme.

15. Deux bocaux contenant, l'un des Citrons de la Chine, de l'espèce nommée vulgairement le Monstre, l'autre trois racines en forme de mains.

Fin du premier volume.

Tome I.



TABLE

'ALP HAB ÉTIQUE

DES CURIOSITÉS NATURELLES

Contenues dans le premier Volume.

Α.

ABBILLES, .	Page 485
l'Abricot,	
	336
Acétabule,	58
Agaric. Voy. Alcyons, Astrones,	Epon-
ges, Madrépores & Rétépores.	-
l'Agate,	269
l'Agatine,	150
Agneau de Scythie,	510
l'Aigle (Poisson),	476
l'Aigrette,	163
l'Aiguille,	213
à coudre,	2 20
en vis de tambour,	213
de mer (Poisson)	477
l'Aile d'Ange,	188
de Chauvesouris femelle,	191
de Chauvesouris mâle,	ibid.
de Papillon (cornet)	234

TABLE ALPHABÉTIQI	UE . 315
l'Aîle de Papillon (telline),	370
les Aîlées,	179
l'Aîle large,	ibid.
Alcyons,	66
en agaric,	68
en cornes de daim,	67
en figue,	ibid.
en poire,	ibid.
en vesse de loup,	8 9
l'Aléne,	210
Algues,	511
l'Amadis,	234
l'Amande,	77 T
à cils,	345
rôtie,	357
Ambre gris,	507
l'Amiral,	235
à deux bendes,	ibid.
d'Angleterre,	234
d'Orange,	-)T
malqué,	. 233
Ammonies,	101
Amphibies,	478
Amphisbene, Voyez Double Ma	rcheur.
l'Anémone de mer,	2469
l'Ane rayé,	134
•	, 14,311
Antales,	98
l'Antenne d'écrevisse,	57
l'Apan,	390
Araignée (insecte).	484
l'Araignée, Voyez Récalle épinent	Ĉ4
femelle ?	189
femelle (murex)	188
Kl	

y10	
l'Arche de Noé,	359
leš Arches,	357
l'Argus (porcelaine),	270
l'Argus fascié (Bucein),	143
l'Argus aveugle (Papillon)	489
bleu (idem),	ibid.
brun (idem),	ibid.
verd (idem),	ibid.
l'Arlequin de Cayenne,	486
l'Arlequine,	170
Armadille. Voyez Tatou.	
l'Arrofoir,	97
l'Arrichaut,	414
l'Artimon entortillé,	180
Astroïtes,	21
Astroïte à étoiles anguleuses,	22, 23
à étoiles rondes,	ibid.
agaric,	22
globuleux,	22,23
tête de more,	22
l'Astrolépas.	86
Astrophite. Voyez Tête de Méduse.	
Ate ou Pomme de Canelle,	513
l'Aumusse,	244
l'A kore femelle,	489
mâle,	ibid.
В.	
BABY-ROBSA	
ou > (tête_de),	594
Baby-Roulle J	
Baleine (fanons de),	477
(membre),	476
(nageoire),	477

	ALPHABÉTIQU	E. 517
	Baleine (os de l'ouie),	ibid.
	(vertebre)	476
•	Baliste scolopan,	ibid.
la.	Barbe de mer,	57
	Barillets. Voyez Caurs marins.	,
	Barnacle. Voyez Conque anatiferes	,
	Basilic factice,	476.
	Bateau (cœur en)	349
	Bateau (lépas en)	82
	Baume de la Méque,	511
	de Sainte-Marie	ibid.
	de Tolu,	ibid.
	du Pérou,	ibid.
h	Bécasse. Voyez Tête de Bécasse.	
•	épineuse,	203
	Bec de Becharu,	:491
	de Canard (coquille),	377
	de Casouar,	49 İ
	de Colao ,	ibid.
	d'Espatule ,	491
	de Jabiru,	ibid.
	de Lancette,	ibid.
	de Pélican,	ibid.
	de Perroquet (coquille) 🦫	3.I I
	de Toucan,	491
	Bécharu. Voyez Phanicoptere.	
	Becune (machoire de),	476
		23, 424
	Belle-Dame,	488
	Benitier (cœur),	368
le	Benitier (peigne),	517
Jе	Bézoard, Voyez casques.	
	Bézoard d'Anta,	502
	Kk i	üj

	•	
	Bézoard de Bœuf,	sos
	de Cayman ,	502
	de Cerf du Pérou,	ibid.
	de Cheval,	505
	de Chien,	504
	d'Éléphant,	502
	de Mouton,	şoş
	de Poil, Voyez Egagropiles.	, ,
	de Porc,	SOE
	de Porc épic,	502
	de Rhinocéros,	501
	de Sanglier,	504
	de Singe,	502
	de Tortue de terre,	ibid.
	de Vigogne,	ibid.
	du poisson Belluga,	503
	factice. Voyez Pierre de Goa.	, ,
4	Bille d'ivoire,	336
•	Bison (cornes de),	496
2	Bistournée,	285
	Bivalves. Voyez Coquilles.	,
	Blatta bisantia, Voyez Ongle odorant	
	Blatte,	485
	Bœuf de Buenos-Ayres (cornes de)	496
	Bois de Cerf,	495
e	Bois de Cerf. V. Madrépores & Mille	pores
e	Bois de Cerf. Voyez Patte de Crapau	d.
	Bois de Daim,	496
٠	d'Elan,	495
	de Rhenne,	ibid
	Bois (échantillons de)	509
	`figuté,	ibid
	gangé par la Carias	

	ALPHABÉTIQUE.	519
	Bois rouge du Japon,	509
le	Bois veiné,	160
	Bonnet Chinois,	90
		6,87
	de Fou. Voyez Caur de bauj	ç, °,
	de Matelot,	92
	de Neptune (éponge),	62
	de Neptune (fongipore),	38
	de Pologne,	174
	Borametz. Voyez Agneau de Scythi	-/T
la	n • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	265
	fans dents,	ibid.
	Bouc (tête de)	496
	Boucarde. Voyez Caur de bauf.	77*
12	Bouche à droite. Voyez Contre-unique	le.
	à gauche. Voyez Unique.	
	d'argent,	112
	de lait,	145
	d'or,	112
	• • •	, 128
les		78,86
	s Boucliers (Ourfins)	421
	Bouée,	222
	Bouquetin (tête de),	496
la	Bourse,	321
	Bout de Chandelle,	234
_	Bouton de Camisole,	123
	de la Chine,	125
le	Brocard de soie,	256
	Brocatelle,	323
	Bronzé,	489
	Brulée,	195
	Brunette, ·	254
	K k i	

520 TABLE	
les Buccins,	
	13
à bouche entiere,	13
à bouche échancrée,	. 13
à longue queue,	15
à petite queue,	14
fluviatiles,	439
terrestres,	44
le Buccin crenelé,	147
de la Mer Rouge,	181
feuilleté,	144
Buffle (cornes de)	496
la Bugle Coralline,	57
la Bulle d'Eau,	206
Buprestes, .	486
dorés,	ibid.
les Burgaux,	110
le Burgau perlé,	111
Byssus de la Pinne-marine,	389
Byssus (bas & gands faits de)	• •
Dynus (Das or gaines rates de)	390
. C.	• .
le Canada	i
le CABESTAN,	144
Cabochon. Voyez Lépas.	
Cachalor (dentde)	477
Cachicame femelle,	498
mâle,	ibid.
le Cadran,	123
Cacilia. Voyez Serpent aveugle	
le Caffé au lair,	271
Calcul humain,	505,506
Calemar,	469
le Calice. Voyez Madrepores.	-Y-3

ALPHABÉTIQUE.	5242
la Calotte,	60
es Cames,	328
à bases ovales irrégulieres,	344
à bases ovales régulieres,	339
à bases rondes irrégulieres,	335
à bases rondes régulieres,	329
d'Eau douce,	433
la Came coupée,	360
coupée en bec de flute,	361
feuille,	349
luisante,	341
Pholade,	375
radiće,	362
truitée,	340
tronquée,	360
violette,	343
Caméléon,	48 i
Canard (squelette de)	491
Caneres,	474
le Cancre des moluques,	ibid.
ours,	471
. fquinade,	474
velu,	ibld.
Canelle blanche,	510
du Pérou,	ibid.
Cantharides,	487
Caouanne,	482
Carapaces de Tortue,	ibid.
le Cardinal (oiseau)	491
la Cardinale (coquille)	141
Carret,	482
la Carte géographique,	. 267
Caryophilloïdes,	37

	Casouar (bec de)		4.01
le	Casque Bézoard,		491
	en baudrier,		175
•	pavé ou truité,		174
	plume,		172
	rayé,		171
	triangulaire,		174
	tricotté,		177
14	Castagnette,		178
40	Course Versen Version		299
1_	Cauris. Voyez Kauris. Cedo Nulli,		
16			339
	Cérébrites,		27
	Cerf (bois de)		495
1.	Cerf-volant,		486
12	Chagrinée 7		
1.	ou }		346
16	Chagrin,		
14	Chaloupe. Voyez Oscabrion,	•	
•	Chamois (cornes de),	•	496
le	Chapeau de Neptune,		59
la	Chappe verte,		489
le	Char de Neptune. Voyez Madre	pore.	s.
le	Chardon,	-	414
	de mer,		68
	Charenions,		487
	Char monstrueux,		499
la	Chaussetrape,		164
	de M. Dargenville		194
l a	Chauvesouris. Voyez Fondre.		• • •
	Chenille (insecte),		484
	à tiges,		ibid.
la	Chenille bariolée,		216
	blanche,		9229

	•	
	ALPHABÉTIQUE.	5 74
la .	Chenille blanche réticulée,	217
	de mer. Voyez Oscabrion.	•
	de mer. Voyez Teupe marine.	,
	granuleuse,	227
•	noire,	226
le	Cheval de frise,	194
	marin (petit),	476
łе	Cheveu de mer,	76
	Chevrette,	471
	Chevrotain des Indes (jambe du),	498
la	Chicorée,	199
	Chien de mer,	475
	' (fa gueule),	476
	Chien volant,	498
le	Chou,	366
	de mer,	38
	Chou-fleur. Voyez Madrépores.	•
	Chrysalides,	484
	Chrysomeles,	487
le	Cierge (Cornet),	247
	Blanc,	ibid.
	Jaune,	ibid.
le	Cierge (éponge),	61
le	Cierge (tuyau de mer),	28
	Cigale,	485
le	Cigne, Voyez Cierge blanc.	
lę	Clocher Chinois,	. 226
	Gothique,	228
la	Clochette, Voyez Glands de mer.	
	Clonisse,	333
	Cloporte (insecte),	484
le	Cloporte, Voyez Oscabrion.	
lę	Cloporte (poscelaine),	276
	P **	.*

TABLE

满24	TABLE	
•	Cloud,	2 r
	Coccinelle,	48
	Cochon monstrueux,	499
	Coco des Maldives,	. 511
	des montagnes d'Andos	
(Cocons de Chenille,	485
	Cœurs,	348
	marins,	418
	nommés Arches,	357
	ou Conques de Venus,	360
	proprement dits,	349
le (Cœur allongé,	354
	de Bœuf,	.355
	de l'Homme,	353
	de Pigeon,	ibid.
	de Venus,	349
	en bateau,	349
	en foufflet,	353
	épineux,	355
	triangulaire,	353
	tuilé,	ibid.
. (Colao, ou oiseau trompette,	491
(Colibri,	ibid.
la (Colique,	273
ia (Comete digitée miliaire,	456, 458
	épineuse,	456
	Concha exotica,	351
	Concha veneris à pointes,	363
(Concha veneris à rézeau,	ibid.
	Concha veneris sans pointes, V. la	a Créole.
la (Conchiliologie, Voyez <i>La Frip</i>	iere.
le (Concho-Lepas,	87
	Concombre marin,	469

ALPHABÉTIQUE.	5.25
La Conque de Triton,	149
éxotique,	35 E
persique,	114
Conques Anariferes,	405
de Venus,	360
sphériques, Voyez Tonnes.	
La Contre-unique (limaçon),	443
la Contre-unique (porcelaine),	266
La Contre-unique (vis-buccin),	448
Se Coq de mer,	473
le Coq & la Poule,	312
Coque de perles,	507
Le Coqueluchon de Moine,	358
Coquilles,	7 T
Bivalves d'eau douce,	433
Bivalves de mer,	277
fluviatiles,	427
Multivalves de mer,	391
terrestres,	436
Univalves d'eau douce,	428
Univalves de mer,	75
Corail,	5
articulé, Voyez faux Corail.	
blanc.	8,9
blanc oculé, Voyez Madrépo	res.
noir, Voyez kératophites.	
rouge,	6, 10
rouge & blanc,	8,9
violet, Voyez Madrepores.	
la Coralline,	319
Corallines, 9, 14, 5	
à cils,	ibid.
à costes,	ivia.

	Corallines à lentes,	ibi
	à touffe couleur d'ivoire,	ibia
	Coralline bugle,	• 6
	commune,	i iini
	rampante,	ibia
	tubuleuse de Malte,	10
Ìa	Corbeille (came),	33
la	Corbeille (cœur),	35
h	Corbeille (huitre),	28
	Cordeliere,	251
le	Cordon bleu,	117
	Corne d'abondance,	z89
	Corne de Rhinocéros double,	495
•	Corne de Rhinocéros simple,	. 492
	Cornes de Bœuf de Buenos-Ayres,	496
	de Bison,	496
	de Bouc,	ibid.
	de Bouquetin,	ibid.
	de Chamois,	ibid
	de Daim,	ibid
	de Daim. Voyez Frondipor	s,
	Alcyons, Éponges, Madrépores.	
	de Gazelle,	497
	d'Elan,	495
_	de Rhenne,	ibid
le	Cornet de chasseur,	441
	de postillon,	101
	de S. Hubert,	439
	ponctué,	141
	Cornets,	232
	Cornue,	399
le	Courlis, Voyez tête de Becasse.	•
	Couranno de formano	

	ALPHABÉTIQUE.	527	
la	Couronne d'Ethiopie,	- •	
	Impériale,	210	
	Papale, Voyez Thiare.	247	
	Courtilliere,	4 🕈 4	
	Cousins,	484	
le	Coutelier, Voyez manches de coute	485	
le	Coutil, Voyez toile à matelas.		•
le	Crabe à nœuds ou gouteux,	7.0-	
	commun,	191	
	porte-croix,	189	
	faxatile,	472	
	fillonné,	472	
	velu,	473	
Ìe	Crapaud (porcelaine),	ibid.	
le	Crapaud (rocher),	² 73	
la	Créole,	170	
	Crête de Coq,	363	
•	Crocodile,	287	
	Croix naturellement empreinte dans	48E	
	morceau de bois,		
	Crustacées,	509	
		470,	
	à corps allongé , à corps arrondi ,	471	
	à corps large,	474	•
12	Cuiller de Neptune,	472	
14		212,	
la	à pot, Cuisse,	223	
-		186	
	Culotte de Suiffe,	169	
16	s Culs de lampe,	125	
r¢	Cyprès de mer,	· 57	
	marin,	49.	

.

	DAIM (bois de),	108
		496
1:	Damier (oifeau),	490
1c	Damier (coquille),	245
•	à bandes jaunes,	ibid.
	Dattes (coquilles),	386
	Dauphin (tête de)	476
ie	Dauphin (coquille)	110
	Décempede de Cornouaille,	465
	Défense d'Elephant,	492
	d'Espadon ,	476
	d'Hippopotame,	495
	de Narwal,	476
	de Phocas,	495
	du poisson scie,	476
	de Sanglier,	495
	de Vache marine,	ibid.
le	Demi-argus,	- 489
	Demi-deuil (coquille),	112
le	Demi-deuil (papillon),	489
•	Demoiselles,	485
	Dentales,	98
	Dentelle de l'arbre Aquila,	511
	Dents de Cachalot,	477
	d'Élephant,	492
	d'Hippopotame,	77-
	de Loup marin,	
	de Loup marin, de Sanglier,	èfenses.
	de Vache marine,	
	Dermestes,	. 0
16		387
16	Devidoir. Voyez la Bistournée.	. ۵
16	Deuil,	48 <i>9</i>
		1 110514

ALPHABÉTIQUÉ.	ġży ·
Diable de Java ;	498
de mer;	475
Ditiques,	487
e Dofan,	
Dorade de la Chine,	105
e Dotel. Voyez Gueule de Souris.	475
Double marcheur,	
Dragon aîlé. Vozez Lézard volant.	479
e Dragon, (coquille),	
e Drap d'argent,	168
d'or,	254
	25 E
d'or à fond bleu,	252
d'or fascié,	25 I
d'or piqueté;	253
d'or de la Chine,	252
mortuaire,	258
orangé,	253
Drap-marin, ijt, \$33,	
E.	- > F
	:
l'E CAILLE martre,	489
l'Ecotchée,	وَ وَعَدَ
Ecrevisse d'eau douce,	47 [‡]
, de mër,	ibid.
l'Écriture Atabique,	
ou \$	مند اه
l'Écriture Chinoise,	344
Ecureuil des Indes (peza d')	468
Egagropiles,	498
Bgagropiles de firer,	505
Elan (bois d'),	511
files (mind d')	495
Elan (pied d'),	496
Bléphant (dent d'),	492
Tome I. L1	

l'Enclume, Voyez la cuisse.	
l'Enfant au maillot, de mer.	222
terrestre,	448
l'Enfumée,	. 195
l'Entonnoir,	80, 86
l'Éperon,	123
Ephémeres,	485
l'Epi de bled,	15
l'Episcopale,	186
Eponges,	59
Eponge agaric,	63,64
commune,	59
des Frotteurs,	60
en colomne,	60,61
en cornes de Daim,	64
en mie de pain,	ibid.
en morille,	63,64
Ourfin,	63
l'Equerre,	186
l'Escalier. Voyez Scalata & Cad	ran.
Escarbots,	-: . 487
Escares molles,	56,57
pierreules,	30, 31
Espatule (bec d'),	491
l'Esplandian,	248
l'Ethiopienne,	150
Etoiles de mer,	452
à cinq rayons,	455
à dix rayons,	465
à dix-sept rayons,	ibid.
à douze rayons,	461
à grains de miller,	455,456
à grains de petite vérole	e, 454, 458

ALPHABETIQU	E. 331
Étoiles à quatre rayons,	454
à queue de Lézard,	464
à rayons entiers,	ibid.
à rayons fendus,	454
arborescentes,	466
à sept rayons,	462
à lix rayons;	461
à treize rayons;	463
à trente-huit rayons.	ibid.
. à trente-sept rayons,	462
cnevelues,	464
coriacées,	455,458
crucitormes,	454
digitées	458, 462
en patte d'oye,	459,461
étoilées,	454
falciformes,	454
jaune vulgaire de Luid,	460
pectinées,	455
réticulées lentigineuses,	458
rofacées,	465
vermiformes,	464
l'Éventail (éponge),	60
l'Éventail, Voyez la Sole.	
des Mennonites,	538
de Thétis, Voy. panache	de mer.
F.	•
la FAITIERE, Voyez la Tuilée.	
le Falier,	· 266
la Fausse aîle de Papillon,	244
Arlequine,	271
Gourgandine,	364
L	.l ij
. •	

.

•

•

TABLE

•		
la	Fausse oreille de Midas,	13.
	Scalat a , .	22
le	Faux Amiral, Voyez le Navet.	·
le	Faux Amiral de Guinée,	23
	Argus,	27
	Faux Corail,	43
	Blanc articulé,	45,46
	géniculé ou	46
	noueux,	ibid
	rouge articulé,	ibid.
la	Féverolle,	346
	Feuille (came),	340
	Feuille (huître),	287
	Feuille ambulante,	486
	de chou,	366
	de chou. Voyez Millepor	¥,
	morte (phalene),	489
la	Figue blanche,	216
	violette,	217
la	Filcuse,	249
	Flamboyante,	136
	Flute de Pan,	60
	Fœtus humain,	500, 501
	Fongipores,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	en bouquet,	36,37
1e	Foret,	225
	Fort Pentagone,	457
_	Fou (oiseau),	490
le	Foudre,	160
he	Four ardent. Voyez Bouche d'or.	
_	Fourmis aîlées,	485
	fans aîles,	ibid.
la	Fraise (coquille),	353
4	truite (codumes)	///

	•	
	ALPHABÉTIQUE.	533
la	Fraise de Saint-Domingue (insecte)	
	de Veau, Voyez Millepores.	, 1-,
	Frêlons,	485
	Fripiere,	124
le	Fromage verd,	239
	Frondipores,	30, 31
	en cornes de Daim,	3 1
	Fucus,	511
	Furie,	331
le	Fuseau,	155
	à dents,	ibid,
	G.	
	GALÉOTES (Lézard),	481
	Galles de chêne,	40.
	d'églantier,	•
	de genêr,	486
	de hêtre,	7
	d'orme, J	
	Gamma,	489
le	Gâtean feuilleté,	293
_	Gâteaux de Frêlons,	485
	Gâteaux (oursins),	423
	Gaufre,	145
le	Gazé,	489
	Gazelle d'Afrique (cornes de)	497
	d'Arabie (cornes de)	498
	des Indes (cornes de),	497
s	du Bézoard (cornes de)	49S
la	Géographique. Voy. Carte géographi	que.
12	Gibeciere. Voyez la Bourse.	
	Glands de mer,	401
	à côte de melon , L l ii	404
	Lin	1

.

de Souris,

184

ALPHABÉTIQU	J E.	535
la Gueule noire,		182
la Guillochée,		337
_		221,
H.		•
la HALLEBARDE,		191
Hannetons,		487
la Harpe,		213
noble,		ibid.
l'Hébraïque,		240
l'Hébraïque. Voy. Bois-veiné.		_
Hérisson (squelette de),		498
le Hérisson (coquille),		165
Hermine (peau d'),		498
l'Hermine (coquille),		249
Hippocampe,		476
Hippolites,		505
Hippoporame (tête d'),		424
l'Hirondelle,		283
de mer,		476
Holothuries,		469
Huîtres,		278
à feuilles de persit,		304
à talon,		298
de la mer rouge,		297
épineuses,		298
feuille, Voyez feuille.		•
feuilletées,		293
proprement dites,		280
Hamantin,		476
J.		
TABIRU (bec de)		491
la Jamaïque		336
	Ll ig	
-	•	•

-

•

.

.

-

116 TABLE	•
le Jambon, le Jambonneau, Voyez Pin	nne maring.
le Jatou,	198
le Jaune d'œuf,	117
applati,	įbid.
Ichneumons,	485
l'Idole,	430
. PIf,	. 227
Iguana,	482
Infectes,	484
l'Isabelle,	272
l'Ivoire. Voyez Mitre jaune.	-,-
K •	
KAKERLAC, le Kaman. Voyez Conque exotiq	485
Kauris,	. 473
Kératophites,	9, 13, 47
plume de mer,	
romarin,	· 49 50
L,	٠, ١
le LAMBDA,	489
le Lambis,	185
Lamie (gueule de),	476
la Lampe antique,	442
Lancette, (bec de)	491
Langouste.	471
Langue,	246
de Chat, Yoyez <i>chagi</i>	inée.
d'or,	372
la Lanterne,	377
d'Aristote,	416. 426

ALPHABÉTI(le Lapin,	- ,
le Lard,	268
Léopard,	16 z
Lépas ou Patelles,	2 69
	77
à appendice en demi	
chambrés,	87, 91
	89
de Magellan,	79,80
en bateau,	82
en gondole,	8 <i>6</i>
entiers, fluviatiles,	78
	428
percés au sommet,	88
Levantine (grande),	365
a Levantine (petite), Lézard,	ibid.
	481
Galeotes,	ibid.
Téjuguacu,	482
volant,	480
a Licorne (coquille),	
de mer (grande),	(. Narwal.
de mer (petite),	475
e Lievre,	270
à gouttes de fuif,	tbid.
a Likénée rouge,	489
la Limace,	40
Limaçons à bouche demi-r	
à bouche ovale, Voye	z Sabots.
à bouche ronde,	110
de mer,	109
Auviatiles,	429
mariatics,	4-7

.

/		
538	TABLE	
Limas, V	oyez Limaçons.	
la Lime,	•	316
	ice,	ibid
Lion (tête	e de),	494
Le Lion de m	ner,	471
Lithophite	es, Voyez Kérate	phites.
la Livrée,	•	445
Lorri écar	late,	490
	ruche,	ibid.
Loupe de	perles,	507
Loup mari	in (défenfes de),	
	achoire de),	476
la Luisante,	_	445
la Lune mar	ine,	466
	M .	
MACH	orres de Bécur	ne 3 476
	Dauphin,	ibid.
de	Loup marin,	ibid.
∵ de	Raye,	477
de	Requin,	476
d'I	Espadon ,	ibid
de	Zygêne,	ibid
Madrépor	e abrotanoïde,	14
		17, 20, 22
	ınc étoilé,	12, 19
	inc oculé,	11, 11
	is de Cerf,	14, 17
	anchu,	11-18
cal	ice ou talle,	19
ch	ar de Neptune,	18
	buisson,	15, 17, 19
би	choux fleurs,	. 16

Madrépore en cornes de Dai	m, 18	
épi de bled,	15	
grisâtre,	13, 15, 17	
jaunâtre ,	14, 16, 17	
rougeâtre :	13, 16	
violet,	12	
Magna Vetula,	365	
Main de mer,	469	
de Sirene,	476	
Malarmat,	ibid.	
le Mammelon blanc,	117	
jaune,	. 118	
Manches de couteau,	378	
les Manchettes de Neptune,	30, 31	
le Manchon de Neptune,	59	
Mante (squille),	47 ī	
Mante (insecte),	485	
le Manteau blanc, Voyez <i>bot</i>	urfe.	
ducal ou royal,	320	
le Mantelet,	266	
la Mappemonde, V. Caru gle	The state of the s	
le Marbre,	. 153	
Marmole & ses petits,	498	
le Maron épineux,	356	
roti,	113	
le Marteau (coquille),	286	
le Marteau (poisson), Voyez	Zigëne.	
la Martelée. Voyez Vis.	•	
Martin-pêcheut,	490	
La Massue d'Hercule,	204	
Matrices de coquillages,	69	
Méandrites,	32	
én brisbólite	33.	

TABLE

	Médaille , Méduse. Voyez <i>Tite de Méduse</i>	424
la	Mennonite. Voyez Cierge blan Mere-perle, stérile. Voyez Pintade.	282
la	Millepieds (infecte),	484
	mâle (coquille),	191
	femelle (coquille),	192
	Millepore à feuilles de chou,	26
	bois de Cerf	29
	digité,	17
	en éventail,	14, 12, 28
	en fraise de Veau,	27
le	Minarer,	142
la	Minime (Buccin.) Voyez Con	deliere.
la	Minime (corner),	242
	bleue (idem.)	ibid.
	à bandes (phalene),	489
la	Mitre,	. 140
	jaune ,	ibi d .
	Polonoise. V. Bonnes	le Nepsune.
	Moineau de Bengale,	490
la	Moire,	256
	Mollusques,	469
	Momie d'Egypte,	şot
	Monnoie de Guinée,	266
la	Moresque. Voyez la Négresse.	
le	Morille,	63,64
	Morio,	438
le	Mortier,	60
	Mouches,	485
	à deux aîles, 🧳	
٠.	à quatre aîles, à fcie,	ibid.
	- 1010 , J.	

	ALPHABÉTIQUE.	341	•
	Moules,	170	
	cylindriques. Voyez Dattes.	37 9	
	fluviatiles. Voyez Ténilles.		
	proprement dites,	38a	
	triangulaires. V. Pinnes-marin	res.	
la	Moule arborisée,	386	
	d'Alger,	384	
	de la Plata,	383	
	des Papous,	382	
	double,	38 z	
	magellanique,	3 8 0	
	Mousses marines,	\$15	
	Multivalves. Voyez Coquilles.		
	Mure,	165	
	de Dargenville,	214	
	de hayes,	136	
	Murex. Voyez Rochers.		
	à dents de chien,	164	,
	Musc,	508	
	Muscade,	206	
la	Mufique,	160	
	bâtarde. Voyez <i>Bois-veiné</i> .		
	couleur de rose,	161	
	verte,	ibid.	
	N.		
	NACELLE (la) (Lépas),	90	
la	Nacelle. Voyez Oscabrion.	•	•
	Nacré,	489	•
	Nageoires de Baleine,	477	
	Narwal (sa défense)	476	
la	Natte de jonc. Voy. Ecriture arabique.	•	
	d'Italie,	139	
le	Navet,	243	
		•	
			•

de Crocodile, 481 l'Oignon blanc, 443 Oileaux, 499 l'Oiseau. Voyez l'Hirondelle.

tromperte. Voyez Colao.

'ALPHABÉTIQUE.	543
l'Olearia,	110
l'Olive de Panama,	258
les Olives,	257
l'Omelette,	254
Ongle du pied d'Élan;	496
l'Ongle odorant,	153
l'Onix. Voyez Cierge blanc.	••
Opercules de Bouche d'or,	115
de Buccins,	153
d'Olearia,	115
l'Orbis à tête de lievre,	475
Oreilles de mer,	92
à trous,	93
fans trous,	95'
l'Oreille d'Ane,	. 187,
de Cochon 🕥	
ou déchirée,	184
de Cochon. Voy. Crête de C	og.
de Midas,	132
de Vénus,	95
1Orpheline,	33 I
Orrie de mer,	469
Orvert,	480
Oscabrion,	392
Ostreum tortuosum,	185
Ovaires de coquillages;	69
de Raie,	477
1'Oublie,	206
Ovoïdes (Ourlins). V. Œufs marin	
Oursins,	408
l'Oursin à soyes,	412
digité,	414
folaire,	425

P.

la	PAGODE,	115
	Paille-en-cul,	490
le	Pain de bougie,	101
-0.	d'épice,	423
le	Palmier marin,	466
	Pangolin. Voyez Diable de Jay	
le	Pannache de mer,	54, 55
	Paon de nuit, (le grand),	488
	Paon de jour (le petit),	ibid.
	de la Mattinique,	489
t_	Papier de la Chine,	154
10	marbré,	•
	toulé,	150 106
		488
	Papillon à queue du fenouil, de la riviere des Amazon	es. <i>ibid.</i>
1.	porte-queue,	489
12	Papyracée, Voyez la lanterne.	_ 6
	Patasol Chinois,	78
TC	Pas de Poulain,	• 418
	Pastenaque,	475
10	Pâté réticulé (gros),	457,461
	(petit),	458
	Patelles, Voyez Lépas.	
la	Patte de Crapaud,	100
	d'oye,	191
le	Pavillon d'Hollande,	448
	d'orange,	136
	du prince,	446
	Pavois angulaire,	421
_	applati,	421
la	Peau d'Ane,	275
	de chagrin,	236
	,	1.

	ALPHABÉTIQU	É, 54§	
L	Peau de serpent,		
-	de Tigre,	113	
le	s Peignes,	267	· ·
•••	å oreilles égales,	314 316	
	à oreilles inégales,	· .	
	fans oreilles,	319 327	
la	Pélerine,	316	
	tuilée,	320	
	Pélican (bec de);	-	
la	Pelotte de beurre, V. Tine de beur	49¥ rė.	
	Pelottes marines, Voy. Egagropi	les de	•
	mer.		
ļa	Pelure d'oignon;	181	
je	Perçoir	. 225	•
la	Perdrix,	209	
	rouge,	134	
	Perles d'Afrique,	506	•
	d'Écosse,	ibid.	
	de la Pinne matine,	5°7	
	du Pérou,	506	
	Occidentales,	ibid.	,
•	Orientales,	ibid.	
	Perron,	344	
Ie	Perroquet perlé,	11, 113	•
1	Perruche,	49 I.	
ļa	Perruque à l'Angloise,	24	
la 1	Perspective, Voyez l'Escalier,		
Ja	Petaloïde,	455	
1 _	velue,	456	
16	Petit Ane,	273	
	Argus,	272	
	Cheval marin	476	
	deuil,	113	
	Tome It M.	4	/

•

) 14	
le Petit Paon,	488
la Petite Tortue,	489
vérole,	276
Pétoncles, V. Peignes à oreilles i	nigales.
sans oreilles,	327
Phalenes,	487
la Phalene carmin	489
chouette,	ibid.
couleur de rose.	458
vitrée de la Chine,	ibid.
Philandre,	498
Phocas, Voyez Loup marin.	495
Phænicoptere (bec de),	491
Pholades bivalves, Voyez Da	thes.
multivalves,	395
quintivalves,	. 397
fextivalves,	396
la Pie,	112
Pieces d'Anatomie,	, 500
Voyez squélettes.	
le Pied d'Ane,	301
Pied d'Élan,	496
Piedra del Porco,	502
Pierre de Goa,	504
de Serpent,	ibid.
de Tortue,	503
du Castoreum,	SOS
du poisson Belluga,	508
humaines,	505,506
murales,	Şoş
Pietrot tacheté,	490
le Pigeonneau, Voyen la Tours	erèlle.
la Pince de Chirurgien,	373

ALPHABÉTIQUE.	
	547
Pinceau de mer,	58
Pinceau de mer, Voyez arrosoir.	
Pinceau de mer, Voyez scolopend	re.
Pinnes marines,	388
Pintade,	182
Piqure de Mouches, V. Drap d'arge	nt.
r Pirogue,	291
a Pistache,	207
le Pitar,	333
Plan-orbes,	419
le Plein-chant,	161
e Plomb,	152
a Plume de mer, Voyez Karatophir marine,	es.
e Poinçon,	469
e Point d'Hongrie,	220
e Pois de mer,	332
Poissons,	122
armés,	475
coffre,	ibid.
dorés de la Chine,	ibid.
	476
trompette, volans,	ibid.
Polypes de mer,	ibid.
	469
du corail,	10
Polypiers,	Ĭ
moux ou flexibles,	43
folides ou pierreux,	5
a Pomme d'Acajou,	186
folle de mer,	469
Porcelaines,	263
à bouche moins étroite,	264
à bouche plus écroite,	267
M m ij	•,

.

48			1	T	A	B	L	E	
Pot	rcela	ine	ì	tê	te	de	Se	rne	

la	Porcelaine à tête de Serpent	i6 T
	de M. Adanson,	135
	tigrée, Voyez peau de Tigre.	
	Porc-épic de mer,	475
le	Porc marin,	ibid.
le	Porphyre,	258
le	Potan,	166
le	Pot verd,	110
	Poucepieds,	405
le	Pou de Baleine,	404
	de mer,	275
_	Poulette,	312
le	Poumon matin,	469
	Poupart,	473
	Pourpres,	191
	à longue queue,	201
	à petite queue,	194
la	Pourpre de Panama. V. Conque persique	·.
	Pourpres épineuses,	199
	rameules triangulaires,	194
•	triangulaites,	197
	triangulaires aîlées,	198
le	Prépuce,	211
-	Priapolite. Voyez Méandrites.	
la	Princesse,	110
	Proscarabées,	487
le	Prérophore,	489
	Pucelages .	273
,	Pucerons,	487
	Punaise aîlée,	486
	aquatique	485
	, de mer. Voyez Oscabrion.	• •
	terrefire	485
•		.7

	•	
	ALPHABÉTIQUE	549
Ì2	Pyramide,	159
	Pyramidale pectinée	458
		17
	Q.	
_	QUADRUPEDES,	492
	Quenouille,	155
la	Quenotte saignante,	117
la	Queue d'Ecureuil,	56
	d'Hermine,	248
	Queue de Rhinoceros	494
	R.	
la	RACINE de Brione,	198
la	Raccrocheuse,	1.70
	Radiée (cœur),	462
b	Radiće (telline),	375
le	Radix,	216
_	à pointes noires,	104
le	Raisin de mer,	469
	Ranapiscatrix,	476
	Rape,	315
16	Restellum.	
1.	Rateau,	288
10	Rat (squélette de)	498
Ь	Ratissoire. Voyez la Rape.	490
	Rave,	1:53
•	Raye en forme de Basilic.	476
	(mâchoire de)	477
	(ovaires de) a	ibid.
	Rayon de miel	335
la	Rayonnée,	344
	M m iii	

٠

· 🔍

.

Rémore,	476
(son os prétendu),	477
Renard (tête de),	494
Requin (mâchoire de),	476
Rétépore agaric,	31
dentelle,	30,34
a Retorte. Voyez la Cornue.	
e Rezeau blanc,	329
Rhenne (bois de),	495
e Rhinoceros (coquille),	168
(infecte),	486
(oifeau),	491
(quadrupede.) Voyez Con	2 6.
la Robe Persienne. Voy. Tapis de Pe	rse.
Robert le diable,	489
Rochers,	158
aîlés à pattes,	188
aîlés sans pattes,	179
à petite queue,	168
fans queue,	159
triangulaires,	168
le Rodolphe. Voyez Conque Perfique	•
le Romarin. Voyez Kératophites.	
la Rosette d'Epinette. Voyez Cadran	.
les Rotules ,	425
Rouger,	476
Rougette,	498
les Rouleaux,	251
le Ruban (limaçon),	111
le Ruban (vis-buccin),	. 448

ALPHABÉTIQUE. 357 S. les SABOTS, 123 Salamandre aquatique, 481 ibid. terrestre. la Sandale, 90 Sanglier (défenses de), 495 des Moluques. V. Baby roësa. le Sapin de mer, 57 la Sapotille, 297 le Satyre, `485 Sauterelles, la Scalata, le Scarabée (coquille), palmiste, 487 pillulaire, ibid. porc, ibid. la Scie, 36'E Scinc, 48 I Scolopendre de mer, 104, 469, 484 Scolopendroïdes, 50, 465 le Scorpion aquatique, 486 femelle, 191 }(coquilles), mâle, ibid. le Scorpion (insecte), 484 marin, :476 orangé (coquille), 191 Seche, 469 la Selle Polonoise, 280 Semence de perles, 506 Sénembi, 482 Serpents, 478 Mm iv

	Serpent à deux têtes,	486
	aveugle,	479
	d'Elculape,	įbid
	javelot,	478
	marin,	479
	fonnette (sa queue),	480
le	Silene,	489
la	Sole,	317
	de la rare espece.	318
	marquetée,	įbid.
le	Soleil. Voyez l'Éperon.	ولشدمة
•	à treillis épineux,	456
	digité d'Aldrovande	461
	levant,	376
	plat coriacé,	370 460
le	Solen du sable,	97
	Serpent,	
la	Sorciere,	100
le	Souci,	113
•	Souris (squélette de)	489
12	Souris (coquille),	499
la	Spectre (coquille),	271
le	Spectre (infecte),	242
la	Spéculation,	485
1.	Sphinx du Troesne,	244
ą C	Spondiles,	488
		298
	Spongia Veneris,	506
•	Equélette de Canard,	491
	de Chat monstrueux	499
	de fœtus humain,	501
	de Hérisson,	498
•	de la tête d'une Tottue,	. 482
	sie Souris	444

ALPHABETIQUI	E. 555
Squélette de Rar,	
de tête humaine,	499
de Taupe,	500
Squille large,	. 499
fabloneuse,	47 £
	ibid,
Staphili as, Sucet. Voyez <i>Rémore.</i>	487
oucet. V oyez itemore.	•
T.	
le TABAC d'Espagne,	488
le Taffetas,	256
le Tamaris de mer,	57
Tangara du Pérou,	490
le Tapis de Perse,	154
Tarentule,	484
le Taret,	400
la Tarriere,	220
la Tasse. Voyez Calico.	
de Neptune,	212
Tatou ou Armadille,	498
à neuf bandes,	ibid.
Taupe (squélette de),	ibid.
Taupe-grillon,	484
la Taupe (coquille),	278
marine (fongipore),	41
marine (mollusque),	469
Taupins,	487
Taureau volant,	486
Tecuixim (Lézard),	482
Teigne aquatique,	429, 485
Tejuguacu (Lézard)	482
le Télescope.	211

Tellines,	36
béantes à une extrêmité,	379
béantes àux deux bouts,	37
fluviatiles,	43
improprement dites. Voy. Ma	a.
ches de couteau.	
radiées,	37
la Telline de la Chine,	374
feuille. Voyez Langue d'or.	•
Tenilles. Voyez Tellines.	
fluviatiles,	434
Térébratules. Voyez Anomies.	••
les Testicules,	117
Tête de Baby-rousse,	494
de Bouc,	496
de Bouquetin,	ibid
d'Hippopotame,	494
de Lion,	ibid
de Renard,	ibid
de Tigre,	494
de Vache marine,	jbia
la Tête de Becasse,	20
de Méduse,	46
de Méduse à côtes,	ibia
de Méduse à écusson,	ibic
de Méduse brune,	46
de More,	2
de Mort,	41
de Serpent,	18
Thé (échantillons de),	51
la Thiase,	14
à trous,	14
bâtarde,	14
3	•

ALPHABÉTIQU	E. 353
la Thiare fluviatile,	431
le Thorax,	273
Tigre (tête de),	494
le Tigre jaune,	246
noir,	245
rouge,	246
lz Tine de beurre,	241
Tipules,	486
le Tire-bourre,	99
la Toile à matelas. Voyez Lard.	
d'araignée. V. l'Espland	ian.
le Toit Chinois,	91, 92.
le Toit Chinois. Voyez la Pagode.	
Tonnes,	205
à bouche échancrée,	208
à bouche entiere,	206
à queue,	216
fluviatiles,	431
Tortue de mer,	482
de terre,	ibid.
la Tortue (coquille),	276
la Tortue (Papillon),	488, 489
Toucan, (bec de), Toupies, Voyez culs de lampe.	491
Toupies, Voyez culs de lampe.	,
la Tour de Babel,	156
le Tournesol à douze rayons,	462
à treize rayons,	463
à trente-sept rayons,	462
à trente-huit rayons,	463
la Tourterelle,	179 280
la Transparente, la Tricottée, la Trompa merine	
la I ricottee,	339
la Trompe marine,	148

1

•

la Trompette de mer,	63
la Trompette (poisson),	476
la Truitée,	260
Tubes vermiculaires. Voyez Tuya	ux · *
de mer.	
Tubipores,	24, 25
la Tuilée,	366
la Tulipe (Buccin).	150
la Tulipe (gland de mer),	402
la Tulipe (moule),	384
la Tulipe (rouleau),	253
le Turban (éponge),	60
le Turban (casque),	177
le Turban (gland de mer),	402
le Turban Maure,	416
Turc (Oursia),	413
Turc (Limaçon),	115
Turbans à grains de petite vérole	
à mammelons,	414
à panneaux,	411
miliaires,	410
miliaires anguleux,	412
Tuyaux chambrés,	101
choisonnés,	399
de mer multivalves,	398
de mer univalves,	95
d'orgue,	10;
fluviatiles,	418
groupés, Voyez Vermiculai	
non testacés,	104
simples ou isolés,	97
trompette	161
At well and I	

ALPHABÉTIQUE V. VACHE marine (membre de), 477 . (tête de), 494 Végétaux, 509 Velette, 469 le Verd doré, 488 Verge ailée. Voyez plume marine. marine. 469 Vermets, 101, 103 Vermiculaires. 102 Vers mangeurs de Chenille, 485 palmistes, 484 Vertebres de Baleine. 477 la Veuve. 111, 115 perlée, III le Vice Amiral. 233 de Rumphius, 234 la Vieille ridée, 364 le Villebrequin, 100 480 Vipere, 218 Vis, à tête tronquée } 212 Buccins, 447 fluviatiles. 432 liffes, 219 Arićes, 224 terrestres, 447, 450 tuberculeuses. 226 la Vis à caracteres, 219 de pressoir. 223 feuilletée. 118 martelée. 219

la Vistigrée, la Virre Chinoise (coquille), la Virrée de la Chine (phalene), l'Unique (Buccin), l'Unique (Limaçon), l'Unique (Limaçon),
la Virre Chinoise (coquille), 286 12 Virrée de la Chine (phalene), 488 12 PUnique (Buccin), 151, 466
la Virrée de la Chine (phalene), 488 l'Unique (Buccin), 151, 466
l'Unique (Buccin), 151, 466
(Thique (Limacon) -
l'Unique (porcelaine), 266
l'Unique (Vis Buccin), 447
Univalves. Voyez coquilles.
la Voile roulée. V. l'artimon entortillé.
le Volant doré, 489
Volutes, 231
coniques. Voyez cornets.
cylindriques. Voyez rouleaux.
échancrées Voyez olives.
la Voluté de Guinée. Voyes alle de Pa-
pillon.
le Vulcain, 48#
7.
4.
le Zebre. Voyez l'Ane rayé.
to Eig-Eag (coquitio)
le Zig-zag (phalene), 489
Zoophites, 45 t
Zygene, (machoire de), 476

Fin de la Table du premier Volume.

FAUTES

A corriger dans ce Volume.

P.10. 11, lig. 18, listes, list, listes.

20, I, prolongent, lif. se prolongent.

48, 28, Rétépores dentellés, lif. Rétépores-dentelle.

69, 23, de, effacez ce moe.

146, 20, premieres, lif. premiers.

172, 27, 184, lif. 284.

ebid. 27, 184, lif. 285.

292, 9, de lif. des.

349, 14, sommet, lif. sommers

312, 3, Aleyons, lif. Aleyons.

Fautes à corriger dans les Citations.

Pag. 16, Gualt. ind. test. no. 27, lif. no. 112.

48, Seba, pl. 114, n°. 3, list. Rumph. herb. Amb. tom. 6, tab. 78, litt. a, b, c.

36, Voyez l'essai de, lif. l'essai sur.

104, Ellis, pl. 34, mar. tab. 1, f. 4, effacer mar. tab. 1, f. 4.

125, Rumph. tab. 21, litt. A, lif. litt. D.

136, Lift. tab. 56, lif. Lift. tab. 656.

137, Seba, pl. 37, lis. Seba, pl. 39.

idem. ibid. tab. 830, f. ajouter 52.

152, List. tab. 47, lif. List. tab. 892.

166, Arg. pl. 10, lif. Arg. pl. 14.

171, Rumph. tab. 22, lit. B, *lif.* Rumph. tab. 23, lit. C.

188, Seba, pl. 81, lif. Seba, pl. 82

Page 211, Seba, pl: 66, nº: 13 &, ajoutet 143 222, Seba, pl. 59, lif. Seba, pl. 55. 233, Afg. pl. 11, lif. Arg. pl. 12. 240, ibid. f. 26, lif. ibid. tab 779, f. 26. 245, Scb2, pl. 46, no. 3 & 4, lif. no. 1 & 2; 275, I litt. A bid. lif. ibid. litt. A A. 285, Rumph. tab. 47, litt. R, lif. litt. K. 188, Gualt. tab. 103, ajoutez litt. C. 293, Rumph. tab. 43, lif. Rumph. tab. 48. 331, Bonan. Cl. 2, no. 60 & 62, lif. 60 & 61; 353, Gualt. tab. 38, lif. Gualt. tab. 83. 376, List. tab. 422, f. 226, lif. f. 166. 6, Seba, pl. 87, no. 11, lif. pl. 13. 433, List. tab. 150, ajouter fig. 5. 445, Arg. pl. 24. 28, fig. 4 & 8, effacez 141 481, ibid. pl. 93, no. ajoutez 1.

Fin de l'Errata,



EXPLICATION DES FIGURES

DU TOME PREMIER.

PLANCHE I.

MILLEPORE à branches seuillues, formé sur une Bouteille pêchée à la Barbade. Il en est parlé à l'art. 73 des Polypiers, page 28.

PLANCHE II.

La lettre A représente un Lépas du premier genre, auquel nous avons donné le nom de Parasol Chinois: il en est parlé aux articles 1 & 2 des Coquilles, page 78.

Sous la lettre B est le Lépas Cabochon blanc de Saint-Domingue, du quatrieme genre de cette famille, vû par dehors. Il en est parlé à l'arz. 42 des Coquilles, page 91. On voit, en b, la même Coquille renversée, avec son appendice intérieur en demi-cornet.

PLANCHE III.

La lettre C offre un Lépas de Magellan, à Tome I. Nn

coquille percée en-dessus, (ce qui caractérise le second genre de cette famille:) c'est celui de l'art. 37 des Coquilles, page 88. Il ne différe que par de légers accidens de celui qui est décrit à l'art. 36.

Le Lépas de la lettre D est aussi de Magellan: c'est un Lépas papyracé du premier genre, qui se trouve décrit à l'art. 8 des Coquilles, page 79.

PLANCHE IV

On voit, à la lettre E, un groupe très-gracieux de Tuyaux de mer de l'espèce des Tire-bourres, dont il est parlé à l'art. 37 des Coquilles, page 99.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre F, est un de ceux auxquels nous avons donné le nom de Pains de bougie: il en est parlé à l'art. 61 des Coquilles, pag. 100.

La lettre G montre un autre Tuyau de mer, nommé Vilebrequin: il en est parlé à l'art. 59 des Coquilles, page 100.

On voit, en H, trois Tuyaux de mer accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intestins. Ils sont compris dans l'arucle 60 des Coquilles, page 100.

PLANCHE V.

On a représenté, à la lettre I, le premier des deux Burgaux de la Chine, décrits à l'are. 98 des Coquilles, page 111.

On voit, en K, l'un des deux Sabots de l'art. 148 des Coquilles, page 125.

Le petit Buccin qui se voit en L, est un des deux décrits sous le nom de Perrons à l'art. 193 des Coquilles, pag. 144.

PLANCHE VI.

On voit, en M, un Sabot d'Amérique, chargé d'autres coquillages; ce qui lui a fait donner le nom de Fripiere: c'est la premiere des trois dont il est parlé à l'article 147 des Coquilles, page 125. La même Coquille est vue en m du côté de la bouche.

La lettre N offre le Gland de mer épineux, adhérant à une valve de Conque anatifere, dont il est parlé à l'article 919 des Coquilles, page 402.

On a représenté, en O, un Piquant d'Ourfin, extrêmement rare & singulier, décrit vers la fin de l'art. 961 des Coquilles, page 426.

Nn ij

PLANCHE VII.

Le Limaçon qui se voit en P, est une des deux Bouches d'argent d'espéce rare, décrites à l'article 106 des Coquilles, page 112.

On voit, en Q, le Buccin nommé Gaufre, dont il est parlé à l'article 197 des Coquilles, page 144.

La lettre R offre la Coquille nommée Amande rôtie, décrite à l'article 823 des Coquilles, page 357.

PLANCHE VIII.

Le Buccin de Magellan, représenté en S, se trouve décrit à l'arricle 181 des Coquilles, page 140.

Autre Buccin Magellanique, représenté à la lettre T: c'est l'un des deux décrits à l'article 198 des Coquilles, page 145.

On voit, à la lettre V, le Buccin nommé Cabestan, décrit à l'article 192 des Coquilles, page 143.

La lettre X fait voir un petit Buccin singulier, nommé Mûre de haie. Le même est vu en x du côté de la bouche. Il en est parlé à l'article 172 des Coquilles, page 136.

PLANCHE IX.

La lettre A offre un Buccin très-rare, nommé le Buccin crénelé: il est décrit à l'are. 202 des Coquilles, page 146.

On voit, en B, un Buccin de Magelfan, nommé la Licorne. Le même se voit en b du côté de la bouche, pour en faire voir la dent saillante. Il en est parlé à l'arcicle 174 des Coquilles, page 136.

On a représenté, en C, une Coralline rare, à longue tige, nommée le Pinssau de mer. Le restant de sa tige se voit à la lettre e. Ce morceau est décrit à l'article 149 des Polypiers, page 38.

PLANCHE X.

La lettre B offre un beau Buccin Magellanique, nommé le Buccin feuilleté. Le même est vu en d du côté de la bouche. Il est décrit à l'article 194 des Coquilles, page 144.

PLANCHE XI.

On voit, en E, le Rocher de la Chine, dont Nn iij 366 il est parlé à l'article 251 des Coquilles, page 161. Le même est représenté en e du côté de la

bouche.

PLANCHE XII.

La Coquille qu'offre cette planche est nommée par Klein Racine de Brione, & se trouve gravée dans Lister. Nous ne l'avons fair représenter que pour faire voir les divers changemens d'état de cette Coquille, qui est ici dépourvue d'aîle. Il en est parlé à l'article 341 des Coquilles, page 190.

PLANCHE XIII.

La même Coquille de la planche précédente, mais plus avancée en âge, & garnie de son aîle. Elle est aussi décrite à l'art. 3°41 des Coquilles, page 190.

PLANCHE XIV.

La même Coquille représentée dans son dernier âge, avec ses pattes. C'est l'une des deux de même espèce dont il est parlé à l'are. 340 des Coquilles, page 190.

PLANCHE X V.

On voit, en F, une rare & belle Olive dont il est parlé à l'article 342 des Coquilles, page 237.

La lettre G représente un Rocher blanc de lait : c'est le premier des trois qui sont décrits à l'article 253 des Coquilles, page 162.

La lettre H offre une Pourpre épineuse trèsrare, nommée le Radix à pointes noires. Elle se trouve décrite à l'article 374 des Coquilles, page 201.

La Porcelaine de la lettre I se nomme la Tortue, & est décrite dans l'article 581 des Coquilles, pages 275 & 276.

PLANCHE XVI.

On a représenté, en K, une très-belle Pourpre triangulaire aîlée, décrite à l'article 366 des Coquilles, page 198.

Autre Pourpre ailée représentée en L, & décrite à l'article 367 des Coquilles, page 198.

Troisieme Pourpre aîlée, représentée en M: elle est décrite à l'article 368 des Coquilles, page 199.

On voit, en N, une Pourpre triangulaire

des Indes, blanche, à taches peu nombreuses: une autre de même espéce, entiérement blanche, à la lettre O; & une petite blanche du Sénégal, à queue sermée comme un tuyau, à lettre P. Ces trois Pourpres, qui toutes ont un commencement d'aîle, sont partie de l'article 363 des Coquilles, page 198.

La Vis qui se voit à la lettre Q, est une des Vis seuilletées blanches qui sont partie de l'arti-

cle 442 des Coquilles, page 229.

PLANCHE XVII.

La lettre R offre un Casque des Indes, décrit à l'article 283 des Coquilles, page 172.

Le Casque qui est en S, est le dernier de ceux qui sont décrits à l'article 289 des Coquilles, page 175.

On voit, en T, une Coquille du genre des Cœurs, nommée Marron épineux, & décrite à l'article 281 des Coquilles, page 356. La lettre t fait voir la même Coquille dans une autre position.

PLANCHE XVIII.

La lettre V représente un grand Cœur trèsrare, nommé le Coqueluthon de Moine : il se trouve décrit à l'arricle 824 des Coquilles, page 357. L'intérieur de l'une des valves de cette Coquille est représenté en r, pour en saire voir le large appendice en forme d'oreille.

PLANCHE XIX.

Le groupe de deux Huitres, qui est représenté à la lettre X, est une espèce de Crête de coq d'une variété rare. Voyez ce qui en est dit à l'art. 606 des Coquilles, page 288.

On voit, en Y, une autre Huitre nommée Corne d'abondance; elle appartient à l'article 610 des Coquilles, & est de l'espèce décrite dans l'article 608, pages 288 & 289.

La lettre Z représente une des deux Moules arborisées, décrites à l'article 898 des Coquilles, page 386.

PLANCHE XX.

Cette planche réunit toutes les variétés d'Anomies que nous possédons, décrites aux pages 311, 312 & 313.

La lettre A représente la grande Anomie Magellanique striée de l'article 696. On a mis, en a, la valve supérieure d'une Coquille de me finguliere de ses appendices.

B est l'Anomie verd - noirâtre des Indes. connue sous le nom de Bec de Perroquet, & décrite à l'article 692. La même représentée de profil en b, pour faire voir l'avance de son bec.

C est l'Anomie lisse de Mahon, décrite à

l'article 694.

- D. Petite Anomie jaune-blond & transparente de Mahon; c'est une des deux premieres qui se trouvent décrites à l'article 699 : elle est représentée un peu plus grande qu'elle ne l'est en effet.
- E. Autre petite Anomie à tuyaux latéraux, du même article, représentée de grandeur naturelle.
 - e. La même groffie de plus de moirié:
- F. Anomie striée, de forme ovale, décrite dans le même arricle.
- G. Autre Anomie différente, du même article.
 - g. La même, vûe par desfous.

PLANCHE XXI.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre H. est le Taret rongeur de bois de M. Adanson, fermé, par le bout le plus large, d'une espéce d'opercule hémisphérique : il est décrit à l'artiele 916 des Coquilles, page 399.

On voit, en I, une autre variété de Taret coupé depuis a jusqu'en b, pour en faire voir la construction intérieure. La piéce qui en a été enlevée se voit en i. Il est parlé de ce Tuyau multivalve vers la fin de l'article 916 ci-dessus.

Autre Tuyau de mer, représenté en K, dont l'extrémité c est sermée par une demisphère lisse & luisante. Il est décrit à l'article 31 des Coquilles, page 97.

La lettre L offre un Tuyau de mer chambré, dont on a mis les cloisons à découvert depuis d jusques en e. Il est parlé de ce Tuyau à l'article 62 des Coquilles, page 101.


PLANCHE XXII.

Palais d'une espéce de Raie de la Chine, contourné de maniere à imiter deux Buccins. Il en est parlé à l'art. 14 des Poissons, page 477.


DE l'Imprimerie de MICHEL LAMBERT, rue des Cordeliers, au Collège de Bourgogne, 1767.

. , : · . . . --<u>:</u>






. ١ • • • · : • . . . ` , '




C.Braftedel at Soul 2766.







C. Broke del. of Soul. 1786







C. Bristo del. 4 Scal. 2766.






C. Brosedel et Sail 2766.







C. Bresse bel. et Seul. 1766.







C. Bresse bel. et Sevl. 1766.







C.Bresse Del. et Sevl.1766.






C: Brogs del et Sail 1766







C. Bresse del. et Sent. 1755







C.Bresse Del. et Sevl. 1766.





C. Bresse Del. et Sevl 1766.







C. Bresse Del et Sevl 1766.


٠. ÷ . ı

٠





CBresse bel et Sev (1766.







CEresie Del asidoro







C. Fit & De gard Bay







C.Bresce D.L. L. V. 1766.







CBresse . Bel . et Sevl . 1766





C/1 -1 1 1 1055





Brope del et Sed 1766

